

코 물 코막힘 재채기

알리지성 비염

코 감 기

항알리지작용의 신이추출물 함유



생약성분으로 코를 시원하게 비엠쿨에프 캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(420mg)중

신이건조엑스(9.1-1)(별규)	13.33 mg
벨라돈나총알칼로이드(별규)	0.2 mg
클로르페니라민말레산염(KP)	4.0 mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	30.0 mg
카페인무수물(KP)	30.0 mg

【성 상】 갈색의 분말이 든 미황색의 경질캡슐

【효능·효과】

코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리 무거움

【용법·용량】 보통 성인 1일 3회, 1회 1캡슐씩 식후 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.
다른 비염용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해거담제, 멀미약, 알레르기용약 등).
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 이 약은 황색5호(산세텔로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.
 - 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만의 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 고혈압, 심장질환, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 당뇨병, 갑상선질환, 당뇨병 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 고령자(노인)
 - 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람

KGMP
적격업체제품
일반의약품
분류번호 141

- 다음과 같은 가침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기증, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
출혈성비출증, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적, 가려움, 배뇨곤란, 두통, 안면홍조, 비정상적인 눈부심
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
아나필락시스(과민성 쇼크) : 복통후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - 3~5회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 장기간 계속 복용하지 말 것.
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
 - 복용시에는 음주하지 말 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고지 소비자분쟁기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- * 의약품 중어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)의약품정보를 참조하십시오.

- * 본 첨부문서 작성일자(2014년 3월) 이후에 변경된 내용은 소비자 상담실번호 (02-521-2618)에서 확인하실 수 있습니다.
- * 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께보관하십시오.

*첨부분서작성일 2014. 3월

제 조
판매처



한풍제약



www.hanpoong.co.kr

전력로 전주시 덕진구 구렛뎌길 31



고객상담실: 02-521-2618