

산페리정

(에페리손염산염)

SANPERI Tab.

■ 원료약품 및 그분량 : 1정 중

에페리손염산염(별규)..... 50mg
동물유래성분(첨가제) : 유당수화물(소, 우유)

■ 성 상 흰색의 원형 당의정

■ 효능 · 효과

1. 근골격계 질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완증후군, 견관절주위염, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성마비 : 뇌혈관장애, 경직성척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌 · 척수종양 포함), 외상 후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색 경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타의 뇌척수 질환

■ 용법 · 용량

성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구 투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 중증(심한증상)의 근무력증(근육무력증)환자
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여 할 것.
 - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다.)
3. 이상 작용
 - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 3) 신장 : 드물게 단백뇨(단백질이 섞인 오줌), BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
 - 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지 떨림 등이 나타날 수 있다.
 - 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈(목마름), 변비, 설사, 복통(배아픔), 드물게 복부팽만감, 구내염(입안염) 등이 나타날 수 있다.
 - 8) 비뇨기계 : 드물게 요폐(소변축척), 요실금, 잔뇨감(소변을 누고난 후에도 다 눈 것 같지 않은 느낌)이 나타날 수 있다.

9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있다.

10) 기타 : 때때로 안면홍조, 드물게 발한(땀이남), 부종(부기)이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 이 약 투여 중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감량(줄임) 또는 투여를 중지한다.

2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로, 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

이 약의 유사약물인 영산톨페리손과 메토카르바몰을 병용(함께 복용)시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다.)

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.

■ 포장단위 30정, 30T×10EA, 500정

■ 저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 소비자상담실 080-597-1020

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 자세한 허가사항은 식약청 이지드럭(ezdrug.mfds.go.kr)에서 확인 가능합니다.

문서개정일:20140318

[제조원]



대한뉴팜(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

[판매원]



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)