

## 진해거담제 & 기침감기약

# 뮤코테인캡슐

(아세브로필린)

MUCOTEINE Cap.

뮤코테인캡슐은 기도과민성 억제작용을 통해 기관지를 정상상태로 회복시킴으로써 급·만성 기관지염, 기관지 천식 등을 근원적으로 치료하며, 부비강염과 간성비염 등에도 효과적인 치료제입니다.

### 【약리작용】

Phosphodiesterase의 작용을 억제하여 cAMP 조작농도를 증가시킴으로써 지질분해, 당분해, 당생성을 자극하는 catecholamine과 epinephrine의 분비를 유발하여 기관지확장, 이노, 중추 및 심장의 자극과 위산분비를 일으킵니다.

### 【특장점】

- 1) 경축된 기관지를 정상상태로 확장시킵니다.
- 2) 기관지 및 폐조직에 높은 선택성으로 강력한 진해거담작용과 항염작용을 나타냅니다.
- 3) 기도과민성 억제작용을 통해 기관지염, 기관지 천식을 원인으로 치료합니다.

### 【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아세브로필린(아세필린산아세트산염류) ..... 100mg  
정가제(동물유래) : 유당수화물 (기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)  
정가제(타르산소) : 적색 40호, 황색 5호, 청색 1호

### 【성상】 흰색 내지 마백색 가루가 든 심부 연화제, 하부 흰색의 경질캡슐제

### 【효능·효과】

기도폐쇄 장애 및 점액분비 장애로 인한 급·만성 호흡기질환 : 급·만성기관지염, 기관지천식, 부비동염, 간성비염

### 【용법·용량】

성인 : 아세브로필린으로서 1회 100mg을 1일 2회 경구투여한다.

### 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 이 약이나 이 약의 구성성분 또는 다른 진경제 약물에 과민반응이 있는 환자
  - 2) 알부르속에 과민반응이 있는 환자
  - 3) 급성 심근경색 환자
  - 4) 저혈압 환자
  - 5) 중증 간장애 또는 신장장애 환자
  - 6) 수유부
  - 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

### 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 심장병, 관상순환부전, 울혈성심부전 환자
- 2) 비만환자
- 3) 간질의 병력이 있는 환자
- 4) 위·십이지장궤양 환자
- 5) 감작성기능항진증 환자
- 6) 고령자
- 7) 소아
- 8) 고혈압 환자
- 9) 중증 저산소혈증 환자
- 10) 만성폐쇄성폐질환 환자
- 11) 간장애 및 신장장애 환자
- 12) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 13) 이 약은 황색 5호(산성염료유 CF, Sunset Yellow FC)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

### 3. 이상반응

- 1) 잔단계 약물 복용 시 일시적 구역 및 어지러움이 보고된 사례가 있으며, 복용을 중단할 경우 이러한 작용은 없어진다.
- 2) 소화기계 : 드물게 배가 거북함, 위·복부팽만감, 위·복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 토할, 가슴쓰림, 식욕부진, 위식도 역류, 명치통증 등이 나타날 수 있다.
- 3) 과민반응 : 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 얼굴종창, 호흡곤란, 추위를 수반하는 체온상승 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 호흡기계 : 백혈구 증가를 수반하는 화농성 비염, 반호흡이 나타날 수 있다.
- 5) 기타 : 드물게 구내 비비강, 팔의 미비강, 두통, 흥분, 불면, 빈맥, 기와수축, 과이원, 저혈압이 나타나며 때때로 알부민증, 고혈당증이 나타날 수 있다.
- 6) 국내에서 6년 동안 806명을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 이상반응의 발현빈도율은 인과관계와 상관없이 1.2%(9례/760례)로 보고되었고, 종류는 배가 거북함 0.4%(3례), 소화장애 0.4%(3례), 구역 0.4%(3례)로 나타났다.

### 4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 성분은 동물에게서 독성을 나타내지 않았지만, 진경제 약물은 혈중농도가 높으면 중증 독성이 나타날 수 있다는 것을 고려해야 한다.
- 2) 높은 연령, 알코올중독, 울혈성심부전, 만성폐쇄성폐질환, 동시 감염, 손상된 간 및 신장기능 등과 같은 인자들이 이 약의 정소율을 감소시킬 수 있으며, 이 경우 추천용량을 적용하여도 혈중 농도가 높아질 수 있으므로 주의한다.

### 5. 상호작용

- 1) 에라트로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 클레안도마이신, 린코마이신, 시메티딘, 알코푸리놀, 퀴놀론계 항생제, 경구용 항응고제, 클린다마이신 등의 약물과 함께 사용하는 경우 이 약의 혈중농도가 증가할 수 있으므로 필요할 경우 이 약을 감량해야 한다.
- 2) 푸로세미드와 함께 사용하는 경우 이노작용이 증대될 수 있고, 레세프린과 함께 사용하는 경우 빈맥을 유발할 수 있다.
- 3) 바르비탈계 약물, 페니토인과 함께 사용하거나 흡연환자가 이 약을 복용하는 경우 이 약의 혈중농도를 감소시킬 수 있다.
- 4) 다른 진경제 약물 또는 중추신경흥분제와 병용하면 과도한 중추신경자극 작용이 나타나므로 이러한 약물 병용투여하지 않는다.
- 5) 에페드린 또는 다른 교감신경효능 기관지확장제와 함께 사용하는 경우 주의가 필요하다.

### 6. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 기형발생이 보고되지는 않았으나, 천식치료를 하지 않아 일부에게 치명적일 수 있을 경우를 제외하고 임신 첫 달 및 임신일기에 사용하지 않는다. 태아발육에 대한 이상반응은 보고 된 바 없으나, 다른 약물과 마찬가지로 이 약을 임신기간에는 추천하지 않는다.
- 2) 수유기 중 효과는 확립되어 있지 않으므로 수유부는 이 약을 복용하지 않는다.

### 7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

### 8. 소아에 대한 투여

소아에 이 약을 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

### 9. 과량투여시의 처치

과량투여 시에는 보고된 바가 없으나 과량투여 시 일반적인 감작기대발작과 심한 설상부정맥이 나타날 수 있다. 과량투여하여 진전경련이 일어나지 않았을 경우, 완하제 및 활성탄을 투여하여 구토를 유발한다. 진전경련이 일어났을 경우, 산소를 공급하여 호흡효율을 측정하고, 디아제팜을 정맥투여하면서 적절한 수분을 공급하고 혈압을 관찰한다. 치료가 필요한 경우, 모든 독성 증상이 사라진 이후에 낮은 용량으로 다시 시작해야 한다.

### 10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

### 【포장단위】 자사포장단위

### 【저장방법 및 사용기간】 기밀가온, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.  
※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

**HUTECS** **한국유타크제약(주)** 한국약품제조자협회  
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99 **KGMP** 제2차인정  
제조회차 : 한국유타크제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99  
제 조 자 : 삼진제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

설명서 작성일 140103