

이는 NLR과 프로토콜민산(장기)에 대한 보다방이 필요할 수 있다. 이온전소(전소)와 같이 CYP2C19와 CYP3A4를 유도하는 약물은 이 약(소프라롤)의 혈소판 수 있다.

제민 플루복사민과 이 약을 병용투여시 용량방이 고려되어야 한다. 이 약의 혈청 농도가 증가하고 알려져 있다.

이제 이 약과 클로피도그렐을 병용투여했을 때 클로피도그렐의 활성대사체의 노출이 증가하여 위장관 출혈 위험에 대한 고려에 있어 임상적으로 유의한 결과는 없었다. 이 용량으로 투여될 클로피도그렐의 용량조정은 필요 없다.

사이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토티렉세이트의 사용상의 주의사항 참조)와 프로

를 병용하는 경우 메토티렉세이트 그리고/또는 그 대사체인 히드록시메토티렉세이트의 상승 및 유지되어 메토티렉세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용 세시트와 프로톤펌프억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았다(일반적

투여시 심부정맥(QT연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함)이 나타나

리트로마이신 및 에리트로마이신에 의해 이들 약물의 간대사가 방해받기 때문인 것
시판후 조사결과 보고되었으며 치명적인 사례도 보고되었다.

의 노출에 관한 임상 자료는 없다. 랩트에 있어서 태자의 혈장중 농도는 모돈물의 혈장중

- 인정되었다. 또한, 토끼경구 30 mg/kg에서 태아사망율의 증가가 인정된다. 그러므로 임신 중 이 약의 사용을 금한다.
- 유류으로의 분비가 보고되어 있으므로 수유중인 여성에는 투여를 피하고 부득이 투여하는 경우에는 중단해야 한다.
- 여
- 이 소인은 허립되어 있지 않다사유경험이 적다(성인 용법에 한함).
- 이 소인은 임신에 대하여 위독의역류질환관련증상과 미관성치로에 대한 안전성과 유류성, 성인에서의 이 약의 사용에 관한 충분한 시험결과를 바탕으로 소아환자에 대한 추가적인 연구가 필요하다.

에서 성인에게서 발견되지 않은 새로운 이상반응은 나타나지 않았다. 1세 미만의 환자에

가치의 소아에서(=66) 시험의 투여와 관계된 가장 흔하게 보고된(2명 이상) 이상반응은 두통(3 %)이었다. 미국에서의 임상시험에서 성인에게서 발견되지 않은 새로운 이상반응 없다.

복부통증(5 %), 설사(3 %), 어지럼(3 %)이었다. 어지럼의 경우, 성인에서 1 % 이하로 나타나서, 위산역류로 인한 영향을 가진 환자나 2명에서 보고되었으면 평등한 속출공간, 그들중

- [illegible]

이러한 사실은 한국전쟁 당시의 사회적 분위기를 대변하고 있다. 이 시기에 한국전쟁 당시의 사회적 분위기를 대변하고 있다. 이 시기에 한국전쟁 당시의 사회적 분위기를 대변하고 있다.

- **실온** : 실온(1~30℃)보관
 ● 함께 복용하십시오.
 ● 밀지 않는 곳보 보관하여 주십시오.
 ● 알레르기성 과민반응, 발적, 가려움에 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사
 ● 의사와 상담하십시오.
 ● 복용을 보조하기 위해 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
 ● 어린이의 접근이 불가능한 장소에 보관하십시오.
 ● 어린이의 접근이 불가능한 장소에 보관하십시오.
 ● 어린이의 접근이 불가능한 장소에 보관하십시오.

hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인하실 수 있습니다.

- ◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
사용설명서 개정년월 : 2014. 4.