

아페린씨정

Apherine-C Tablet

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

에페드린염산염(KF)	15mg
카페인무수물(KF)	45mg
아세트아미노펜(KF)	250mg
정가(제타크레스소) : 황색4호, 황색5호	

【성상】

원형 주황색의 정방형 정제

【효능·효과】

강기의 제동성·어려움증상(인후(목구멍)병, 기침, 가래, 오한(호고 열리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

- 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.
- 만 1세 이상 ~ 만 15세 미만 : 2/3정
- 만 7세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1/2정
- 만 7세 이하의 영유아는 복용할 수 없다.

【사용상의 주의사항】

- (1) 경고
매일 세한 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

(2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

(3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해(기침을 그치게 함)제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내과약(비염·코염)용 경구제, 말미라, 알레르기용약

(4) 다음의 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 이 약은 황색4호(타르산)를 함유하고 있으므로 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 2) 이 약은 황색5호(신셋염료용 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

(5) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 양아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 라이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 만 3개월 미만의 양아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우라도 만 2세 이하의 양아(젖먹이, 갓난아기)·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면

이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.

- 3) 편안, 양친 또는 형제 동생이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 갑상선염, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위암·위장질환 등이 있는 사람, 고령자노인, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(종혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 구토, 식욕부진, 빈맥, 부종, 어지러움, 불안, 열면, 불면
 - 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - ㉠ 속(아나필락시스)과(과민성쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답한 등과 함께 만색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨이 곤란한 등이 나타날 수 있다.
 - ㉡ 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리델증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(종혈되어 붉어짐), 화상과 같이 겉잡아 생기는 등의 심한 증상이 전신 피부, 입이나 눈진막에 나타날 수 있다.
 - ㉢ 천식
 - ㉣ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(황피 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨)이 나타날 수 있다.
 - ㉤ 간질환증세 : 가슴을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
- 3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

(7) 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 4) 복용시에는 음식물 잘 것.
- 5) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

(8) 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 췌 수 있는 한 유효기간이 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

일명용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

300정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오물 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '온라인 의약품사전(<http://drug.mil.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성일 : 2014. 04.

E043-01

주식회사 휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100
소비자 상담실(한글 및 교환자) : 080-447-4700

Huons