

[원료약품 및 분량] 1정 중

아스피린(KP) 100mg

[성상] 흰색의 원형 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

1. 협소한 운영직제 적용에 의한 불간정형 협심층 환자에 있어서 비치명적 심근경색 위험성상 및 일과성 혈압 발작 위험성상에 사용
2. 최초 심근경색 후 재경색 예방
3. 심근경색의 혈전·색전 형성의 억제 - 뇌경색환자, 관상동맥 우회술(CABG) 또는 경피적관 관상동맥 성형술(PTCA)시행 후
4. 허혈성 심장질환의 가족력, 고혈압, 고콜레스테롤혈증, 비만, 담배 남용, 복합적 심혈관 위험 인자를 가진 환자에서 관상동맥 질환예방의 예방

[용포 · 용량]

- 불안정형 합성성 환자의 비매형성 심근경색 위험감소: 1일 75~300mg
- 알코올성 지방 발작의 위험감소: 1일 30~100mg
- 최초 심근경색 후 재경색 예방: 1일 300mg
- 다음 경우의 혈전·색전 형성의 억제
 - 노경색환자: 1일 1회 100mg, 증상에 따라 300mg까지 증가 가능
 - 관상동맥 우회술(CABG) 또는 경피적 관상동맥 성형술(PTCA) 시행 후 1일 1회 100mg, 증상에 따라 300mg까지 증가 가능
 - 경피적 관상동맥 성형술(PTCA) 시행 환자의 초기치료를 경우 통상용량의 수배를 사용하는 것이 바람직함
- 허혈성 심장질환의 가족력, 고혈압, 고콜레스테롤혈증, 당뇨, 담배 흡연 복합적 위험인자를 가진 환자에서 관상동맥질환의 예방: 1일 1회 100mg, 서서히 용량 증진

[사용상의 주의사항]

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 신장은 다른 기관 시스템에 과민성의 병변이 있는 환자 2) 뇌와 호흡 기관 환자 3) 이차성 갑상선비대증(스트로이드 또는 아나볼릭 스테로이드 등에 의해) 전신발作的 유발 또는 그 병역이 있는 환자 4) 혈우병 환자 5) 심한 간염에 의한 6) 심한 신장에 신장염에 의한 7) 심한 신장 기능부전 환자 8) 출혈성 경향이 있는 환자 9) 임산부 중 임신 6개월에서 임신 15주에 이르기(15mg 주) 이상의 용량을 병용투여할 경우 발생하는 환자 10) 임신 37에 해당하는 임부 7. 임부 및 수유부에서 다량 투여 후 치료
3. 다음 환자에서 신증 하하고
- 1) 신장에 신장염에 의한 2) 신장 순환 기능 이상 환자 신혈관 질환, 혈관 질환, 심부전, 체액 과잉, 그 수술, 폐렴 또는 신증 환자 3) 간염에 또는 그 병역이 있는 환자 3) 심근경색 환자 4) 혈액의 산도는 그 병역이 있는 환자 5) 기간 신증 환자 6) 수술 후의 환자 7) 3세 이하의 유아 8) 동맥, 소용혈 증후군, 항응고제에 의한 대량 괴사 등 다른 일례로 신증 병역이 있는 환자 9) 고령자 10) 항응고제 병역이 있는 환자 11) 신증 병역이 있는 환자 12. 신증 환자와 고령자 1) 폐렴 또는 신증 환자 2) 신증 환자 3) 신증 환자 4) 신증 환자 5) 신증 환자 6) 신증 환자 7) 신증 환자 8) 신증 환자 9) 신증 환자 10) 신증 환자 11) 신증 환자 12) 신증 환자 13) 신증 환자 14) 신증 환자 15) 신증 환자 16) 신증 환자 17) 신증 환자 18) 신증 환자 19) 신증 환자 20) 신증 환자 21) 신증 환자 22) 신증 환자 23) 신증 환자 24) 신증 환자 25) 신증 환자 26) 신증 환자 27) 신증 환자 28) 신증 환자 29) 신증 환자 30) 신증 환자 31) 신증 환자 32) 신증 환자 33) 신증 환자 34) 신증 환자 35) 신증 환자 36) 신증 환자 37) 신증 환자 38) 신증 환자 39) 신증 환자 40) 신증 환자 41) 신증 환자 42) 신증 환자 43) 신증 환자 44) 신증 환자 45) 신증 환자 46) 신증 환자 47) 신증 환자 48) 신증 환자 49) 신증 환자 50) 신증 환자 51) 신증 환자 52) 신증 환자 53) 신증 환자 54) 신증 환자 55) 신증 환자 56) 신증 환자 57) 신증 환자 58) 신증 환자 59) 신증 환자 60) 신증 환자 61) 신증 환자 62) 신증 환자 63) 신증 환자 64) 신증 환자 65) 신증 환자 66) 신증 환자 67) 신증 환자 68) 신증 환자 69) 신증 환자 70) 신증 환자 71) 신증 환자 72) 신증 환자 73) 신증 환자 74) 신증 환자 75) 신증 환자 76) 신증 환자 77) 신증 환자 78) 신증 환자 79) 신증 환자 80) 신증 환자 81) 신증 환자 82) 신증 환자 83) 신증 환자 84) 신증 환자 85) 신증 환자 86) 신증 환자 87) 신증 환자 88) 신증 환자 89) 신증 환자 90) 신증 환자 91) 신증 환자 92) 신증 환자 93) 신증 환자 94) 신증 환자 95) 신증 환자 96) 신증 환자 97) 신증 환자 98) 신증 환자 99) 신증 환자 100) 신증 환자 101) 신증 환자 102) 신증 환자 103) 신증 환자 104) 신증 환자 105) 신증 환자 106) 신증 환자 107) 신증 환자 108) 신증 환자 109) 신증 환자 110) 신증 환자 111) 신증 환자 112) 신증 환자 113) 신증 환자 114) 신증 환자 115) 신증 환자 116) 신증 환자 117) 신증 환자 118) 신증 환자 119) 신증 환자 120) 신증 환자 121) 신증 환자 122) 신증 환자 123) 신증 환자 124) 신증 환자 125) 신증 환자 126) 신증 환자 127) 신증 환자 128) 신증 환자 129) 신증 환자 130) 신증 환자 131) 신증 환자 132) 신증 환자 133) 신증 환자 134) 신증 환자 135) 신증 환자 136) 신증 환자 137) 신증 환자 138) 신증 환자 139) 신증 환자 140) 신증 환자 141) 신증 환자 142) 신증 환자 143) 신증 환자 144) 신증 환자 145) 신증 환자 146) 신증 환자 147) 신증 환자 148) 신증 환자 149) 신증 환자 150) 신증 환자 151) 신증 환자 152) 신증 환자 153) 신증 환자 154) 신증 환자 155) 신증 환자 156) 신증 환자 157) 신증 환자 158) 신증 환자 159) 신증 환자 160) 신증 환자 161) 신증 환자 162) 신증 환자 163) 신증 환자 164) 신증 환자 165) 신증 환자 166) 신증 환자 167) 신증 환자 168) 신증 환자 169) 신증 환자 170) 신증 환자 171) 신증 환자 172) 신증 환자 173) 신증 환자 174) 신증 환자 175) 신증 환자 176) 신증 환자 177) 신증 환자 178) 신증 환자 179) 신증 환자 180) 신증 환자 181) 신증 환자 182) 신증 환자 183) 신증 환자 184) 신증 환자 185) 신증 환자 186) 신증 환자 187) 신증 환자 188) 신증 환자 189) 신증 환자 190) 신증 환자 191) 신증 환자 192) 신증 환자 193) 신증 환자 194) 신증 환자 195) 신증 환자 196) 신증 환자 197) 신증 환자 198) 신증 환자 199) 신증 환자 200) 신증 환자 201) 신증 환자 202) 신증 환자 203) 신증 환자 204) 신증 환자 205) 신증 환자 206) 신증 환자 207) 신증 환자 208) 신증 환자 209) 신증 환자 210) 신증 환자 211) 신증 환자 212) 신증 환자 213) 신증 환자 214) 신증 환자 215) 신증 환자 216) 신증 환자 217) 신증 환자 218) 신증 환자 219) 신증 환자 220) 신증 환자 221) 신증 환자 222) 신증 환자 223) 신증 환자 224) 신증 환자 225) 신증 환자 226) 신증 환자 227) 신증 환자 228) 신증 환자 229) 신증 환자 230) 신증 환자 231) 신증 환자 232) 신증 환자 233) 신증 환자 234) 신증 환자 235) 신증 환자 236) 신증 환자 237) 신증 환자 238) 신증 환자 239) 신증 환자 240) 신증 환자 241) 신증 환자 242) 신증 환자 243) 신증 환자 244) 신증 환자 245) 신증 환자 246) 신증 환자 247) 신증 환자 248) 신증 환자 249) 신증 환자 250) 신증 환자 251) 신증 환자 252) 신증 환자 253) 신증 환자 254) 신증 환자 255) 신증 환자 256) 신증 환자 257) 신증 환자 258) 신증 환자 259) 신증 환자 260) 신증 환자 261) 신증 환자 262) 신증 환자 263) 신증 환자 264) 신증 환자 265) 신증 환자 266) 신증 환자 267) 신증 환자 268) 신증 환자 269) 신증 환자 270) 신증 환자 271) 신증 환자 272) 신증 환자 273) 신증 환자 274) 신증 환자 275) 신증 환자 276) 신증 환자 277) 신증 환자 278) 신증 환자 279) 신증 환자 280) 신증 환자 281) 신증 환자 282) 신증 환자 283) 신증 환자 284) 신증 환자 285) 신증 환자 286) 신증 환자 287) 신증 환자 288) 신증 환자 289) 신증 환자 290) 신증 환자 291) 신증 환자 292) 신증 환자 293) 신증 환자 294) 신증 환자 295) 신증 환자 296) 신증 환자 297) 신증 환자 298) 신증 환자 299) 신증 환자 300) 신증 환자 301) 신증 환자 302) 신증 환자 303) 신증 환자 304) 신증 환자 305) 신증 환자 306) 신증 환자 307) 신증 환자 308) 신증 환자 309) 신증 환자 310) 신증 환자 311) 신증 환자 312) 신증 환자 313) 신증 환자 314) 신증 환자 315) 신증 환자 316) 신증 환자 317) 신증 환자 318) 신증 환자 319) 신증 환자 320) 신증 환자 321) 신증 환자 322) 신증 환자 323) 신증 환자 324) 신증 환자 325) 신증 환자 326) 신증 환자 327) 신증 환자 328) 신증 환자 329) 신증 환자 330) 신증 환자 331) 신증 환자 332) 신증 환자 333) 신증 환자 334) 신증 환자 335) 신증 환자 336) 신증 환자 337) 신증 환자 338) 신증 환자 339) 신증 환자 340) 신증 환자 341) 신증 환자 342) 신증 환자 343) 신증 환자 344) 신증 환자 345) 신증 환자 346) 신증 환자 347) 신증 환자 348) 신증 환자 349) 신증 환자 350) 신증 환자 351) 신증 환자 352) 신증 환자 353) 신증 환자 354) 신증 환자 355) 신증 환자 356) 신증 환자 357) 신증 환자 358) 신증 환자 359) 신증 환자 360) 신증 환자 361) 신증 환자 362) 신증 환자 363) 신증 환자 364) 신증 환자 365) 신증 환자 366) 신증 환자 367) 신증 환자 368) 신증 환자 369) 신증 환자 370) 신증 환자 371) 신증 환자 372) 신증 환자 373) 신증 환자 374) 신증 환자 375) 신증 환자 376) 신증 환자 377) 신증 환자 378) 신증 환자 379) 신증 환자 380) 신증 환자 381) 신증 환자 382) 신증 환자 383) 신증 환자 384) 신증 환자 385) 신증 환자 386) 신증 환자 387) 신증 환자 388) 신증 환자 389) 신증 환자 390) 신증 환자 391) 신증 환자 392) 신증 환자 393) 신증 환자 394) 신증 환자 395) 신증 환자 396) 신증 환자 397) 신증 환자 398) 신증 환자 399) 신증 환자 400) 신증 환자 401) 신증 환자 402) 신증 환자 403) 신증 환자 404) 신증 환자 405) 신증 환자 406) 신증 환자 407) 신증 환자 408) 신증 환자 409) 신증 환자 410) 신증 환자 411) 신증 환자 412) 신증 환자 413) 신증 환자 414) 신증 환자 415) 신증 환자 416) 신증 환자 417) 신증 환자 418) 신증 환자 419) 신증 환자 420) 신증 환자 421) 신증 환자 422) 신증 환자 423) 신증 환자 424) 신증 환자 425) 신증 환자 426) 신증 환자 427) 신증 환자 428) 신증 환자 429) 신증 환자 430) 신증 환자 431) 신증 환자 432) 신증 환자 433) 신증 환자 434) 신증 환자 435) 신증 환자 436) 신증 환자 437) 신증 환자 438) 신증 환자 439) 신증 환자 440) 신증 환자 441) 신증 환자 442) 신증 환자 443) 신증 환자 444) 신증 환자 445) 신증 환자 446) 신증 환자 447) 신증 환자 448) 신증 환자 449) 신증 환자 450) 신증 환자 451) 신증 환자 452) 신증 환자 453) 신증 환자 454) 신증 환자 455) 신증 환자 456) 신증 환자 457) 신증 환자 458) 신증 환자 459) 신증 환자 460) 신증 환자 461) 신증 환자 462) 신증 환자 463) 신증 환자 464) 신증 환자 465) 신증 환자 466) 신증 환자 467) 신증 환자 468) 신증 환자 469) 신증 환자 470) 신증 환자 471) 신증 환자 472) 신증 환자 473) 신증 환자 474) 신증 환자 475) 신증 환자 476) 신증 환자 477) 신증 환자 478

4. 이상반응

기재된 이상적 물반응은 아스피린 제제의 단기, 장기 경구 투여를 포함한 치열적 시험 후 보고에 근거하였다.

- [illegible]

5. 일반적 주의

- [illegible]

9) 이집트에서는 이집트 신화에서 아몬으로 알려진 영웅에 대해서 이야기하는 경우가 적절할 정도로 사용되고 있다. 이집트 신화에서 아몬은 신이 투트라는, 7 개 근교에서 및 영웅에 있어서 사용될 최초의 신 중 하나라고도 이야기한다. 또한, 9) 이 이야기는 유물과 관련된 경연에서 실려질 수 있도록 하여, 중상 및 경연에 관한 것, 중상, 조를 만듦, 신화적 경연에 대한 이야기, 사망할 수 있다. 10) 이 이야기는 실려질 수 있도록 다른 중상도 사용할 수 있다. 만약 중상에서 아몬, 호르, 호르와 호르가 사용될 수 있도록 하기 위한 것이라면 아몬이 나타날 수 있다. 11) 이 이야기는 아몬, 호르와 호르가 사용될 수 있도록 하기 위한 것이라면 아몬이 나타날 수 있다. 12) 이 이야기는 아몬, 호르와 호르가 사용될 수 있도록 하기 위한 것이라면 아몬이 나타날 수 있다. 13) 자물쇠에서 아몬이 피어난 것은 아몬 배설물 감소시켜서 동물의 소변을 가진 한자에서 동물의 배설물을 유발할 수 있다.

6. 상호작용

- [illegible]

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 프스트라글린은 합성 자극제 사용은 임신초반 태아의 발달에 악한 영향을 줄 수 있다. 복벽 만수열과 임신초반 프스트라글린은 신장 장애와 사육소로 인하여 유산 및 기관 결손에 대한 위험성이 증가할 수 있다는 우려가 제기되었다. 이러한 위험성은 또한 용량 및 투여기간에 따라 증가할 것으로 예상된다. 임신 위험성과 임신실시제 복용의 연관성을 입증할 유�효한 증거는 없다. 임신실시의 기관 결손에 대한 연구 결과 임신실시제는 없으나, 장출생벽결함(gastraschisis)에 대한 위험성 증가가 배제될 수 없다. 임신초반 1기(-14개월경)에 약을 투여한 14,800명의 모자에서 기관결손의 증가는 나타나지 않았다. 동물 실험에서 생식작용이 나타났다.
- 임신 1기와 2기에는 반드시 복용하거나 투여할 수 있지만 임신실시제 복용 제약을 두어해서는 안 된다. 임신실시제 함유 제품을 임신초반에는 여성 혹은 임신 1기 및 2기에 태아를 검사할 경우, 자살량을 사용해야 하며 가능한 한 최초반의 기관결손 및 복출반을. 임신 3기 동안 모든 프스트라글린 함유 임신실시제에 태아의 심장과 두뇌 등성(등골반)까지 패해 및 복출반, 신기능 저하의 위험이 있는 양과소출(oligohydramnios)을 유발할 수 있다. 또한 임신1기에는 산소와 이산화탄소 농도계를 연결시키고, 자궁용액에와 혈중산소농도가 나날 수 있으며, 자궁산막이 예제되어 분만기간이 출생 전 2시간 될 수 있다. 따라서 임신 3기에 아스린를 투여해서는 안 된다. 2) 임신 말기의 컷에 두어하여 실험에서 태아의 등골반 수축이 보고되어 있다. 3) 이 같은 유증으로의 이행이 일어나므로 수유부에는 투여하지 않는다. 끝

8. 고령자(노인)에 대

고령자(노인)에는 이상반응이 나타나기 쉬우므로 소량부터 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

9. 적용상의 주의(장용피제제에 한함)

- 1) 성숙파악을 따르지 않는 경우에도 유익하다. 2) 만능신소나트롬, 만신나트레움 등의 발효제제와 배합하지 않는다.
- 3) 다른 한 술은유치기 쉬운 제제와의 배합하지 않는다.
10. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 약물을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약의 물 오오에 의한 사고 발생이나 약물의 물질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[부가설명] 00.0000

[포장단위] 30, 300장

※ 보 제품은 열거함

- ※ 물이 바뀔될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 「소식지 피해보상규정」에 의거 소비자의정당한 피해는 보상하지 않습니다.
- ※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 사용(유효기간)이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일지 이후 변경된 내용은 이자드레(ezdrug.mts.go.kr)의약품정보 또는 031)33414 - 0329(소식지담당실)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성일 : 2014. 04. 10. (Rev. 0)