

에모펜씨정

Emopen-C Tablet

- ※ 의약품용 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품용 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품용 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【현미약품의 분류】 1정 중

에페드린염산염(KP)	15mg
카페인무수물(KP)	45mg
아세트아미노펜(KP)	200mg
첨가제(타르색소) : 청색1호	

【성상】

연한 파랑색의 장방형 정제

【효능·효과】

감기의 재증상(여과증상)(인후(목구멍)통, 가림, 가래, 옴(흔들고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

- 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.
- 만 11세 이상 - 만 15세 미만 : 2/3정
- 만 7세 이상 - 만 11세 미만 : 1/2정
- 만 7세 이하의 영유아는 복용할 수 없다.

【사용상의 주의사항】

(1) 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

(2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만성질환 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

(3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해(가림을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알약, 알레르기용약), 디펜히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함)

(4) 디펜히드라민 및 그 염류 함유제제

(5) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 만 2개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 약물을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영 · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람

5) 간질질환, 심장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장 궤양 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람

6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람

7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 동맥관, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

(5) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가려움 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

발진(발적(출혈되어 붉어짐), 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 부종, 어지러움, 불안, 떨림, 복통)

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상 증상이 나타난 경우

① 속(아나필락시스)과민성쇼크 : 복용후 바로 두드러기, 부종(붓기), 가슴압박감과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란한 등이 나타날 수 있다.

② 피부정맥만종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증(리델증후군) : 고열을 동반하고, 발진(발적(출혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.

③ 천식

④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.

⑤ 간질성패혈 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타남.

3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

(6) 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 정기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.(어린이의 용법·용량은 다른 경우)
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 5) 바로비탈게 약을, 삼키게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

(7) 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 볼 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

300 정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오열 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

제조사 :

Huons 주식회사 휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100

제조의뢰자 :

Huniz 주식회사 휴니즈

부산광역시 김서구 북산산단 165로 22

작성일 : 2014. 05.

EJ2425-01

판매자 : (주)행복약품

인천광역시 남동구 성밀로 9 (구월동 이노프리카 405호)

소비자 상담(변동 및 교환처) : 032-425-5525