

비타신[®]포르테엠^정VITATHIN FORTE M^{Tab.}

일반의약품 분류번호: 316

【원료약품 및 그분량】 1정 중

티아민질산염(KP)	50 mg
니코틴아미드(KP)	50 mg
리보플라빈(KP)	50 mg
폴리타르타르산염(DAB)	75 mg
판토텐산칼슘(KP)	50 mg
피리독신산염(KP)	50 mg
아스코르브산(97%(별규))	51.55 mg
(아스코르브산으로서 50 mg)	
DL-메티오닌(KP)	75 mg
황산아연일수화물(USP)	41.5 mg
(아연으로서 15 mg)	
시아노코발라민1000배산(KPC)	50 mg
(시아노코발라민으로서 50 µg)	
폴산(KP)	200 µg
비오틴(USP)	250 µg
산화마그네슘(USP)	33.17 mg
(마그네슘으로서 20 mg)	
첨가제(타르색소): 청색2호, 황색5호, 황색203호	

【효능 및 효과】

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C의 보급 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복후)의 체력저하시 2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염·통풍, 어깨결림 등, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염·각기, 눈의 피로 3. 아연의 보급

【용법 및 용량】

만 8세 이상 및 성인: 1일 1회 1~2정 식후 복용

【성상】 노란색의 장방형 필름코팅정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분 에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는

↓ 뒷면 계속

여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 심장·순환기계기능 장애 환자 5) 신장장애 환자 6) 저단백혈증 환자 7) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 8) 임부 9) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 가능한 한 이 처방투수를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종, 붓는 부종, 부전 수축(심장박동정지), 중추신경계 기능 저하 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간소상을 일으킬 수 있다. 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼혈혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 8) 우발적으로 과량복용할 경우, 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요감사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사시에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용 전후에는 피할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 자사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것. 【포장 단위】 60정, 120정 【제 조 자】 조아제약(주) (<http://www.choa.co.kr>) 본사: 서울특별시 영등포구 당산로2길 12 공장: 경상남도 함안군 함안면 광로3 318 【수신자부담과객상담실】 080-988-8888

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
 ※ 본 의약품은 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
 ※ 본 표시사항의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오. ※ 의약품용 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오. ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.

문안작성일: 2014. 03. 15 (Rev.0)