


# 에페렉스 정



**EPEREX Tabs.**  
**(Eperisone HCl)**

【원료약품 및 그 분량】 1정 중  
에페리손염산염(JP) ..... 50mg

【성 상】 흰색의 원형필름코팅정제

**【효능·효과】**

- 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완중후군, 견관절주위염, 요통
- 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 흑색경화증, 뇌성마비, 척수 소뇌변성증, 척수혈관장애, 이급성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질환

**【용법·용량】**

- 성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

**【사용상의 주의사항】**

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 이 약에 과민증 환자
  - 중증의 근육력증 환자
  - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
  - 약물과민증의 병력이 있는 환자
  - 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다.)
- 이상반응
  - 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
  - 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
  - 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다.
  - 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
  - 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.
  - 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장 저하 등이 나타날 수 있다.
  - 기타 : 때때로 안면홍조, 드물게 발한, 무중이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
  - 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지한다.
  - 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이

약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

- 상호작용
 

이 약의 유사약물인 염산톨페리손과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
  - 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.
  - 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
- 소아에 대한 투여
 

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
- 고령자에 대한 투여
 

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

**【저장방법】**

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

**【포장단위】**

10정/병, 30정/병, 50정/병

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

- \* 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.
- \* 제품에 대한 기타 자세한 사항과 이후 변경된 내용은 본사 의학정보부(02-516-6103)로 문의하시기 바랍니다.

TS1146-70808

최종개정일자 : 2017년 8월 8일



**한국유나이티드제약 (주)**

세종특별자치시 전통면 도청공단길 25-23

혁신형제약기업