

나 드 릴 정

(나프로닐옥살산염)



전문의약품

의약품	217
분류번호	혈관확장제

【성분·함량】 1정 중

나프로닐옥살산염(KP).....100mg

【성상】 흰색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 뇌혈행 및 뇌영양장애에 의한 증상
2. 말초, 내이, 눈의 망막·맥락막 혈행 및 영양장애

【용법·용량】

성인 : 나프로닐옥살산염으로서 1회 100mg 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 급성 심근경색 환자
 - 2) 출혈성 장애 초기 환자
 - 3) 기립성 조절장애 환자
 - 4) 이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
중증의 신부전 환자
3. 이상반응
 - 1) 정신신경계 : 때때로 불안, 졸음, 불면, 드물게 피로감, 두통, 어지러움 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 소화기계 : 때때로 구역, 위통, 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 간장 : 간염이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
이 약은 고혈압 치료의 목적으로는 사용하지 않는다.
5. 상호작용
혈압강화제와 병용투여시 혈압강화작용이 증강될 수 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 2) 모유중으로의 이행이 보고되었으므로 수유중에는 투여하지 않는다.
7. 과량투여시의 처치
과량투여에 의해 심전도억제 및 경련이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 위세척을 하고, 필요에 따라 활성탄을 사용한다. 심혈관기능과 호흡을 모니터링하며, 심한 경우 전기심박조율기를 사용하거나 이소프레날린을 투여한다. 경련의 경우 디아제팜을 투여한다.

【저장방법 및 사용기간】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간: 제조일로부터 24개월

【포장단위】 30, 90정

※본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된(KGMP)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과 되었거나 유통 고정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



대우제약(주)

부산광역시 사하구 대대로 153 (신평동)
<http://www.daewoopharm.com>

소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831

최종개정년월일: 2014. 12. 05

작성년월일: 2015. 04. 20

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 4월 20일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com>나 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.