

고함양비타민B복합제

비맥스 정
골드 B-max Gold tab.



일반의약품
KGMP적격업체
분류번호: 03190



【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 :	
벤포티아민(KP)	50.0 mg
리보플라빈(KP)	50.0 mg
피리독신염산염(KP)	50.0 mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 50.0 μg)	50.0 mg
니코틴아미드(KP)	50.0 mg
판토텐산칼슘(KP)	50.0 mg
폴산(KP)	0.25 mg
제피아스코르브산(별규)(아스코르브산으로서 200 mg)	206.2 mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민E로서 10.0 IU)	20.0 mg
콜레칼시페롤농축분말(EPI)(비타민D로서 1000.0 IU)(동물유래성분 : 양, 양모)	10.0 mg
비오틴(USP)	50 μg
이노시톨(KP)	50.0 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 60.3 mg)	100.0 mg
산화아연(KP)(아연으로서 24.1 mg)	30.0 mg
클린타르타르산염(USP)	50.0 mg
L-시스테인(USP)	25.0 mg
우르소데옥시콜산(KP)	15.0 mg
γ-오리자놀(KP)	3.0 mg

첨가제 : 감질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이퀀셀(20A680000), 오파드라이lamb188 A665009B009, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 주황색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C, D, E의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요하리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(인간염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기·눈의 피로·빠, 이의 발육불량·구루병의 예방

2. 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 1회 1정, 1회 1회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장(콩팥)결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인신염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 5) 임부 및 임신과 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
- 6) 신장·순환기계기능 장애 환자
- 7) 신장(콩팥)장애 환자
- 8) 저단백혈증 환자
- 9) 동 중환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 10) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 11) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 붉은 반점, 부진수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장장애(창자)장애, 소화 장애, 상복부(배부름)부종, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있습니다).
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 우혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용)) 투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 11) 1개월 정도 복용하더라도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 물 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 한 귀에 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(6444-62223)

첨부문서 작성일 : 2022년 07월 01일

【판매처】 (주)녹십자 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 화곡산업 【제조원】 (유)한통제약 / 전라북도 완주군 불동읍 원주산단6로 301 2로 586 TEL.080-260-0033
3층, 5층, 동종로 705