

밤사이 부드럽게 작용하는 **변비약** **장제로**

비사코딜
 5.0 mg
 도큐세이트나트륨
 16.75 mg



KGMP
일반의약품
분류번호: 238

■ **성상** : 녹색의 원형 장용성 필름코팅정

■ **성분 · 함량** : 이 약 1정(211mg) 중

비사코딜(KP) 5.0 mg

도큐세이트나트륨(USP) 16.75 mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(뉴질랜드산 모든 연령의 건강한 젖소의 젖)

첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호, 청색2호, 일미늄레이크

■ **효능 · 효과** : • 변비

• 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

■ **용법 · 용량** : 성인 : 1회 2정

소아 : 1회 11~14세 1~2정, 7~10세 1정

1일 1회 취침시(공복시)에 복용하십시오. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량하십시오.

■ **사용상 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색(창자막힘) 환자
- 3) 만 7세 이하의 어린이
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 마십시오.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 4) 나트륨 제한식이를 하고 있는 사람
- 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
- 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우.
- 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
- 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직합니다.
- 4) 복용 시 정제를 씹지 마십시오.
- 5) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안됩니다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 포장단위 : 자사포장단위

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[설명서 개정년월일 / 관리번호] 2014.06.03 / P1408-01

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 첨부문서 최종 개정년월일(2014.06.03)이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(644-6223)

제조의처



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하월로 110
 소비자상담실: 080-021-1010(수신자요금부담전화)
 학술상담실: 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조사



(주)씨트리

경기도 남양주시 경일로 27