

오메조탄플러스 정

본태성 고혈압 치료제

OMEZOTAN PLUS Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

올메사탄메독소밀 (별규)----- 20mg
히드로클로로티아이드(KP)-----12.5mg

■ 성 상

적황색을 띠는 원형의 필름코팅정

■ 효능 · 효과

올메사탄메독소밀이나 히드로클로로티아이드 단독요법으로 혈압이 충분히 조절되지 않는 본태성 고혈압의 치료

■ 용법 · 용량

이 약을 투여하기 전 올메사탄메독소밀이나 히드로클로로티아이드 단독으로 용량조절할 것을 권장하며, 개개의 성분으로 혈압이 적절히 조절되지 않는 경우, 식사와 관계없이 이 약 1일 1회 1정을 투여한다. 용량은 환자의 혈압반응을 고려하여 2~4주 간격을 두고 조절한다. 고용량의 히드로클로로티아이드 단일제제를 복용하고 있는 환자 및 체액고갈이나 지나트륨혈증 환자에서 올메사탄메독소밀을 병용하거나 이 약(올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드)로 전환할 경우 현저한 혈압 감소효과가 나타날 수 있다. 이 경우 올메사탄메독소밀을 병용하기 전에 히드로클로로티아이드의 용량을 12.5mg으로 감량해야 한다.

<고령자>

고령자의 경우 가장 낮은 용량에서 시작하며, 환자의 신기능 또는 심기능, 유병질환, 다른 병용약물 등을 고려하여 용량조절시 주의하도록 한다.

<신부전 환자>

통상 경증 및 중등도 신부전 환자(creatinine clearance>30ml/min)에게 이 약(올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드)를 투여한다. 보다 중증인 신부전 환자에게는 티아지드계 이뇨제보다 루프이뇨제를 사용하는 것이 바람직하므로 이 약(올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드)를 투여하지 않는다.

<간부전 환자>

간부전 환자에 대한 사용 경험에 없어, 이 약의 사용이 권장되지 않는다.

<소아>

소아에 대한 안전성·유효성은 확립되어 있지 않다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

임신 2, 3기인 일부에 레닌-안지오텐신 시스템에 직접적으로 작용하는 약을 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지 유발할 수 있다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다. (2. 다음 환자에는 투여하지 말 것, 7. 임부에 대한 투여 및 8. 수유부에 대한 투여 할 참조)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약에 함유된 성분들에 대하여 과민증이 있는 환자
- 2) 티아지드계 이뇨제 및 설펜아미드 계열 약물에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 3) 임부 또는 수유부 (7. 임부에 대한 투여 및 8. 수유부에 대한 투여 할 참조)
- 4) 급성 또는 중증의 신장에 환자 (creatinine clearance < 30ml/min), 무뇨환자
- 5) 중증 간장애환자
- 6) 당도폐쇄환자, 당중성간경변, 당중분비정지환자
- 7) 지나트륨혈증, 저칼륨혈증, 고칼슘혈증 및 증상성 고요산혈증(통풍 또는 요산 및 그 병력이 있는 환자)을 치료중인 환자
- 8) 에디스병 환자
- 9) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 10) 알리스키렌 제제를 복용 중인 당뇨병 환자 및/또는 중등도-중증의 신장애(사구체여과율 <60ml/min/1.73m²)환자 (5. 약물상호작용 할 참조)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 혈액량이나 염기 감소된 환자 (예: 고용량의 이뇨제를 투여한 경우)와 같이 레닌-안지오텐신계가 활성화된 환자에게서 이 약을 투여한 초기에 저혈압 증상이 나타날 수 있으므로, 이 약을 투여하기 전에 적절한 조치를 취하여야 한다. 이러한 환자는 상태를 충분히 관찰하면서 치료를 시작해야 한다. 만약 저혈압이 발생하면, 환자를 바로 누이고, 필요시 생리식염수를 정적 정맥주사한다. 일시적으로 저혈압 반응이 나타난다 해도 이후 치료가 계속 시행됨을 나타내는 것은 아니며, 일반적으로 혈압이 안정화되면 별다른 어려움 없이 치료를 계속 할 수 있다.
- 2) 레닌-안지오텐신-알도스테론 억제 레닌-안지오텐신-알도스테론계를 억제하기 때문에, 이 약을 투여한 민감한 환자의 경우 신기능능의 변화가 올 수 있다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계의 활성화에 의존하는 환자(예: 심한 울혈성 심부전 환자)에서 ACE저해제나 안지오텐신 수용체 저해제를 사용한 치료는 심노증, 진행성 고질소혈증, (드물게) 급성 신부전 또는 사망이 수반될 수 있다. 이와 유사한 결과가 이 약을 투여한 경우에도 나타날 수 있다.
- 3) 신장애환자 및 신장이식환자 신장기능이상 환자에게 이 약을 투여한 경우 혈청 칼륨과 크레아티닌, 요산 수치를 주기적으로 모니터링할 필요가 있다. 중증 신장애 환자 (creatinine clearance < 30ml/min)에서 이 약의 사용이 권장되지 않으며, 신장이식을 받은 환자에 대한 이 약의 투여에 대해서는 연구된 바 없다.
- 4) 신혈관성 고혈압 환자 단독성 또는 양측성 신동맥협착증 환자에게 ACE 저해제 또는 angiotensin II receptor antagonist를 투여한 연구에서 심한 저혈압과 신장애의 위험이 증가한다. 이 약을 단독성 또는 양측성 신동맥협착증 환자에게 장기간 투여한 경우는 없었으나 비슷한 결과가 예상된다.
- 5) 간장애, 간질환, 진행성 간경변 환자(간성 혼수가 나타날 수 있다.) 티아지드계 이뇨제는 간기능이 손상되었거나 진행성 간질환이 있는 환자에게 사용될 때 혈액량과 전해질의 약간의 변형도 간성혼수를 유발할 수 있기 때문에 주의를 기울여야 한다. 이 약은 경증 및 중등도 간장애 환자에 대한 사용경험이 적으며, 중증 간장애 환자에 대한 사용경험이 없어, 이 약의 사용이 권장되지 않는다.
- 6) 대동맥 및 승모판 협착, 폐색·비후성 심근질환 다른 혈관확장제와 마찬가지로 대동맥이나 승모판 협착증 환자 또는 폐색·비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.
- 7) 원발성알도스테론증 환자 일반적으로 원발성알도스테론증이 있는 환자는 레닌-안지오텐신계를 억제하는 항고혈압제에 대해서 반응성이 없으므로 이런 환자에게 이 약의 투여는 권장되지 않는다.
- 8) 전신성 홍반성 루푸스 환자 티아지드계 이뇨제는 전신성홍반성루푸스를 악화 혹은 활성화시킨다고 알려져 있다.
- 9) 과민반응 히드로클로로티아이드에 대한 과민반응은 알려지지나 기원자천식의 기원력에 관계없이 발생할 수 있으나, 그러한 병력이 있는 경우 과민반응이 나타날 가능성이 더 높다.
- 10) 이뇨제를 연용하는 환자
- 11) 디기탈리스, 당질부신피질호르몬 또는 부신피질자극호르몬의 투여를 받고 있는 환자
- 12) 심한 관동맥경화증 또는 뇌동맥경화증 환자 (급격한 이뇨가 나타날 경우, 급속한 혈장량 감소로 혈액농축을 일으켜 혈전색전증이 나타날 수 있다.)
- 13) 부갑상선기능항진증 환자
- 14) 열제현약법을 받고 있는 환자
- 15) 교감신경절제후의 환자(이 약의 혈압강화작용이 증가할 수 있다.)
- 16) 설사, 구토 환자
- 17) 고령자
- 18) 영아 (전해질평형설조가 나타나기 쉽다.)
- 19) 본인 또는 양친이나 형제에 통풍이나 당뇨병이 있는 환자
- 20) 급성 폐쇄각 녹내장

히드로클로로티아이드, 설펜아미드는 급성 일과성 근시 및 급성 폐쇄각 녹내장을 유발한다. 시력 저하 또는 눈의 통증이 급성으로 시작되고 전형적으로 투여 개시 후 수 시간에서 수 주 이내에 발생한다. 설펜아미드 또는 페니실린 알레르기의 병력이 급성 폐쇄각 녹내장을 발생시키는 위험 요인이 될 수 있다. 급성 폐쇄각 녹내장을 치료하지 않으면 영구적 시력 손실이 될 수 있다. 일차 치료는 가능한 빨리 히드로클로로티아이드의 투여를 중지하는 것이다. 만약 안압이 조절되지 않는다면 즉각적인 약물 또는 외과적 처치를 고려할 필요가 있다.

4. 이상반응

○ 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드의 이상반응

1,243명의 환자에 대해 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드의 안전성을 평가했다. 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드의 내약성이 좋았으며, 이상반응의 발생률이 위약과 유사하였다. 이상반응은 일반적으로 경증이었으며, 일시적이었으며 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드의 복용량과 관련이 적었다. 임상시험에서, 이상반응의 전체 발현빈도는 용량과 관련이 적었다. 성별, 연령과 인종 군에 대한 분석에서 올메사탄메독소밀-히드로클로로티아이드와 위약 투여 환자간에 차이가 없었다. 모든 고혈압 환자에 대한 임상시험에서 이상반응으로 인한 시험중단율은 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드 투여 환자의 경우 2.0%(25/1,243), 위약 투여 환자에서 2.0%(7/342)이었다.

위약 대조 임상 시험에서, 약물과의 관련성과 무관하게 2% 이상에서 발생하고 위약에 비해 더 많이 발생한, 약물관련 이상반응은 다음과 같다.

- 1) 2,3기인 일부에 레닌-안지오텐신 시스템에 직접적으로 작용하는 약을 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지 유발할 수 있다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다. (2. 다음 환자에는 투여하지 말 것, 7. 임부에 대한 투여 및 8. 수유부에 대한 투여 할 참조)
- 2) 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약에 함유된 성분들에 대하여 과민증이 있는 환자
 - 2) 티아지드계 이뇨제 및 설펜아미드 계열 약물에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
 - 3) 임부 또는 수유부 (7. 임부에 대한 투여 및 8. 수유부에 대한 투여 할 참조)
 - 4) 급성 또는 중증의 신장에 환자 (creatinine clearance < 30ml/min), 무뇨환자
 - 5) 중증 간장애환자
 - 6) 당도폐쇄환자, 당중성간경변, 당중분비정지환자
 - 7) 지나트륨혈증, 저칼륨혈증, 고칼슘혈증 및 증상성 고요산혈증(통풍 또는 요산 및 그 병력이 있는 환자)을 치료중인 환자
 - 8) 에디스병 환자
 - 9) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
 - 10) 알리스키렌 제제를 복용 중인 당뇨병 환자 및/또는 중등도-중증의 신장애(사구체여과율 <60ml/min/1.73m²)환자 (5. 약물상호작용 할 참조)
- 3) 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 혈액량이나 염기 감소된 환자 (예: 고용량의 이뇨제를 투여한 경우)와 같이 레닌-안지오텐신계가 활성화된 환자에게서 이 약을 투여한 초기에 저혈압 증상이 나타날 수 있으므로, 이 약을 투여하기 전에 적절한 조치를 취하여야 한다. 이러한 환자는 상태를 충분히 관찰하면서 치료를 시작해야 한다. 만약 저혈압이 발생하면, 환자를 바로 누이고, 필요시 생리식염수를 정적 정맥주사한다. 일시적으로 저혈압 반응이 나타난다 해도 이후 치료가 계속 시행됨을 나타내는 것은 아니며, 일반적으로 혈압이 안정화되면 별다른 어려움 없이 치료를 계속 할 수 있다.
 - 2) 레닌-안지오텐신-알도스테론 억제 레닌-안지오텐신-알도스테론계를 억제하기 때문에, 이 약을 투여한 민감한 환자의 경우 신기능능의 변화가 올 수 있다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계의 활성화에 의존하는 환자(예: 심한 울혈성 심부전 환자)에서 ACE저해제나 안지오텐신 수용체 저해제를 사용한 치료는 심노증, 진행성 고질소혈증, (드물게) 급성 신부전 또는 사망이 수반될 수 있다. 이와 유사한 결과가 이 약을 투여한 경우에도 나타날 수 있다.
 - 3) 신장애환자 및 신장이식환자 신장기능이상 환자에게 이 약을 투여한 경우 혈청 칼륨과 크레아티닌, 요산 수치를 주기적으로 모니터링할 필요가 있다. 중증 신장애 환자 (creatinine clearance < 30ml/min)에서 이 약의 사용이 권장되지 않으며, 신장이식을 받은 환자에 대한 이 약의 투여에 대해서는 연구된 바 없다.
 - 4) 신혈관성 고혈압 환자 단독성 또는 양측성 신동맥협착증 환자에게 ACE 저해제 또는 angiotensin II receptor antagonist를 투여한 연구에서 심한 저혈압과 신장애의 위험이 증가한다. 이 약을 단독성 또는 양측성 신동맥협착증 환자에게 장기간 투여한 경우는 없었으나 비슷한 결과가 예상된다.
 - 5) 간장애, 간질환, 진행성 간경변 환자(간성 혼수가 나타날 수 있다.) 티아지드계 이뇨제는 간기능이 손상되었거나 진행성 간질환이 있는 환자에게 사용될 때 혈액량과 전해질의 약간의 변형도 간성혼수를 유발할 수 있기 때문에 주의를 기울여야 한다. 이 약은 경증 및 중등도 간장애 환자에 대한 사용경험이 적으며, 중증 간장애 환자에 대한 사용경험이 없어, 이 약의 사용이 권장되지 않는다.
 - 6) 대동맥 및 승모판 협착, 폐색·비후성 심근질환 다른 혈관확장제와 마찬가지로 대동맥이나 승모판 협착증 환자 또는 폐색·비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.
 - 7) 원발성알도스테론증 환자 일반적으로 원발성알도스테론증이 있는 환자는 레닌-안지오텐신계를 억제하는 항고혈압제에 대해서 반응성이 없으므로 이런 환자에게 이 약의 투여는 권장되지 않는다.
 - 8) 전신성 홍반성 루푸스 환자 티아지드계 이뇨제는 전신성홍반성루푸스를 악화 혹은 활성화시킨다고 알려져 있다.
 - 9) 과민반응 히드로클로로티아이드에 대한 과민반응은 알려지지나 기원자천식의 기원력에 관계없이 발생할 수 있으나, 그러한 병력이 있는 경우 과민반응이 나타날 가능성이 더 높다.
 - 10) 이뇨제를 연용하는 환자
 - 11) 디기탈리스, 당질부신피질호르몬 또는 부신피질자극호르몬의 투여를 받고 있는 환자
 - 12) 심한 관동맥경화증 또는 뇌동맥경화증 환자 (급격한 이뇨가 나타날 경우, 급속한 혈장량 감소로 혈액농축을 일으켜 혈전색전증이 나타날 수 있다.)
 - 13) 부갑상선기능항진증 환자
 - 14) 열제현약법을 받고 있는 환자
 - 15) 교감신경절제후의 환자(이 약의 혈압강화작용이 증가할 수 있다.)
 - 16) 설사, 구토 환자
 - 17) 고령자
 - 18) 영아 (전해질평형설조가 나타나기 쉽다.)
 - 19) 본인 또는 양친이나 형제에 통풍이나 당뇨병이 있는 환자
 - 20) 급성 폐쇄각 녹내장

히드로클로로티아이드, 설펜아미드는 급성 일과성 근시 및 급성 폐쇄각 녹내장을 유발한다. 시력 저하 또는 눈의 통증이 급성으로 시작되고 전형적으로 투여 개시 후 수 시간에서 수 주 이내에 발생한다. 설펜아미드 또는 페니실린 알레르기의 병력이 급성 폐쇄각 녹내장을 발생시키는 위험 요인이 될 수 있다. 급성 폐쇄각 녹내장을 치료하지 않으면 영구적 시력 손실이 될 수 있다. 일차 치료는 가능한 빨리 히드로클로로티아이드의 투여를 중지하는 것이다. 만약 안압이 조절되지 않는다면 즉각적인 약물 또는 외과적 처치를 고려할 필요가 있다.

4. 이상반응

○ 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드의 이상반응

1,243명의 환자에 대해 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드의 안전성을 평가했다. 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드의 내약성이 좋았으며, 이상반응의 발생률이 위약과 유사하였다. 이상반응은 일반적으로 경증이었으며, 일시적이었으며 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드의 복용량과 관련이 적었다. 임상시험에서, 이상반응의 전체 발현빈도는 용량과 관련이 적었다. 성별, 연령과 인종 군에 대한 분석에서 올메사탄메독소밀-히드로클로로티아이드와 위약 투여 환자간에 차이가 없었다. 모든 고혈압 환자에 대한 임상시험에서 이상반응으로 인한 시험중단율은 올메사탄메독소밀/히드로클로로티아이드 투여 환자의 경우 2.0%(25/1,243), 위약 투여 환자에서 2.0%(7/342)이었다.

	Oltmesartan /히드로클로로티아지드 (N=247) (%)	위약 (N=42) (%)	Oltmesartan (N=125) (%)	히드로클로로티아지드 (N=88) (%)
위장관 구역	3	0	2	1
대사 고요산혈증	4	2	0	2
신경계 어지러움	9	2	1	8
호흡기계 상기도 감염	7	0	6	7

2%이상의 비율로 발생했으며 위약군과 비슷하거나 위약군에서 더 많았던 이상반응은 두통과 요로감염이었다. 올메사탄메독소일/히드로클로로티아지드로 1,200명 이상의 고혈압환자를 대상으로 한 대조군, 오피스 리벨 임상시험에서, 치료약물과 관련이 있거나 없거나 1.0% 이상 보고된 다른 이상반응은 다음과 같다.

- 전신: 가슴통증, 요통, 말초부종
- 중추 및 말초신경계: 현기증
- 위장관계: 복통, 소화불량, 위장염, 설사
- 간 및 담즙계: AST상승, GGT 상승, ALT 상승
- 대사 및 영양: 고지혈증, 크레아티닌포도당이나제 상승, 고혈당증
- 근골격계: 관절염, 관절통, 근육통
- 호흡기계: 기침
- 피부 및 부속기관: 발진
- 비뇨기계: 혈뇨

올메사탄메독소일/히드로클로로티아지드를 투여받은 환자 중 안전부종이 1,243명 중 2명에게서 보고되었다. 혈관부종은 올메사탄메독소일이나 올메사탄메독소일/히드로클로로티아지드에 대해서는 보고된 바 없으나, 다른 안지오텐신 II 수용체 길항제에 대해서는 보고되었다.

- 검사치: 대조 임상시험에서 표준검사치에 나타난 임상적으로 중요한 변화는 올메사탄메독소일/히드로클로로티아지드 투여와는 거의 관계가 없었다.
- 크레아티닌, 혈액요소질소(BUN): 50%가 넘는 BUN과 혈청 크레아티닌 증가가 관찰된 환자는 1.3%이었다. BUN 또는 크레아티닌 증가로 올메사탄 메독소일/히드로클로로티아지드의 임상시험을 중단한 환자는 없었다.
- 헤모글로빈과 적혈구용적율: 20%가 넘는 헤모글로빈과 적혈구용적율이 감소된 경우는 위약 투여군에서 각각 0.0%, 0.0%이었으며, 올메사탄 메독소일/히드로클로로티아지드를 투여한 군에서는 각각 0.0%, 0.4%(환자 1명)이었다. 빈혈로 시험을 중단한 환자는 없었다.

<국의 시험 후 조사 결과>

- 전신: 무력증, 혈관부종, 아나필락시스반응, 말초부종
- 소화기계: 구토, 설사
- 대사 및 영양: 고칼륨혈증
- 근골격계: 횡문근융해증
- 비뇨생식계: 급성신부전, 혈중 크레아티닌 증가
- 피부 및 부속기관: 탈모, 가려움증, 두드러기

<국내 시험후 조사 결과>

국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 1,164명의 환자를 대상으로 실시한 시험 후 조사결과 유효사례 발현율은 인과관계와 상관없이 1.12%(13명/1,164명, 18건)로 보고되었다. 두통, 어지러움 각각 0.34%(4명/1,164명, 4건), 소화불량 0.17%(2명/1,164명, 2건), 지나트륨혈증, 빈뇨, 기침 각각 0.09%(1명/1,164명, 1건)으로 조사되었다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응의 발현율은 0.69%(8명/1,164명, 8건)이었다. 어지러움 0.34%(4명/1,164명, 4건), 두통 0.17%(2명/1,164명, 2건), 지나트륨혈증, 빈뇨 각각 0.09%(1명/1,164명, 1건)로 조사되었다. 이 중 중대한 유효사례는 지나트륨혈증 0.09%(1명/1,164명, 1건)이었으며, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 유효사례인 약물유해반응이었다. 예상하지 못한 유효사례는 빈뇨 0.09%(1명/1,164명, 1건)이었으며, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 유효사례인 약물유해반응이었다.

○ 올메사탄메독소일의 이상반응

이 약은 3,825명 이상을 대상으로 안전성이 평가되었고, 여기에는 고혈압증상을 치료받고 있는 환자 3,275명 이상이 대조임상시험을 통해 포함되었다. 이 임상시험에서 약 900명은 최소한 6개월, 525명 이상은 적어도 1년 동안 투약을 받았다. 이 약은, 위약을 투여했을 경우 나타나는 것과 비슷한 내약성을 보였다. 이상반응은 일반적으로 경미하고, 일시적이며 이 약의 투여용량과의 상관관계는 없었다. 전체적인 이상반응 발현빈도는 용량과 관계가 적었다. 이 약과 위약을 투여한 환자간에 성별, 나이, 인종별로 비교했을 때 차이가 없었다. 고혈압 환자에 대한 모든 임상시험에서 이상반응 발현으로 투약을 중단한 경우는 이 약을 투여한 환자의 2.4%(즉, 79/3,278)였고 대조군 환자에서는 2.7%(즉, 32/1,179)였다. 위약대조 임상시험에서 이 약을 투여한 환자에서 유일하게 1% 이상 나타났다. 위약 투여환자보다 더 빈번하게 나타난 이상반응은 어지러움이었다(3% vs. 1%). 위약대조 임상시험에서 이 약을 투여한 환자에서 1% 이상이고, 위약투여 환자에서 유사하거나 더 높은 발현을 보인 다른 이상반응은 요통, 기관지염, 크레아티닌산화효소 증가, 설사, 두통, 혈뇨, 고혈당증, 고트리글리세라이드혈증, 인플루엔자형 증상, 인두염, 비염, 부비강염이다. 기침의 발현은 이 약을 투여한 환자(0.9%)와 위약을 투여한 환자(0.7%)에서 유사하였다. 이 제제의 투여에 기인한 것인지 확실하지 않으나, 대조임상시험 또는 공개시험에서 이 약을 단독투여한 3,100명 이상의 고혈압 환자 중 0.5% 이상에게서 발현된 것으로 보고된 이상반응은 다음과 같다.

- 전신: 가슴통증, 말초부종
- 중추 및 말초신경계: 현기증
- 위장관: 복통, 소화불량, 위장염, 구역
- 심장: 두근거림
- 대사, 영양장애: 고콜레스테롤혈증, 고지혈증, 고요산혈증
- 근골격계: 관절통, 관절염, 근육통
- 피부 및 기타: 발진

안면부종이 이 약 투여환자 중 5명에게서 관찰되었다. 혈관부종은 다른 안지오텐신 II 저해제에서 보고되어 왔다.

검사치: 대조 임상시험에서 표준검사치에 나타난 임상적으로 중요한 변화는 이 약의 투여와는 관계가 없었다.

- 헤모글로빈과 적혈구용적율: 수치가 약간 저하되었다. (평균 감소 각각 0.3g/dL, 0.3 용량비율)
- 간기능시험: 간효소나 빌리루빈 수치가 증가되는 것이 드물게 관찰되었다. 이 약 투여환자 중 5명(0.1%)과 위약투여환자 1명(0.2%)이 간기능 검사치 이상(트랜스아미나아제 또는 총빌리루빈)으로 투약이 중지되었다. 5명의 환자 중 3명은 알콜 섭취로 인한 트랜스아미나아제 증가로 중단하였고, 한 명의 환자는 빌리루빈 수치가 증가하였으나 치료가 진행되면서 정상화되었다.

<국의 시험 후 조사 결과>

- 전신: 무력증, 혈관부종, 아나필락시스반응
- 소화기계: 구토, 만성복수불량증(sprue) -유사 정질한(6. 일반적주의 항 참조)
- 근골격계: 횡문근융해증
- 대사 및 영양: 고칼륨혈증
- 비뇨생식계: 급성신부전, 혈중 크레아티닌 상승
- 피부 및 부속기관: 탈모, 가려움증, 두드러기

국내 시판 후 조사 결과 : 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 3,164명의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 유효사례 발현율은 인과관계와 상관없이 0.88%(28명/3,164명, 34건)로 보고되었다. 어지러움(체위성어지러움 포함) 0.32%(10명/3,164명, 10건), 두통 0.22%(7명/3,164명, 7건), 두근거림 0.06%(2명/3,164명, 2건), 고갈증혈증, 혈압상승, 안면부종, 요통, 혈중크레아티닌 증가, 복통, 설사, 가슴통증, 말초부종, 기려움증, 기침, 비출혈, 상기도감염, 천식 각각 0.03%(1명/3,164명, 1건)이었다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 유효사례인 약물유해반응 발현율은 0.41%(13명/3,164명, 16건)로 어지러움(체위성어지러움 포함) 0.19%(6명/3,164명, 6건), 두통 0.13%(4명/3,164명, 4건), 고갈증혈증, 혈압상승, 안면부종, 혈중크레아티닌 증가, 말초부종, 기침 각각 0.03%(1명/3,164명, 1건)로 조사되었다. 이 중 중대한 유효사례는 보고되지 않았으며, 예상하지 못한 유효사례는 혈압상승, 비출혈, 천식 각각 0.03%(1명/3,164명, 1건)이었으며, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 유효사례인 약물유해반응은 혈압상승이었다.

○ 히드로클로로티아지드의 이상반응

- 1) 대사 : 지칼륨혈증, 지나트륨혈증, 저마그네슘혈증, 저염소혈증성 알칼리증, 고칼슘혈증 등의 전해질평형실조가 나타날 수 있으므로 신중히 투여한다. 또한 고요산혈증, 고혈당증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정될 경우에는 감량 또는 휴약 등의 적절한 처치를 한다. 또한 동통, 골다공증을, 중성지방상승이 나타날 수 있다.
- 2) 혈액 : 드물게 혈소판감소, 백혈구감소, 재생불량성 빈혈, 용혈성 빈혈, 자반 등의 혈액장애가 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정될 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 소화기 : 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 구갈, 복부불쾌감, 변비, 복부선통, 체중감, 황달, (간내 담즙울체성 황달), 설사, 타액선염, 구강건조, 변비 드물게 위통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 정신신경계 : 어지러움, 두통, 피로, 졸음, 감정둔마, 안절부절증 등이 나타날 수 있다.
- 5) 호흡기계 : 드물게 간질성 폐렴, 폐부종이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 6) 순환기계 : 두근거림, 때때로 가림성 저혈압, 드물게 부정맥 등이 나타날 수 있다.
- 7) 눈 : 드물게 일시적 시력불선명, 황시 등의 시력장애가 나타날 수 있다.
- 8) 간장 : 드물게 황달, 간염, 급성 담낭염이 나타날 수 있다.
- 9) 과민증 : 과다한 혈관염(혈관염과 피부혈관염), 간질성 폐렴과 폐부종으로 인한 호흡곤란, 발진, 두드러기, 안면홍조, 광과민증, 아나필락시스 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 10) 신장 : BUN, 크레아티닌 상승, 급성 신장애, 간질성 신염, 신기능 장애 등이 나타날 수 있다.
- 11) 기타 : 때때로 권태감, 코막힘, 발기부전, 드물게 전신성 홍반성 루푸스(SLE)의 악화, 고칼슘혈증 등을 수반하는 부갑상선장애, 근경련이 나타날 수 있다. 또한 감각이상도 나타날 수 있다.
- 12) 전신 : 허약
- 13) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군을 포함한 다형홍반, 탈락피부염, 독성피부괴사증

5. 약물상호작용

○ 유효사례예독소임과 관련된 약물상호작용

- 1) 칼륨 보급제 및 칼륨 보존 이뇨제 : 레닌안지오텐신계에 작용하는 다른 약물들의 투여를 살펴보면, 칼륨보존 이뇨제, 칼륨보급제, 칼륨염을 함유하고 있는 제제 또는 혈청칼륨치를 증가시킬 수 있는 제제(해파란)와 이 약을 병용투여할 경우 혈청칼륨치는 상승할 수 있다.
- 2) 다른 항고혈압제와 병용투여시 이 약의 혈압 강하 효과는 증가될 수 있다.
- 3) 리튬 : ACE저해제와 리튬을 병용 투여할 경우 혈청 리튬이 가역적으로 상승, 독성이 나타났다는 보고가 있다. 이 약에서도 이러한 현상이 매우 드물게 보고되었으므로 이 약과 리튬의 병용투여는 권장되지 않는다.
- 4) 비스테로이드성 소염진통제 : 다른 안지오텐신 II 저해제와 비스테로이드성 소염진통제 (예, 1일 3g 이상의 아스피린, COX-2 저해제) 병용시 사구체여과를 감소가 증가될 수 있다. 이러한 위험성은 급성 신부전환자에서 증가된다. 따라서, 치료를 시작할 때 수분을 보충하면서 신기능을 모니터링할 것을 권장한다. 또한 다른 안지오텐신 II 저해제와 마찬가지로 이 약의 항고혈압 작용은 비스테로이드성 소염진통제에 의해 약해질 수 있다.
- 5) 레닌-안지오텐신계의 이중 차단
안지오텐신 수용체 차단제(ARB), 안지오텐신 전환 효소 저해제(ACEI) 또는 알리스키렌의 병용투여에 의한 레닌안지오텐신계(Renin-Angiotensin system)의 이중차단은 단독 요법과 비교시 저혈압, 고칼슘혈증, 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 그러므로 이 약과 안지오텐신계에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우 혈압, 신기능 및 전해질농도 등 환자의 상태를 면밀히 관찰해야 한다. 당뇨병 환자 및/또는 신장애 환자(사구체여과율 <60mL/min/1.73m²)에게 이 약과 알리스키렌을 병용투여 하지 않는다.
- 6) 기타 : 이 약을 건강한 자환자에게 다국산 또는 오피오이드 병용투여 했을 때 심각한 약물 상호작용은 보고되지 않았다. 이 약의 생체내 이용률은 제산제[Al(OH)₃/Mg(OH)₂]와 병용 투여시 크게 변화하지 않았다. 이 약은 cytochrome P450 시스템에 의해 대사되지 않으며 P450 효소에도 영향을 주지 않는다. 따라서 이 효소에 의해 억제되거나, 유도 또는 대사되는 약물들과의 상호작용은 예상되지 않는다.

○ 히드로클로로티아지드와 관련된 약물상호작용

- 1) 다른 이뇨제(푸로세미드)와 테르페나딘의 병용투여시 QT 연장, 심실성 부정맥을 일으켰다는 보고가 있으므로 이 약과 테르페나딘을 병용투여 하지 않는다. 또한, 이 약과 아스테미졸의 병용투여시 QT 연장, 심실성 부정맥을 일으킬 수 있으므로 병용투여 하지 않는다.
- 2) 이 약은 노르에피네프린 등의 혈압상승성 아민에 대한 혈관벽의 반응성을 감소시키고 투보쿠리린 및 그 유사화합물의 아민작용을 증가시킨다는 보고가 있으므로 수술전의 환자에게 이 약을 투여하고 있을 경우에는 일시적으로 투여를 중지하는 등 주의한다.
- 3) 바르비탈계 약물, 아편 알칼로이드계 마약과의 병용 또는 음주에 의해 가림성 저혈압이 증가되었다는 보고가 있다.
- 4) 티아지드계 이뇨제는 다른 항고혈압약물(예, 구아네티딘, 메틸도파, 베타-차단제, 혈관이완제, 칼슘통로차단제, ACE차단제, 안지오텐신수용체 차단제(ARB) 및 직접적 레닌 차단제(ORI), 다른 이뇨제, 마취제, 알코올)의 항고혈압 작용을 증강시킨다. 또한 ACE 저해제와 병용투여하는 경우에는 혈압강화작용을 증가시킬 수 있으므로 주의한다.
- 5) 이뇨제의 지칼륨혈증 작용은 칼륨 배설성 이뇨제(예 : 푸로세미드), 코르티코스테로이드, ACTH, 암포데리신, 카르베복솔론, 페니실린G 및 살리실산 유도체 또는 항부정맥제와의 병용 투여에 의해 증가될 수 있다.
- 6) 이 약 투여 중 혈압강하제의 작용이 현저히 감소될 수 있으므로 주의한다.
- 7) 티아지드계 이뇨제에 의한 지칼륨혈증 또는 저마그네슘혈증은 디기탈리스에 의한 심장부정맥을 더 쉽게 유발시킨다.
- 8) 신장을 통한 리튬 배설이 감소되어 리튬에 의한 심독성 및 신경독성이 증가될 수 있으므로 신중히 모니터링 하고 용량을 조절한다.
- 9) 히드로클로로티아지드를 포함한 티아지드계 이뇨제의 용수는 콜레스테라민 및 콜레스티폴로 인해 감소된다.
- 10) 비스테로이드성 소염진통제(예 : 살리실산 유도체, 인도메타신)와의 병용투여는 티아지드계 이뇨제의 이뇨작용과 항고혈압 효과를 약화시킬 수 있다. 합병증으로 저혈량증이 있을 경우 급성 신부전증이 나타날 수 있다.
- 11) 용화칼륨을 병용투여하는 경우에는 이 약에 의해 소장계역 또는 혈액이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 12) 고용량의 살리실산계 약물과 병용투여하는 경우에는 중추신경계에 대한 살리실산계 약물의 작용이 증가될 수 있다.
- 13) 히제와 병용투여하는 경우에는 칼륨배출을 증가시킬 수 있다.
- 14) 부정맥억제인 퀴니딘과 병용투여하는 경우에는 퀴니딘의 배설이 감소될 수 있다.
- 15) 니카민, 에리스로마이신IV, 설도프라이드와 병용투여하는 경우에는 중증의 지칼륨혈증과 서맥이 나타날 수 있으므로 병용 투여를 피한다.
- 16) 티아지드계 이뇨제는 포도당의 내성을 변화시킬 수 있으므로 인슐린이나 경구용 당뇨병약의 용량 조정이 필요할 수 있다. 메트포르민에 의한 췌산혈당의 위험이 있으므로 혈중크레아티닌치가 남성 1.5㎎/dL 이상, 여성 1.2㎎/dL 이상일 경우에는 메트포르민과 이 약을 병용투여하지 않는다.
- 17) 이뇨제에 의한 체액감소 환자에게 요오드함유물질을 병용투여하는 경우에는 투여전에 수분을 공급한다.
- 18) 티아지드계 이뇨제의 생체이용률은 항콜린성 약물(예 : 아트로핀, 비페리딘)과의 병용으로 증가될 수 있으며 이것은 위장관계 운동이 감소되고 위배출시간이 느려지기 때문이다. 반대로 시아프라이드와 같은 위장운동 촉진제는 티아지드계 이뇨제의 생체이용률을 감소시킬 수 있다.
- 19) 티아지드계 이뇨제는 디아족시드의 고혈당 효과를 증가시킬 수 있다.
- 20) 아만타딘과 티아지드계 이뇨제(히드로클로로티아지드 포함)의 병용 투여는 아만타딘에 의한 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있다.
- 21) 항응양제(예, 시클로포스파이드, 메토트렉세이트)와 티아지드계 이뇨제(히드로클로로티아지드 포함)의 병용 투여는 세포독성약물들의 신장배설을 감소시킬 수 있으므로 골수억제 효과를 강화시킬 수 있다.
- 22) 메틸도파와 히드로클로로티아지드의 병용시 용혈성 빈혈이 보고된 바 있다.
- 23) 시클로포스파이드의 병용은 고요산혈증과 통풍형(gout-type) 합병증의 위험을 증가시킬 수 있다.
- 24) tetracycline계와 티아지드계 이뇨제의 병용 투여는 tetracycline에 의한 urea의 증가 위험을 상승시킨다. 이러한 상호작용은 doxycycline에는 적용되지 않는다.
- 25) 티아지드계 이뇨제와 칼슘염류의 병용투여는 세뇨관에서 칼슘 재흡수를 증가시켜 고칼슘혈증을 유발할 수 있다.
- 26) 티아지드계 이뇨제를 비타민 D 또는 칼슘염과 병용시 혈청 칼슘 수치를 증가시킬 수 있다.
- 27) 티아지드계 이뇨제(히드로클로로티아지드 포함)와 알로부리논의 병용 투여는 알로부리논에 대한 과민반응 발생률을 증가시킬 수 있다.
- 28) 혈청 나트륨 수치에 영향을 미치는 약물 : 히드로클로로티아지드와 카바마제핀을 병용투여하는 환자에서 지나트륨혈증이 발생할 수 있다. 따라서 이러한 환자들에게 지나트륨혈증 발현의 가능성에 대하여 알려주어야 하며 적절히 모니터링 하여야 한다.

6. 일반적 주의

1) 대사 및 내분비계에 미치는 영향

티아지드계 이뇨제의 투여는 포도당 불내성을 일으킬 수 있으므로 당뇨병 환자에서는 인슐린이나 경구용 혈당 강하제의 용량 조절이 필요하다. 티아지드계 이뇨제 치료시 장제성 당뇨병이 나타날 수 있다. 또한 티아지드계 이뇨제 치료시 콜레스테롤과 트리글리세라이드의 혈중 농도 증가가 나타날 수 있다. 그러나 이 약 중 혈당하고 있는 12.5mg 용량에서는 효과가 없거나 아주 미미한 것으로 보고된다. 티아지드계 이뇨제 치료를 받은 일부 환자에서는 과요산혈증이 발생하거나 명백한 통풍이 발현될 수 있다.

2) 전해질불균형

이뇨제를 투여받는 환자에 대해 혈청 전해질 수치를 정기적으로 검사하여야 한다. 티아지드계 이뇨제는 체액이나 전해질 불균형(저나트륨혈증, 저염소혈증, 저칼륨혈증)을 초래할 수 있다. 구강건조, 목마름, 허약, 졸음, 불안, 근육의 통증 또는 경련, 근육피로, 저혈압, 요량감소, 빈맥, 오심/구토와 같은 위장관 장애는 체액 또는 전해질 불균형을 나타내는 경고증후이다.

- 고칼륨혈증: 레닌-안지오텐신계에 영향을 주는 약물과 같이 이 약 투여시 특히 심부전이나 신부전 환자의 경우에 고칼륨혈증이 나타날 수 있다. 위험한 기질이 있는 환자에게 이 약을 투여할 경우 혈청 칼륨치를 충분히 모니터링할 필요가 있다. 칼륨 지류성 이뇨제, 칼륨보충제 또는 칼륨 함유 염류들은 이 약과 주의하여 병용하여야 한다.

- 저칼륨혈증: 티아지드계 이뇨제를 사용하면 저칼륨혈증이 발생할 수 있으나 올메사탄에독소일과의 병용투여에 의해 이뇨제에 의해 유발된 저칼륨혈증은 감소될 수 있다. 간경화된 환자, 강한 이뇨제를 투여받고 있던 환자, 전해질 섭취가 부적절한 환자, 코르티코스테로이드나 ACTH를 병용투여받고 있는 환자에서 저칼륨혈증이 일어날 위험이 더 높다.

- 고칼슘혈증: 티아지드계 이뇨제는 칼슘의 뇨분비를 감소시킬 수 있고 칼슘대사의 이상 질환이 없는 상태에서도 혈청 칼슘치를 일시적이고 경미하게 상승시킬 수 있다. 고칼슘혈증은 잠재된 부갑상선 항진증의 증거가 될 수 있으므로 부갑상선기능검사를 실시하기 전에는 티아지드류의 복용을 중단시키도록 한다.

- 저마그네슘혈증: 티아지드계 이뇨제는 뇨중 마그네슘 배설을 증가시킴으로써 저마그네슘 혈증이 나타날 수 있다.

3) 이 약의 아도효과에 급격히 나타날 수 있으므로 전해질평형성소, 탈수예 특히 저용량에서 투여를 시작하여 천천히 증량한다.

4) 연용하는 경우에는 전해질평형성소가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사한다.

5) 혈압강하작용에 의해 어지러움이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

6) 만성흡수불량증(Sprue)-유사 증질환: 국외 시판 후 유행사례로 이 약을 복용한지 수 개월에서 수 년된 환자에서 현격한 체중 감소를 동반한 중증의 만성 설사기 발생된 것이 보고되었다. 환자의 장 조직검사에서 용모수축이 흔히 관찰되었다. 환자가 치료 중에 이와 같은 증상이 생겨 다른 원인이 확인되지 않을 경우, 이 약의 투여 중단을 고려해야 한다.

7. 임부에 대한 투여

1) 태아/신생아 이환율 및 사망률: 임부에게 레닌-안지오텐신 시스템에 직접적으로 작용하는 약물을 투여하면 태아나 신생아의 손상 및 사망이 발생할 수 있으며, 이러한 사례는 안지오텐신 전환 효소(ACE: angiotensin converting enzyme) 저해제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수십례가 보고된 바 있다. 따라서 임신한 사실을 알게 되면, 본제의 복용을 되도록 빨리 중지하여야 한다. 임신 2, 3기 동안 레닌-안지오텐신 시스템에 직접 작용하는 약물을 복용하면, 저혈압, 신생아 두개골 발육부진, 무호흡, 가역적 혹은 비가역적 신부전 및 사망 등의 태아 및 신생아 손상이 일어날 수 있다. 또한 태아의 신기능 저하로 인해 발생한다고 알려진 양수과소증도 보고된 바 있다. 양수과소증은 시기연속, 두개안연 기형, 폐 발육부진등과 관련이 있다. 또한 약물의 배아발달에 대한 영향은 예측할 수 없다. 임신 후 출산, 자궁내 발육부진, 개방 동맥관등도 보고된 바 있다. 이러한 이상반응은 임신 1기에만 국한되는 사실은 자궁내에서의 약물 노출에 의해 발생되는 것 같지는 않다. 배아와 태아에 임신 1기에 한해 안지오텐신 II 수용체 길항제에 노출된 경우 임부에게 반드시 위의 사항을 알려야 한다. 그러나 환자가 임신할 때는 가능한 한 빨리 본제의 복용을 중단하도록 해야 한다. 드물게 안지오텐신 II 수용체 길항제에 대한 선택할 약물이 없을 경우(대체로 전염의 임부 중 한명 꼴 이하로 발현)도 있다. 이 때에는 태아에 대한 잠재적 위험이 존재한다는 사실을 임부에게 알려주어야 하며, 지속적인 초음파 검사로 양수내 환경을 평가해야 한다. 양수과소증이 나타나면, 임부의 생명을 구하기 위한 경우를 제외하고는 본제의 복용을 중단하여야 한다. 임신 주수에 따라서 수축스트레스검사(Contraction Stress Testing), 비부하검사(Non-stress Test) 혹은 생리이학적 프로파일링(Biophysical Profiling)의 검사를 적절하게 수행할 수 있다. 하지만 태아에게 이미 비가역적 장애가 발생한 이후에도 양수과소증이 나타나지 않을 수 있다. 자궁 내에서 안지오텐신 II 수용체 길항제에 노출된 적이 있는 유아의 경우에는 저혈압, 요량감소 및 고칼륨혈증이 있는지 면밀하게 관찰하여야 한다. 만약 요량감소 현상이 있다면 혈압과 신장관류력의 유지에 신경을 써야 한다. 저혈압을 회복시키고, 저하된 신기능을 개선하기 위해 고관수혈이나 투석을 할 수도 있다. 이 약을 임신부에게 투여한 임신 경험은 없다. 이 약을 1,000 mg/kg/day (병명미더 당 밀리그램의 기준으로 볼 때 사람 최대 투여 권장량 (MRHD: maximum recommended human dose)의 240배)까지 임신한 랫드에게 경구로 투여한 경우와 임신한 토끼에게 1 mg/kg/day(사람 최대 투여 권장량의 절반; 더 높은 용량은 토끼에서는 치사량)이므로 태아발육에 대한 영향을 평가할 수 있는 용량은 0.3mg/kg/day로, 이는 사람 최대 투여 권장량인 40mg/day의 약 1/10이다.

2) 티아지드계 이뇨제는 신생아 또는 영아에서 고빌리루빈혈증, 혈소판감소 등을 일으킬 수 있다. 또한, 이뇨효과에 의해 혈청칼슘 감소, 혈액농축, 자궁·태반혈류량 감소가 나타날 수 있으므로 임신 후기에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

8. 수유부에 대한 투여

1) 올메사탄에독소일의 경우 사람에서는 모유로 이행되는지의 여부가 알려져 있지 않으나, 랫드의 경우 낮은 농도로 이행되었다. 영아에게 이상반응이 나타날 가능성이 있으므로 수유부에게 이 약의 중요성을 고려하면서 수유를 중지하거나 이 약 투여를 중지하여야 한다.

2) 티아지드계 이뇨제는 모유 생성을 억제하고 모유중으로의 이행이 보고되어 있으며, 영아에게 이상반응이 나타날 가능성이 있으므로 수유중에는 이 약의 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.

9. 소아에 대한 투여

소아에서의 안전성·유효성은 확립되어 있지 않다.

10. 고령자에 대한 투여

이 약에 대한 임상시험에는 65세 이상의 피험자에 대해서 젊은 피험자와 다른 반응을 보일지를 결정한 만큼의 충분한 숫자가 충분히 포함되지 않았다. 다른 보고된 임상 경험에서는 고령자와 젊은 피험자간의 반응차가 나타나지 않았다. 일반적으로, 고령자에 대한 용량 선택은 조심스러워야 하며, 보통 투여용량범위의 가장 저용량에서 시작을 하고, 고령자에게 빈발하는 간, 신장 및 심장의 기능저하와 동반질환 또는 병용약물 등을 고려하여야 한다.

전반적으로, 최대혈중농도는 젊은 층과 고령층에서 비슷하였고 반복투여했을 때 65세 이상의 고령 환자에서 정상상태(steady state)에서 AUC가 33% 증가하였으며, 이는 신장클리렌스에서 약 30% 감소를 보인 것과 일치한다.

11. 과량 투여시의 처리

이 약의 과량투여시 환자를 면밀히 관찰하고 증상이 나타나 경우 적절히 조치한다. 구토를 유도하거나 위세척을 하는것도 하나의 방법이 될 수 있으며 활성탄을 사용하는 것도 유용할 수 있다. 혈청 전해질과 크레아티닌은 자주 모니터링해야 하며 만약 저혈압이 발생할 경우 환자를 바로 눕히고 양과 체액 대용제를 빨리 공급하여야 한다.

올메사탄에독소일 과다복용으로 인해 가장 빈번히 나타나는 증상은 저혈압, 심계항진 등이다. 부교감흥분성 자극이 일어나는 경우는 서맥이 발생할 수 있다. 하드로콜로로티아지드 과량투여시 사망자가 나타날 수 있는 가장 흔한 증상과 징후는 과도한 이뇨작용으로 인해 생기는 전해질 결핍(저칼륨혈증, 저염소혈증, 저나트륨혈증)과 탈수이다. 과량 투여시 가장 일반적인 중증 및 증상은 오심과 기면이다. 만약 다기탈리스 또한 투여했다면, 저칼륨혈증은 심부정맥이 심화될 수 있다. 올메사탄에독소일은 혈액 투석에 의해 제거되는지는 알려져 있지 않다. 혈액투석으로 하드로콜로로티아지드가 어느 정도 제거되는지는 알려지지 않았다.

12. 기타

1) 이 약 및 다른 안지오텐신 길항제들은 다른 인종보다는 흑인에게서 혈압 저하작용이 다소 적게 나타났다. 이는 일반적으로 흑인 고혈압 환자들 중에서, 레닌 수치가 낮은 환자의 빈도가 더 높기 때문인 것으로 추정된다.

2) 야간에 휴식이 필요한 환자는 야간에 배뇨를 피하기 위하여 오전중에 투여하는 것이 바람직하다.

- 포장단위 : 30정, 200정
- 사용기간 : 제조일로부터 36개월
- 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~25℃)보관
- 제조발매인 : (주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

- * 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- * 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자기장해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
- * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2014년 05월 21일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr/>)의 '의약품등 정보' 내 소비자기장상담실 (080-6111-8690 수신지부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.



제조발매인

(주)동구바이오제약

본사 : 서울특별시 구로구 고척로 222

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

www.dongkoo.com