

항히스타민 & 항알레르기
아르레온정
(에피나스티민산염)

ARREON Tab.

아르레온정은 제 2세대 항히스타민제에 속하여 기존의 제제보다 약효발현이 빠르며 부작용이 적습니다. 생물학적동등성을 입증 받아 효과가 우수하여 안전합니다.

【약리작용 및 특징】

- 1) 알레르기반응의 전기반응에서 말초 H1수용체를 강력히 차단하여 비만세포로부터 histamine의 생성과 분비를 억제합니다.
- 2) 알레르기반응의 후기반응에 관여하는 여러 면역세포로부터의 leukotriene 및 PAF(Platelet Activating Factor)등의 합성 및 유리를 억제하여 합병증작용을 나타냅니다.
- 3) 심독성, 진정 등의 부작용이 없습니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

에피나스티민산염(EP) 10.0mg
첨가제(동등물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

【성상】 흰색 또는 미황색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 기관지천식
2. 알레르기비염
3. 두드러기, 습진·피부염, 피부가려움, 가려움발진(痒疹), 가려움을 동반한 몸드건선

【용법·용량】

1. 천식, 두드러기, 습진·피부염, 피부가려움, 가려움발진(痒疹), 가려움을 동반한 몸드건선
성인: 에피나스티민산염으로서 1일 1회 20mg을 경구 투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.
2. 알레르기비염
성인: 이 약으로서 1일 1회 10~20mg을 경구 투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 않 것.
이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
간질환자 환자 또는 간질환의 병력이 있는 환자(간질환이 악화되거나 재발할 수 있다.)
3. 이상반응
1) 과민반응: 알레르기 반응(예, 발진, 두드러기, 발적), 가려움, 부종(얼굴, 수족 등), 가려움을 동반한 홍반이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
2) 정신신경계: 때때로 졸음, 권태감, 두통, 드물게 어지러움, 불면, 의욕, 미비감, 머리가 멍한 상태 등이 나타날 수 있다.
3) 소화기계: 때때로 구역, 위부불쾌감, 구갈, 복통 드물게 식욕부진, 구토, 위장감, 위궤장, 설사, 변비, 구순건조감, 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
4) 간장: AST, ALT, γ-GTP, ALP, LDH의 상승의 간기능장애, 황달 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 간염 및 기증에 간손상이 있던 환자에서는 증상악화가 심발적으로 보고되었다.
5) 신장: 드물게 단백뇨가 나타날 수 있다.
6) 비뇨기계: 드물게 빈뇨, 혈뇨 등의 방광염양 증상, 요지류가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
7) 순환기계: 때때로 심계항진이 나타날 수 있다.
8) 호흡기계: 드물게 호흡곤란, 거담곤란, 코막힘이 나타날 수 있다.
9) 혈액계: 빈도불명의 혈소판 감소, 드물게 백혈구 증가가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
10) 빈도불명의 여성형 유방, 유방부종, 드물게 월경이상, 화끈거림, 쓴맛,

미각저하, 기침증상 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 기관지 확장제, 스테로이드제 등과는 달리, 천식 발작의 증상을 신속히 경감시키는 약제가 아니므로 이런 환자에게는 충분한 설명을 해 줄 필요가 있다.
- 2) 장기 스테로이드제 요법을 받고 있는 환자에서 이 약 투여에 의해 스테로이드제를 감량하게 되는 경우, 충분한 관리 하에 서서히 철회한다.
- 3) 운전능에 대한 임상시험 결과, 이 약이 운전능력에 영향을 미치지 않았다. 그럼에도 불구하고 이 약은 졸음을 초래할 수 있으므로 환자에게 기게 조작 시나 자동차 운전시 주의하도록 권고해야 한다.
- 4) 이 약의 사용에 의해 효과가 확인되지 않은 경우에는 장기투여하지 않도록 주의한다.
- 5) 제절정 환자에게 투여하는 경우에는 호발계절을 고려하여 그 직전에서부터 투약을 시행하여 호발계절이 종료될 때까지 연속투여하는 것이 바람직하다.

5. 상호작용

- 1) 전임상결과에 비추어 볼 때, 이 약이 수면제, 항히스타민제 또는 알코올의 진정작용을 강화시키지는 않을 것으로 보인다. 그러나 이러한 약물과 병용투여한 임상적 경험은 없다.
- 2) 진정효과가 없는 다른 항히스타민제들과는 달리 이 약은 주로 비대칭체로 배설된다. 이 약은 CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 와 상호작용을 전혀 하지 않거나 거의 하지 않는다. 따라서 CYP-450에 의존하여 배설되는 다른 약물들의 대사에 영향을 미치지 않을 것으로 기대된다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신 중의 투여에 관한 안전성은 확립되지 않았으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에 한하여 투여한다(임신전 또는 임신초기시험(랫드에서는 수태율의 저하가 있었고, 기관형성기시험(토끼)에서는 태자치사율은 모두 고농도에서 확인되었다.).
2) 동물실험(랫드)에서 모유중으로 이행한다는 보고가 있으므로 수유중인 여성에게는 투여를 피하고 부득이하게 투여해야 하는 경우에는 수유를 중지한다.
7. 소아에 대한 투여
저체중아, 신생아, 영·유아 및 소아에 대한 안전성은 확립되지 않았다(사용경험이 적다.).
8. 고령자에 대한 투여
고령자에서는 간, 신기능이 저하된 경우가 많고 흡수될 이 약은 주로 신장에서 배설되므로 정기적으로 이상반응, 임상증상(발진, 구갈, 위부불쾌감 등)의 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타난 경우 감량(10mg/일) 또는 휴약하는 등의 적절한 처치를 한다.
9. 과량투여시의 처치
1) 증상: 이 약의 과량투여한 경험은 부족하다. 다른 H1-항히스타민제와 마찬가지로 과량투여시 QT간격을 연장시킬 가능성을 배제할 수 없으며 따라서 잠재적으로 부정맥을 일으킬 수 있다. 이러한 증상이 이 약과 관련하여 보고된 적은 없지만 과량투여시 ECG를 모니터링 해야 한다.
2) 처치: 위세척 및/또는 배뇨를 유도한다. 대증치료를 실시한다.
10. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에 있어 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
11. 기타
공작시 투여하는 경우에 식후투여보다 혈중농도가 높아진다는 보고가 있다(기관지천식 및 알레르기비염에 대해서는 취침전 투여, 두드러기, 습진, 피부염, 피부가려움, 가려움발진(痒疹), 가려움을 동반한 몸드건선에 대해서는 식후 투여에서 유효성 및 안전성이 확인되었다.).

【포장단위】 자사제조단위

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국유타스제약(주)

소재지: 한국유타스제약(주) 경기도 화성시 함남읍 제약로3길 99
제 2 차 사: 신원당제약(주) 경기도 화성시 함남읍 제약로2길 71
설립서 작성일 140422

우주약품제조관리기준
KGMP 적용대상제품