


빠른 증상 완화 래피콜 소프 연질캡슐

일반의약품

분류번호: 222 (진해거담제)

[성분 · 함량] 1캡슐 중

클로르페니라민말레산염(KP)	----- 2mg
d-메틸에페드린염산염(KP)	----- 12.5mg
구아이페네신(KP)	----- 50mg
덱스트로메토르판브로화수소산염수화물(KP)	----- 10mg



[성 상] 무색의 투명한 내용물을 함유한 투명한 타원형 연질캡슐

[효능 · 효과] 기침, 가래

[용법 · 용량]

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용 만 8세 이상 ~ 만 11세 미만: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용 ※ 충분한양의 물과 함께 복용합니다.

[사용상 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기) 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

다른 진해(기침을 그치게함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기 용약), 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우라도 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않는 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오. 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 3) 만 7세 이하의 영 · 유아에게는 시럽제를 복용시키십시오. 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 보관하시기 바랍니다.

[사용기한] 외부포장에 표기

※ 불리스트 포장의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.

예) 제조번호 #2001, 사용기한 2015년 1월 6일인 경우 → "2001/ 2015.01.06"로 표시

[포장단위] 10캡슐

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 제품설명서의 최근개정된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성년월일 2014. 5. 1

사용기한은 외부포장에 표기



제조의뢰 · 판매원

유한양행

홈페이지 : www.yuhan.co.kr
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자 요금부담)

본 사 : 서울시 동작구 노량진로 74

공 장 : 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219

제조원 : (주)알피코프, 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7