

일반의약품 정보	일반의약품 정보(계속 됨)
[유효성분] 1정 (300 mg) 중 • 트립토판리딘염산염수화물 (USP) 2.5 mg • 슈도에페드린염산염 (USP) 60 mg	[유효성분] 오스 흡수장애(glucose-galactose maldabsorption) 등의 유전적인 문제 가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
[효능·효과] 코감기, 알레르기 및 혈관운동성 코염에 의한 다음 증 상의 완화: 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물	3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 일을 복용하지 말 것. 1 혈압강화제, 알코 올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제, MAO 억제제, 고강성진통제 심한게 항응고제, 구아니딘, 브레타리움, 베타나이드, 데브라소린, 페닐도 파, 고강성경색증용해제, 식욕억제제, 알레르민류의 신경자극제, α 및 β 아드레날린 제해제(약제)와 병용할때 복용투여하지 않는다. 2 MAO억제 제의 간 작용시간 때문에 MAO억제제 투여 후 15일 후 이 약을 투여한다.
[용법·용량] 성인: 1회 1정, 소아(12~14세): 1회 1/2정, 일 3회 직후 에 복용하십시오.	4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것. 이 약의 투여 중 지 체온저하 및 위장감 기가작 등 주위력을 증진시킬 필요가 있는 일에 중사하 지 않도록 주의한다.
[사용상의 주의사항] 1. 경도 슈도에페드린 함유 약품 복용시 급성 전신성 발진성 반응 (AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.	5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상 의할 것. 1 천식 환자 2 녹내장 환자 3 심질환 및 부정맥 환자 4 당뇨병, 갑 상항진증 환자 5 전립선비대로 인한 배뇨곤란을 겪고 있는 환자 6 시 미만의 소아
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1 이 약에 과민반응 병 력이 있는 환자 2 중증심한 증상의 간 및 신장 장애 환자 3 중증심 한 증상의 관상 심장 질환 환자 4 심한 형상을 수반하는 배뇨곤란을 겪고 있는 환자 5 고혈압 및 관상동맥질환증에 걸린 환자 6 일부 또는 인 신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 2 세 이하의 영아(간헐적이 가) MAO 억제제를 투여중인 환자 9 파라옥시안사환산메탈에 과민반응 환자(파라옥시안사환산메탈 함유제에 한함) 10 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유 당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토	6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 추가 중지하고 의사, 치과의사, 약와 상의할 것. 상단 시 가능한 한 이 항부문세포자균에 노출할 것. 1 열 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반한 경우 2 진정, 졸음, 중 추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한, 발열이 남, 경미한(가벼운) 혈압강하, 시력 장애, 신동통증, 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직근열, 이터트시스, 간담사 및 경직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비 등의 중추신경계 이상이 나타날 경우 3 피부반응, 일시적인 자극물, 자율화관과 등의 과민 반응이 나타날 경우 4 구강, 구역, 구토 등의 소화기계 이상이 나타날
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1 이 약에 과민반응 병 력이 있는 환자 2 중증심한 증상의 간 및 신장 장애 환자 3 중증심 한 증상의 관상 심장 질환 환자 4 심한 형상을 수반하는 배뇨곤란을 겪고 있는 환자 5 고혈압 및 관상동맥질환증에 걸린 환자 6 일부 또는 인 신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 2 세 이하의 영아(간헐적이 가) MAO 억제제를 투여중인 환자 9 파라옥시안사환산메탈에 과민반응 환자(파라옥시안사환산메탈 함유제에 한함) 10 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유 당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토	7. 경도 슈도에페드린 함유 약품 복용시 급성 전신성 발진성 반응 (AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.
[제형·용량] 성인: 1회 1정, 소아(12~14세): 1회 1/2정, 일 3회 직후 에 복용하십시오.	8. 저장상의 주의사항 1 소아의 손이 닿지 곳에 보관한다. 2 직사광선 을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 건조한 곳에 밀봉하여 뚜껑을 꼭 닫 아 보관한다. 3 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것 은 약품의 오용에 따른 사고발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있 으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
[사용상의 주의사항] 1. 경도 슈도에페드린 함유 약품 복용시 급성 전신성 발진성 반응 (AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.	[저장방법 및 사용기간] 차창기밀용기, 실온 (1~30 °C) 보관, 제조일로부터 36개월
[제형·용량] 성인: 1회 1정, 소아(12~14세): 1회 1/2정, 일 3회 직후 에 복용하십시오.	[제제번호 및 사용기간] 별도 표기
[제형·용량] 성인: 1회 1정, 소아(12~14세): 1회 1/2정, 일 3회 직후 에 복용하십시오.	[참가제] • 동물유래성분: 유당수화물(건강한 소, 우유) • 기타참가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탈실드클리어(19C333), 히드록시프로필셀룰로오스
[제형·용량] 성인: 1회 1정, 소아(12~14세): 1회 1/2정, 일 3회 직후 에 복용하십시오.	[성 상] 어린이의 위험 필름코팅정제 ※ 개정연월일: 2022. 09. 28

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의해 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. (구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

* 본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자 상담실 031-319-1975로 문의하십시오.

* 약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다. ☎ 14-3330 : 피해구제 상담 ☎ 1644-6223 : 약품 부작용 신고 · 피해구제 상담

* 제조자: 동인당제약주식회사 / 경기도 시흥시 경계로59

* 판매자: **경보제약**  **동군당물딩스** (가맹점)


일반의약품 | 분류번호:141 |

KyongboPharm
 동군당물딩스
가죽회사

코감기 및 알레르기성 비염 치료제



콧 물
코막힘
재채기
비 염

10정

제품개봉시 포장지에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오

러지피드 정