

기타의 혈액 및 체액용액

안플리코정

사포그릴레이트염산염



기타의 혈액 및 체액용액

전문의약품
분류번호: 03390

안플리코정

Anflico Tabs.

- **성분 · 함량** 1정 중 사포그릴레이트염산염(별규) ... 100mg
- **성상** 흰색의 원형 필름코팅정
- **효능 · 효과** 만성 동맥폐색증(버거씨병, 폐색성동맥경화증, 당뇨병성말초혈관병증등)에 의한 괴양, 동통 및 냉감 등의 허혈성 제증상 개선
- **용법 · 용량** 사포그릴레이트염산염으로서 보통성인 1회 100mg을 1일 3회 식후 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 출혈이 있는 환자(혈우병, 모세혈관위약증, 소화관궤양, 요로출혈, 객혈, 초자체출혈등) (출혈을 증가시킬 가능성이 있다).
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 (임부 · 수유부에의 투여 항 참조)
 - 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 월경기간중인 환자(출혈을 증가시킬 우려가 있다)
 - 출혈경향 및 이러한 소인이 있는 환자(출혈경향을 증가시킬 우려가 있다)
 - 항응고제(와르파린등) 또는 혈소판응집억제작용이 있는 약제(아스피린, 티클로피딘, 실로스타졸 등)를 투여중인 환자(출혈경향을 증가시킬 우려가 있다)
 - 중증의 신장장애가 있는 환자(배설에 영향을 미칠 우려가 있다)
 - 이상반응

이상반응 발현빈도는 때때로 0.1이상~5% 미만, 드물게 0.1% 미만으로 구분하였다.

 - 간장 : 때때로 빌리루빈, AST, ALT, ALP, γ -GTP, LDH의 상승 등을 수반하는 간기능장애 및 황달 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 과민증 : 때때로 발진, 발적, 드물게 구진, 가려움증이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 홍반, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 소화기계 : 때때로 구역, 이물감(식도), 가슴쓰림, 복통, 변비, 드물게 식욕부진, 복부팽만감, 설사 등이 나타날 수 있다. 구토, 구내염이 나타날 수 있다.
 - 순환기계 : 때때로 심계항진, 숨이 참, 흉통, 안면홍조, 손의 부종 등이 나타날 수 있다.
 - 정신신경계 : 때때로 졸음, 미각이상, 두통, 드물게 어지러움 등이 나타날 수 있다.
 - 신장 : 때때로 단백뇨, 요검혈, BUN 상승, 크레아티닌상승이 나타날 수 있다.
 - 혈액계 : 때때로 빈혈, 드물게 혈소판감소, 백혈구감소 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

무과립구증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

 - 출혈경향 : 때때로 소화관출혈(도혈 및 하혈 등), 비출혈, 비출혈, 피하출혈 등의 출혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 기타 : 때때로 제증상, 혈청중성지방 상승, 혈청콜레스테롤 상승, 혈청알부민 감소, 혈청칼슘 감소, 요당, 요침사, 드물게 부종, 권태감, 마비감, 발열 등이 나타날 수 있다. 인두통, 인두부종, 인두작열감이 나타날 수 있다.
 - 국내에서 제삼사를 위하여 6년 동안 626명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 1례에서 가슴쓰림, 설사, 두통, 소화관출혈, 비출혈, AST · ALT 상승, 빌리루빈 상승, 콜레스테롤 상승, 트리글리세라이드 상승 등이 보고되었다.
 - 일반적작용 - 이 약 투여 중에는 정기적으로 혈액검사를 하는 것이 바람직하다.
 - 상호작용 - 항응고제(와르파린등) 또는 혈소판 응집억제작용이 있는 약물(아스피린, 티클로피딘, 실로스타졸)과 병용투여시 출혈을 조절할 수 있으므로 주의한다.
 - 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 동물시험(캣)에서 태자 사망률 증가 및 신생자 생존율 저하가 보고되었으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않는다.
 - 동물시험(캣)에서 유증종으로의 이행이 보고되었으므로 수유중인 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이 투여할 경우에는 수유를 피한다.
 - 소아에 대한 투여 - 소아에 대한 안전성은 확립되지 않았다(사용경험이 없다).
 - 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 신장, 간장의 생리기능이 저하되는 경우가 많으므로 높은 혈중농도가 지속될 우려가 있으므로 저용량(예로서 150mg/일)으로 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하여 신중히 투여한다.
 - 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
- **저장방법 · 사용기간** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월
- **포장단위** 자사기준
- **제조사** (주)휴온스-충북 제천시 바이오벨리로 100

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된(K.G.M.P)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자: 2014.05.12