

리파란^주 I.V.

(티옥트산)

LIPARAN Inj. (Thioctic acid)

■ 성분·함량 : 1mL 중
티옥트산(KPC) 5.0mg
안정(화)제: 우레아(1.0mg)
첨가제: 탄산수소나트륨, 염산, 주사용수

■ 성 상 : 갈색 앰플에 든 미황색의 등명한 주사액

■ 효능·효과
티옥트산의 수요가 증대되는 경우의 보급(격심한 육체노동시), Leigh증후군(아급성괴사성뇌척수염), 중독성(스트렙토마이신, 가나마이신에 의한) 및 소음성(직업성)의 내이성 난청
1개월 정도의 투여로도 효과가 나타나지 않을 경우에는 지속적으로 사용하지 않는다.

■ 용법·용량
티옥트산으로서 통상 성인 1일 1회 10~25mg을 정맥내 주사한다.
단, 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고
앰플주사제는 용기절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.
2. 이상반응
이 약은 사용성적조사 등 이상반응 발현빈도에 대한 명확한 조사가 실시된 바 없다.
1) 소화기 : 식욕부진, 오심, 설사
2) 기타 : 발진, 두통, 어지러움, 심계항진
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로, 감량하는 등 주의한다.
4. 적응상의 주의
이 약을 정맥내 주사시 주사속도는 가능한 천천히 주사한다.

■ 포장단위 : 10앰플, 50앰플

■ 저장방법 : 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

- * 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

〈이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.〉

작성일자 : 2014. 05. 16
PM.102344(00)

■ 제조의뢰자 : (주)서울제약 : 경기도 시흥시 경제로 59

■ 제 조 자 : 아주약품(주) : 경기도 평택시 산단로 121번길 23