

전문의약품

발핀 연질캡슐 250mg 500mg

Valproic Acid Valpin softcap.

분류번호 : 113(항간질제)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

발프로산(valproic acid)(USP) 250mg, 500mg
첨가제(타르색소) : 250mg-적색40호, 황색5호, 황색203호
500mg-적색40호, 황색5호, 청색1호

【성상】

250mg-무색 내용물이 든 일면 주황색, 일면 흑갈색의 연질캡슐
500mg-투명한 유상물질이 충전된 암갈색의 방형형 연질캡슐

【효능·효과】

간질[결신발작(소발작), 부분발작(조점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작]과 간질에 뒤따르는 성적, 행동장애의 예방과 치료

【용법·용량】

발프로산으로서 초회량으로 1일 체중 kg당 15mg을 경구투여하며, 발작이 억제되거나 간질증상에 따른 부작용이 나타나지 않을 때까지 1주일 동안 1일 체중 kg당 5~10mg까지 증량합니다. 최대 투여량은 1일 체중 kg당 30mg입니다. 1일 최대 투여량이 250mg을 초과하면 분할투여합니다. 위장관의 자극을 경험한 환자는 음식물과 함께 투여하거나 초회량을 저용량에서부터 천천히 증량하여 투여하는 것이 바람직합니다. 구강 및 인후의 자극을 피하기 위하여 이 약을 씹지 말고 삼켜야 합니다. 연령, 증상에 따라 적절한 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 항간질약을 복용한 환자에서 자살충동 또는 자살행동을 보이는 위험성이 증가되므로 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화에 대하여 모니터링되어야 합니다.
- 항간질약을 처방하는 간질과 다른 많은 질병은 그 자체가 이환 및 사망, 치료기간 동안의 자살충동과 자살행동의 위험성증가와 관련됩니다. 따라서 처방자는 항간질약 처방시 환자의 치료기간 동안 자살충동 또는 자살행동과 치료된 질병간의 연관성 유무 및 약의 유효성을 함께 고려해야 합니다.
- 때때로 치명적인 수도 있는 심한 간손상이 예외적으로 보고된 바 있습니다. 특히 복합 항경련 치료를 받는 환자의 경우에 선전성 대사 장애, 퇴행성 질환, 뇌의 기질 장애 또는 정신 지체를 수반한 심한 발작성 질환을 갖는 3세 미만의 소아 및 유아는 위험이 큼니다. 3세 이상에는 발현 빈도가 상당히 감소되어 나이가 들수록 점차로 줄어듭니다. 이러한 환자군에 투여시 이 약을 단독 요법으로 사용해야 하고 특별한 주의가 필요합니다. 대부분 간손상은 치료 첫 6개월(특히 2~12주 사이) 안에 관찰되었습니다. 조기 진단을 위해서 환자의 증상을 관찰하는 것이 필수적입니다. 심각한 혹은 치명적인 간손상에 앞서 발작 빈도 증가, 육체적 권태감, 식욕감퇴, 상복부 통증, 구토, 다양한 형태의 국소적 혹은 전신적 부종 그리고 기면상태, 탈진, 졸음과 같은 비특이적인 증상들이 선행될 수 있으므로 이러한 증상 발현을 면밀히 모니터링해야 합니다. 환자(또는 어린아이인 경우 가족)는 이러한 증상이 나타나면 즉시 어떠한 증상이더라도 의사에게 보고하여야 하며, 의사는 임상상 및 간기능에 대한 생물학적 검사를 포함한 조사를 즉시 수행하여야 합니다. 이 약 투여시 전과 투여후 처음 6개월 동안 정기적으로 간기능 검사가 실시되어야 합니다. 이중에서 단백질 합성을 반영하는 검사, 특히 프로트롬빈율(prothrombin rate)이 가장 유효합니다. 다른 생물학적 비정상치(피브리노겐과 응집 인자의 감소, 빌리루빈 농도의 증가, 트랜스아미나제의 상승)과 더불어 프로트롬빈 수치가 비정상적으로 낮을 경우 약물의 투여를 중지합니다. 살리실산 유도제를 병용할 경우 두 약물이 동일한 대사 경로를 거치므로 이 약의 투여를 중지해야 합니다.
- 치명적인 수도 있는 심한 혈장염이 매우 드물게 보고되었습니다. 어린이에게서 특히 위험하며 나이가 들수록 그 위험성이 줄어듭니다. 증상의 발작, 신경계 이상 또는 항간질약 병용 투여가 위험 인자들입니다. 혈장염을 동반한 간부전 및 신부전은 치명적인 결과를 초래할 위험도를 증가시킵니다. 예외적으로 혈장염이 보고되었습니다. 따라서 급성 병용이 있는 환자의 경우 신속한 의학적 평가가 이루어져야 합니다. 혈장염인 경우 이 약의 투여를 중지합니다.
- 임산부에 대한 사용 : 발프로산은 신경관 이상(예: 이분척추)과 같은 태아기형을 유발할 수 있으며, 태아가 자궁 내 노출시 낮은 IQ정수를 유발할 수 있습니다. 발프로산은 간질이 있는 임산부를 치료할 때 다른 약물이 이러한 증상을 조절하는데 실패하거나 다른 약물을 복용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다. 임신할 가능성이 있는 여성에 대한 사용 여부는 이 약의 사용에 대한 유익성이 태아의 선천적 기형 위험성을 상회할 경우 매우 신중한 평가를 한 후 결정되어야 합니다. 이러한 결정은 이미 이 약을 투여받고 있는 여성이 임신을 계획하기 전 뿐만 아니라 이 약을 처음으로 처방받기 전에도 이루어져야 합니다. 발프로산을 복용하는 여성들은 효과적인 피임법을 사용해야 합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 이 약, 이 약 성분, 디발프로산염, 발프로미드에 과민증 환자
- 간 질환 또는 그 병력이 있는 환자, 현재 간 또는 췌장에 심각한 기능 이상이 있는 환자
- 간 질환의 가족력이 있는 환자
- 이 약 투여중 간기능 장애로 사망한 형태, 자제가 있는 환자
- 카바페페미트 항생물질(메타디론, 메로페뎀, 이미페뎀, 실라스타틴, 파니페뎀)을 투여 중인 환자
- 포르피린증 환자
- 메플로린을 투여중인 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 다음 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여합니다. : 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 췌장장애 또는 선천성 소아 결핵 환자
- 골수손상의 병력이 있는 환자
- 약물 과민증 환자
- 신부전 환자 및 저단백혈증 환자
- 혈액응고장애 또는 저혈소판증 환자
- 여러 항간질제와의 병용투여가 필요한 유아 및 소아
- 중복투여와 심각한 형태의 간질을 가지고 있는 소아 및 청소년
- 이 약은 황색5호(신셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

4. 이상반응

- 간·담도계 : 자주 간기능 검사치 변화, 드물게 심각한 간 손상이 나타날 수 있습니다.
- 정신신경계 : 이 약의 투여기간 동안 발작의 빈도가 증가 또는 그와 관계없이 몇 건의 의식혼미와 기면 상태가 보고되었으며 때때로 일시적인 혼수 상태(병적)로까지 이르게 되었습니다. 치료를 중단하거나 용량을 감소하면 그 빈도는 줄어듭니다. 이러한 경우는 대부분 병용투여(특히 페노바르비탈 또는 토피라메이트와의 병용)할 때 또는 이 약의 용량을 갑자기 증가시킬 때 나타납니다. 약물 중단 이후 몇주 내지 몇 개월 후에 가역적인 잠정성 및 진행성 발현을 하는 인지장애(완전한 치매 증상으로 진행할 수 있습니다.)가 매우 드물게 보고되었습니다. 단편적인 가역적 파킨슨증이 보고된 바 있습니다. 또한, 일시적 그리고/또는 용량과 관련되어 나타나는 체위성 미세 진전 및 졸음이 종종 보고되었습니다. 또한 진정 효과는 발프로산 단독 투여시에도 나타났으나, 대부분 병용요법을 받는 환자에서 자주 나타났습니다. 진정효과와는 다른 항간질약의 투여를 감소시키면 소실됩니다. 진전은 발프로산을 투여중인 환자에서 보고되었으며 용량의존적이었습니다. 운동실조, 두통, 적란, 경련, 경면, 진전, 실조, 드물게 환각, 어지러움, 불면, 불안, 시각이상, 안구진동, 복시, 고정부제 불능, 눈앞에 점이 보이는 현상, 구음장애, 감각 변화, 과다 침분비 등이 나타나는 경우도 있습니다 이상이 발견되면 감량 등 적절한 처치를 합니다. 드물게 발프로산 단독 또는 페노바르비탈과 병용투여한 환자에서 혼수가 나타났으며 고암모니아혈증을 수반한 의식장애가 나타났습니다. 대부분의 환자는 투여를 중지함으로써 증상이 개선되고 회복되었으며 또한 정서적 혼란, 우울, 정신병, 공격성, 행동과다증, 행동치매가 보고되었습니다. 간기능 검사 수치에는 변화를 수반하지 않는 단편적인 증증도의 고암모니아혈증이 특히, 복합요법에서 종종 발생할 수 있으나 투여를 중지해서는 안됩니다. 또한, 신경계 증상(혼수로 진전 가능성이 있습니다.)과 관련되어 나타나는 고암모니아혈증이 보고된 바 있습니다. 이러한 경우, 추가적인 검사가 고려되어야 합니다. 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화를 보입니다. 11종의 다른 항간질약을 사용하여 199개의 위약-대조 임상 시험(단독요법과 병용요법)을 분석한 결과 항간질약 복용환자는 위약-대조 환자와 비교시 약 2배의 자살충동 또는 자살행동의 위험을 보였습니다. 12주의 치료기간 동안 자살충동 또는 자살충동 발병율은 27.86%의 항간질약 치료환자에서 0.43%였으며 16,029명의 위약 투여 환자에서는 0.24%였습니다.

이는 치료받은 530명 환자 중 한명은 자살충동 또는 자살행동을 보인 것을 의미합니다. 동 약물 치료 환자에서 4건의 자살이 있었고 위약 치료 환자에서의 자살은 없었습니다. 그러나, 자살 예수가 너무 적어 이 약과 자살의 연관성을 결론지을 수는 없습니다. 항간질약 복용에 의한 자살충동 또는 자살행동의 위험증가는 약물치료를 시작 초기 1주에 관찰되었고 치료기간 동안 지속되었습니다. 대부분의 임상시험은 24주 이상을 초과할 수 없었으며 24주를 초과한 자살충동 또는 자살행동의 위험은 평가할 수 없었습니다. 자살충동 또는 자살행동 위험은 분석된 11종의 항간질약에서 일관적이었습니다. 다양한 작용기전과 사용범위를 가진 항간질약에서의 위험성 증가는 어떤 요동으로도 사용된 모든 항간질약에 대해서도 위험성이 있음을 나타냅니다. 그 위험성은 분석된 임상시험에서 연령(5~100세)에 따라 차이가 나지는 않았습니다.

- 소화기계 : 식욕항진을 동반한 비정상적 체중 증가, 복통, 때때로 식욕부진, 위부 불쾌감, 변비 또는 드물게 구내염 등이 나타나는 경우가 있으므로 이상이 나타나는 경우에는 감량하는 등 적절한 처치를 합니다. 또한, 구역, 위통, 구토, 설사와 같은 위장관계 이상이 일부 환자들에게 투여 초기에 종종 나타날 수 있으나, 보통 투여를 중지하지 않아도 수일 이내에 사라집니다. 매우 드물게 치명적인 경우를 포함한 혈장염이 보고되었으며, 이러한 경우 즉시 투여를 중단합니다.
- 내분비계 : 발프로산을 투여한 환자에서 자주 불규칙한 월경 및 속발성 무월경, 다낭 난소증후군, 드물게 가슴비대, 유즙누출증, 안드로겐과다혈증이 보고되었으며 비정상적인 갑상선기능 검사도 보고되었습니다.
- 피부 및 피하조직 : 자주 일시적 및/또는 용량과 관련된 탈모, 모발 퇴색(hair fading), 곱슬머리(hair curling), 드물게 피부발진, 다형홍반, 피부경막인후증군(스티븐스-존슨 증후군), 증독성 표피괴사증(리얼 증후군)이 나타났다는 보고가 있습니다. 발진성 홍반과 같은 피부반응이 이 약 투여시 발생할 수 있습니다.
- 근골격계 : 무력증이 보고되었습니다.
- 혈액 및 림프계 : 일반적으로 관련된 임상증상은 없으면서 피브리노겐 또는 응고 인자 VIII의 농도 감소 또는 출혈시간의 연장 증가는 보고된 바 있으나 보통 과량투여시 나타났습니다(이 약은 혈소판 응집력상 중 2단계 반응을 억제합니다.). 과립구신혈증이 보고되었으며 이는 비특이적 과립구신혈증이 있는 환자에서 치명적일 수 있습니다. 빈혈, 만성적 구멍가, 혈혈구감소, 백혈구감소, 혈소판감소, 용혈성빈혈, 거대적아구증, 과립구감소증, 호산구증가, 혈소판응집증 저하, 림프구감소, 호중구감소 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 감량, 휴약 등 적절한 처치를 합니다. 점상 출혈, 과다, 혈중생성, 진성출혈, 순수 적혈구 무형성증을 포함한 골수부전이 보고되었습니다.
- 귀와 비강기관 : 가역적 또는 비가역적인 난청이 드물게 보고되었으나, 그 원인과 효과의 관계는 명확히 밝혀지지 않았습니다. 아주 드물게 이명이 나타났습니다.
- 신장 및 비뇨생식기계 : 드물게 간질성 신염이 일어날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정될 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다. 야뇨증이 매우 드물게 보고되었습니다. 이 약 투여와 관련하여 단편적인 가역적 관코나 증후군이 발생하였다는 보고가 있으나, 그 작용기전은 아직 알려지지 않았습니다.
- 대상 및 영양장애 : 드물게 고인슐린혈증, 인슐린 유사 성장인자 결합단백 [IGFBP-1] 감소, 체중 저하, 매우 드물게 저나트륨혈증, 항이뇨호르몬 분비이상 증후군(SIADH)이 나타날 수 있습니다.
- 면역계 : 알레르기 반응, 혈관부종, DRESS증후군(Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndrome)
- 선천적, 유전적인 질환 : 7. 임부 및 수유부에 대한 투여 : 항목을 참고하십시오.
- 기타 : 혼반성 낭창, 혈관염, 알러지 반응, 뇌허혈, 치매, 혈뇨, 구갈, 가금 권태감, 비출혈, 매우 드물게 전신적 또는 국소적 부종이 나타나는 경우가 있습니다. 체중 감소 또는 증가 나타날 수 있는데 체중 증가는 다낭난소증후군(polycystic ovary syndrome)의 위험 인자가 되므로 주의하여 모니터링하여야 합니다. 또한 푸루스양 증후군이 보고되었습니다.

5. 일반적 주의

- 환자 및 보호자에게 항간질약이 우울증의 징후 및 증상의 발현 또는 악화, 비정상적 기분과 행동의 변화, 자살충동 및 자살행동 또는 자해충동의 위험을 증가시킬 수 있음을 알려 환자에게 이러한 증상 또는 행동이 발현될 경우 즉시 의료전문가에게 보고 될 수 있도록 합니다.
- 3세 미만의 소아에게 이 약을 처방할 경우, 단독요법이 권장되며, 예외적인 경우에만 환자 선택으로 사용됩니다. 그러나, 이 약 처방 전에 반드시 간손상 또는 췌장염의 위험성에 대한 이 약의 유익성이 평가되어야 합니다. 살리실산 유도제와 병용투여는 간 독성의 위험성 및 출혈 위험성 때문에 3세 미만의 소아에게는 투여를 회피합니다.
- 어린이의 경우 이 약 투여후, 투여후 6개월 간은 매월 1회, 그 이후에는 3개월 간격으로 한 번씩 간기능 검사를 실시합니다. 이 약 투여전에는 혈소판을 포함하여 전체 혈구 계산, 응고 수치(트롬보플라스틴 시간), 혈청 아밀라제, AST, ALT, 알카리성 포스파타제, 총 빌리루빈, 단백질, 혈당 검사를 하고, 이 약 투여중에는 특별한 임상적 이상 징후가 없는 한 전체 혈구 계산(혈소판 포함) 및 간 기능 아미노트랜스퍼라제 검사로 충분합니다. 다만, 두 번의 검사중 한번 정도는 응고 수치를 검사합니다. 투여후 1년 이 경과한 후에는 일반적으로 일년에 2~3회 정도 검사합니다.
- 청소년과 성인의 경우 치료 시작전과 치료 시작후 처음 6개월간 정기적으로 간기능 검사를 실시합니다. 다른 항간질약과 마찬가지로 특히 투여 초기에 특별한 임상증상 없이 간효소치의 일시적 증가 현상이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 나타나는 환자들 의 경우 보다 철저한 생물학적 검사(프로트롬빈지 포함)가 실시되어야 합니다. 적절한 시기에 용량조절을 해야 하며 필요한 경우 반복하여 검사를 실시합니다. 또한 간장애와 함께 급격한 의식장애가 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 적절한 처치를 합니다. 심각한 간 기능장애 혹은 혈장손상이 나타나면 이 약 투여를 즉시 중단해야 합니다. 3배까지 증가한 AST와 ALT 수치, 비정상적으로 연장된 프로트롬빈 시간, 알칼리포스파타제와 빌리루빈 수치의 상승과 단백질 수치와 변화 등이 투여중단의 기준으로서 고려될 수 있습니다.
- 연용증에는 정기적으로 신기능 검사와 혈액 검사를 하는 것이 바람직합니다.
- 치료 시작전이나 수술전, 그리고 자연연종도 병이 들거나 출혈이 있는 경우 혈액 검사(혈소판을 포함할 혈구수 측정, 출혈시간, 응집기능 검사)를 실시합니다.
- 신부전 환자의 경우 유리 발프로산의 혈중농도가 증가하므로 감량합니다. 이때, 혈중농도 모니터링 결과가 잘못 인식될 수 있으므로 임상 모니터링 결과에 따라 용량을 조절하여야 합니다.
- 이 약 투여중에 극히 예외적으로 면역 이상이 보고되었으며 전신성홍반성부후스(SLE) 환자에는 치료상의 유익성이 잠재적 위험성을 상회하므로 판단되는 경우에만 투여해야 합니다.
- 예외적으로 췌장염이 보고되었습니다. 따라서 급성 복통 및 구역, 구토 또는 식욕부진 등과 같은 위장관계 증상이 있는 환자의 경우 췌장염의 진단이 이루어져야 하며 췌장 효소치가 상승할 경우 투여를 중지하며 다른 치료법으로 대체합니다.
- 일련 불명의 간-위장관 장애(식욕부진, 구토, 세로 붓고 예민소드), 기면 또는 혼수의 병력이 있거나 정신 지체를 갖는 소아 또는 신생아 또는 유아 사망의 가족력이 있을 경우 대사 기능검사가 특히, 공복시 및 식후 암모니아혈증 검사가 발프로산염 투여전에 실시되어야 합니다.
- 단독 치료인 경우 1주일 동안 최저 용량에 도달하도록 2~3일 간격으로 증량합니다. 다른 항간질약과 병용투여할 경우 2주일 동안 최저 용량에 도달하도록 천천히 증량합니다.
- 이 약은 주로 신장을 통하여 배설되며 일부는 케톤체로서 배설되어 당뇨병 검사시 위양성 결과를 나타내기도 합니다. 발프로산과 관련된 갑상선 기능 검사의 변화가 보고되었습니다. 임상적 유의성은 밝혀진 바 없습니다.
- 정신장애가 자살적인 관념과용으로 발현될 수 있으므로 치료 초기에는 위험성이 높은 환자에 대해 철저한 감독이 수반되어야 합니다.
- 이 약은 중추신경 억제 작용(졸음)을 나타낼 수 있으며 특히 다른 중추신경 억제제(알코올, 벤조디아제핀계 약물 등), 다른 항경련제와 병용투여한 경우에 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계 조작을 하지 않도록 주의합니다.
- 연용증에 있어서 투여량을 급격히 감소하여 중지하는 경우 간질 증할 상태가 나타날 수 있으므로 투여를 중지하는 경우에는 천천히 감량하는 등 신중히 합니다. 또한 고령자 및 쇠약 환자의 경우에는 특히 주의합니다.
- 이 약은 혈장 암모니아 농도를 높일 수 있습니다(고암모니아혈증). 발작 빈도 증가 및 무력증, 졸음, 구토, 저혈압 증상이 나타나면 혈장중 암모니아는 특히 발프로산 농도를 확인해야 합니다. 필요한 경우 용량을 줄입니다.
- 요호외로 효소 결함이 의심되면, 이 약으로 인한 고암모니아혈증의 위험성 때문에 주로 시작 전에 대사기능 검사를 시행하여야 합니다. 요소회로 효소가 부족한 환자는 이 약이 권장되지 않습니다. 의식 혼미 또는 혼수와 관련된 고암모니아혈증이 이러한 환자에서 몇몇 관찰되었습니다.
- 이 약 투여 초기에 환자들에 체중 증가에 대한 위험성을 인식하고 이를 최소화하기 위해 적절한 대책(주로 식이요법)을 세울 수 있도록 하여야 합니다.
- 특히 고용량 투여시 출혈시간 연장 또는 저혈소판증이 나타날 수 있습니다. 예상치 못한 점막 출혈 또는 혈종 경향이 증가한 환자에 대해서는 추가적인 검사를 해야 합니다. 피브리노겐 및 응고 인자(주요 VIII 인자) 감소 또는 빌리루빈 또는 간 효소치 상승과 같은 실험실 검사치의 변화와 함께 트롬보플라스틴 시간이 유의하게 증가한 경우 특별한 주의가 필요합니다. 수술 또는 치과 처치에 앞서 혈소판, 트롬보플라스틴 시간, 출혈시간 및 피브리노겐 검사가 권장됩니다. 골수 손상의 병력이 있는 환자는 면밀히 모니터링 해야 합니다.
- 항간질약의 투여는 몇몇 종류의 간질에서 관찰된 자발적인 변동에 관계없이 드물게 환자에 발작의 재발 또는 새로운 형태의 발작 발현 등이 수반될 수 있으며 발프로산염의 경우 주로 병용투여되는 항간질약 요법의 변경 또는 약동학적 상호작용, 독성 또는 과용량에 기인합니다.

6. 상호작용

- 경련 유발 약물 또는 간질의 역치를 낮추는 약물과의 동시 투여는 신중하게 고려되어야 하며, 위험성의 심각성에 따라 권장되지 않을 수 있습니다. 이러한 약물에 대부분의 항우울제(이미프라민계 약물, 선택성 세로토닌 재흡수 억제제), 신경이완제(네로치아진 및 부티로페네), 메플로린, 부프로피온, 트라마돌 등이 있습니다.

- 카바페페말 및 모노박탈개 항생제(메로페넴, 베타락티몬, 실라스타틴, 파니페넴, 이미페넴(외삽법), 아즈트레오남(외삽법)) 또는 리팜피신을 투여중인 환자 : 이 약의 혈중 농도를 저하시켜 간질 발작이 재발할 수 있습니다. 만약 이러한 항생제들과 이 약의 병용투여 및 투여 중단시에 임상적 모니터링, 이 약의 혈중농도 검사 및 필요하다면 발프로산염의 용량 조정이 권장됩니다.
- 이 약은 발프로산으로 대사되므로 발프로산의 과량 투여를 막기 위하여 동일한 대사 과정을 거치는 다른 약물(예 : 디발프로산염, 발프로미드)과 병용투여하지 않도록 합니다.
- 이미프라민 항우울약은 경련 발작을 유발할 수 있으므로 병용투여시 환자의 상태를 면밀히 관찰한 후 항간질약의 용량을 조절할 필요가 있습니다.
- 이 약은 페노바르비탈의 혈중농도를 증가시키기 때문에(간대사를 억제합니다.) 특히 소아에게서 진정작용이 나타날 수 있습니다. 또한 페노바르비탈에 의한 간 대사 증가로 인하여 발프로산의 혈중농도가 감소할 수 있습니다. 따라서 병용 투여시에는 처음 15일 동안 환자의 상태를 면밀히 관찰하고 만약 진정작용이 나타나면 즉시 페노바르비탈의 용량을 감소시키고 혈중농도를 체크합니다. 발프로산은 청소를 감소의 원인이 될 수 있다는 증거가 있습니다. 이러한 현상은 심한 중추신경계 쇠약을 초래할 수 있습니다(페노바르비탈 1회 60mg 투여시 반감기 50% 증가, 혈장 청소를 30% 감소). 발프로산과 페노바르비탈의 병용이 바르비탈염 또는 발프로산 혈청치의 현저한 상승 없이 중추신경계 쇠약을 일으킨다는 보고도 있습니다. 바르비탈염 병용요법을 받고 있는 모든 환자는 신경계 독성에 대해 면밀히 모니터링합니다. 가능한 한 바르비탈산염 혈중농도를 측정하여야 하며, 필요시에는 바르비탈산염 용량을 적절하게 감량합니다.
- 이 약은 프리미돈의 혈중 농도를 증가시켜 프리미돈의 부작용(예를 들어 진정작용)을 악화시키는데 이러한 작용은 장기간 투여시에 없어집니다. 또한 프리미돈에 의한 간 대사 증가로 인하여 발프로산의 혈중농도가 감소할 수 있습니다. 특히 병용 투여의 초기에는 환자의 상태를 면밀히 관찰하고 진정 작용이 나타날 경우 용량을 감소하고 혈중 농도를 모니터링합니다.
- 발프로산과 페니토인의 병용 투여시 발작의 악화에 대해 보고 되었습니다. 대부분의 연구는 페니토인의 총 혈중농도의 감소를 기술하고 있습니다. 그러나 페니토인 총 혈중농도의 증가도 보고되었습니다. 페니토인 총 혈중농도는 초기에 감소하고 이후에는 증가한다고도 보고 되었습니다. 유리형 페니토인과 단백질결합 페니토인의 혈중 농도비의 증가와 함께 페니토인 총 혈중농도는 감소한다고 보고되었습니다. 페니토인의 용량은 임상측면의 요구에 따라 조절되어야 합니다. 특히 유리형 페니토인의 증가로 과량증상에 의한 증상이 나타날 수 있으므로(발프로산은 페니토인 대신 혈장단백질과 결합하여 이 약물의 간대사를 감소시킵니다.) 환자의 상태를 면밀히 관찰하고 페니토인의 혈중농도를 검사할 때 유리형의 농도도 체크해야 합니다. 또한 페니토인에 의한 간 대사 증가로 인하여 발프로산의 혈중 농도가 감소할 수 있습니다. 따라서 임상적 모니터링, 혈중 검사 및 필요하다면 두 항간질약의 용량을 조절합니다.
- 효소유도 효과를 가진 항간질약(페니토인, 페노바르비탈, 카르바마제핀 포함)은 발프로산 나트륨의 혈중농도를 감소시키므로 병용투여시 임상반응과 혈중 농도에 따라 용량을 조절해야 합니다. 이러한 효소유도 약물과의 병용투여는 간독성 그리고 고암모니아혈증의 위험성을 증가시킵니다. 특히 이 약은 카르바마제핀과 병용투여시 카르바마제핀의 독성을 증가시켜서 임상독성이 보고된 바 있습니다. 따라서, 특히 병용투여 초기에 임상 모니터링이 권장되고 필요시 적절한 시기에 용량을 조절합니다.
- 이 약은 혈중 지도부딘의 농도를 증가시켜 지도부딘의 독성을 증가시킬 수 있습니다.
- 베를로판은 발프로산의 대사를 증가시키며 경련 효과를 가지고 있으므로 병용투여시 간질성 발작이 없어질 수 있으므로 병용투여하지 않습니다.
- 이 약과 항응고제(와파린) 또는 아스피린을 병용투여할 경우 출혈 경향이 증가할 수 있습니다. 아스피린은 또한 발프로산의 혈장단백 결합을 감소시킬 수 있습니다. 따라서 정기적으로 혈액응고상을 모니터링하는 것이 바람직합니다. 발발 및 통풍이 있는 경우, 특히 유아에는 이 약과 아스피린을 병용투여해서는 안됩니다.
- 시메티딘, 플루루세틴 또는 에리스로마이신과 병용투여할 경우 발프로산 나트륨의 간대사를 감소시켜 혈중농도가 증가할 수 있습니다.
- 일반적으로 발프로산나트륨은 효소유도 효과가 없습니다. 따라서 호르몬에 의한 피임요법을 받고 있는 여성에게서 에스트로겐-프로게스테론 제제의 효과를 감소시키지 않습니다.
- 비타민 K 의존성 인자에 대해 작용하는 항응고제와 병용투여할 경우 프로트롬빈 농도에 대한 면밀한 조사가 실시되어야 합니다.
- 이 약은 신경이완제, 바르비탈계 약물, 벤조다이아제핀계 약물(디아제팜, 클로나제팜 등), MAO 억제제, 항정신병약, 항우울약의 혈중농도를 상승시켜 그 작용을 증강하므로 병용투여시 환자의 상태를 면밀히 관찰하고 필요시 용량을 조절합니다.
- 발프로산은 알코올의 중추신경계 억제작용을 증가시킬 수 있습니다.
- 알코올을 포함하여 간독성 가능성이 있는 약물과 병용시 간 독성이 악화될 수 있습니다.
- 이 약과 클로나제팜의 병용은 결신 발작의 병력을 가진 환자에서 결신 상태를 유발할 수 있습니다.
- 건강한 지원자에게 에토석시미드 500mg과 발프로산(800~1,600mg/일)을 병용 투여시 에토석시미드 단독투여에 비해 에토석시미드의 제거 반감기가 25% 증가하였고, 총중소용이 15% 감소하였습니다. 에토석시미드와 발프로산(특히 다제 항간질약과 함께)을 투여중인 환자는 서로의 혈중농도 변화를 모니터링해야 합니다.
- 펄바미돈은 유리된 발프로산의 혈장 농도를 선행적으로 약 18%까지 용량의존적으로 증가시킬 수 있으므로 임상적 및 실험실적 관찰을 해야 하고 병용투여 및 투여 중단시에 필요하다면 발프로산염의 농도를 조절해야 합니다. 발프로산은 펄바메이트의 혈중농도를 약 50%까지 상승시킬 수 있습니다.
- 라모트리진을 발프로산과 병용투여시 라모트리진의 간대사율이 저하되어 반감기가 26~70시간 증가하였습니다. 발프로산과 병용투여시에는 라모트리진을 감량투여합니다. 이 약과 라모트리진을 병용투여시, 발진, 심각한 피부반응(리얼중후군)의 위험이 증가될 수 있으므로 일반적용이 약과 라모트리진의 병용은 권장되지 않습니다. 병용 투여가 필요하다면 면밀한 임상 모니터링이 요구됩니다.
- 정성 성인 남자 지원자에게 발프로산(1회 500mg 1일 2회)과 탄산리튬(1회 300mg 1일 3회)을 병용투여시 리튬의 혈장정도는 영향이 없었습니다. 리튬과 병용투여시 두 약물의 혈중 농도를 정기적으로 모니터링해야 합니다.
- 이 약과 토피라메이트를 동시에 투여할 때 주로 발프로산염에 기인하여 고암모니아혈증 또는 뇌질환 발현의 위험성이 있습니다. 치료 초기 및 징후가 나타날 경우에 더욱 면밀한 임상적 및 실험실적 모니터링이 요구됩니다.
- 코데인과 같은 다른 통증 물질의 대사와 단백질결합도 영향받을 수 있습니다.
- 니모디핀(경구투여 및 외삽법에 의한 주사투여)과 병용투여시 발프로산염에 의한 간 대사 감소로 인하여 혈중 농도가 증가하여 니모디핀의 혈압 강하 효과가 증가할 수 있습니다.

7. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 일반적으로 항간질약 투여로 인한 기형 발생율은 투여하지 않는 경우(약 3%)보다 2~3배 높은 것으로 나타났습니다. 다른 항간질약과의 복합 투여는 기형의 위험성을 증가시킵니다. 따라서 가능하면 단독 요법으로 투여하는 것이 좋습니다. 대부분의 기형은 구순열과 심혈관계의 기형, 신경관 결함이었습니다. 간질이 있는 산모에게서 태어난 어린이의 경우 매우 드물게 성장지연이 보고되었습니다. 그러나, 그 원인이 유전적, 사회적, 환경적 요인에 의한 것인지, 산모의 간질 혹은 항간질약의 투여에 의한 것인지 구명하는 것은 불가능합니다. 그럼에도 불구하고, 항간질 치료를 갑자기 중지할 경우에 일부의 결함을 악화시키고 그 결과 태아에게 좋지 않은 영향을 미칠 수 있으므로 임신기간 중 이 약 투여로 인한 유산성/위험성의 재평가없이 이 약 투여를 중단하지 않습니다. 임신 동안 산모의 자산소증을 동반한 자간전대맥락 및 간질증상은 산모와 태아에게 가장 위험을 가져옵니다. 항간질약을 투여하는 것이 높은 선천성 기형 발현 빈도의 원인과 결과 관계로 간주될 수 있습니다. 선천성 기형의 원인이 약물 투여보다 유전인자 또는 간질 조건이 더 중요할 수 있으므로, 사람에서의 약물 기형 발생에 대한 적절한 자료를 수집하는 데는 내인성 방법론적 문제가 있습니다.
- 발프로산은 투여받은 환자에서 옹고 이상이 나타날 수 있습니다. 예외적인 출혈 증상이 이 약을 투여받고 있는 일부의 신생아에서 보고되었습니다. 이 출혈 증상은 저섬유소원혈증과 관련이 있습니다. 낮은 섬유소원을 가진 환자가 발프로산을 포함한 항간질약을 반복투여시, 출혈로 인해 사망하는 부임세포원혈증을 가진 신생아를 출생합니다. 이 출혈증상은 발프로산염의 경우 비타민 K 결여와 관련이 없을 것으로 여겨지고 있습니다. 그러나, 이러한 증상은 페노바르비탈 및 효소유도 작용이 있는 약물에 의한 Vitamin K 인자의 감소로 나타날 수도 있으므로 주의하여야 합니다. 분만전 전 임부에 대하여 혈소판 수치, 프로브리노겐 수치, 응고시간(Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) 검사 등을 실시합니다. 정상적인 결과인 경우에도 신생아에서의 지혈 이상 가능성을 배제할 수는 없습니다. 따라서 신생아의 혈중 파브리노겐 수치, APTT 검사, 혈소판수가 조사되어야 합니다. 외상성분만은 출혈 위험성을 증가시킬 수 있습니다. 임신중 발프로산 투여로 신생아 및 유아의 사망을 초래하는 간부전이 보고되었습니다.
- 사람에서는 임신 첫 3개월 이내에 이 약을 투여받은 일부에서의 기형 발생률은 다른 항간질약에서 보고된 것보다 높지 않았습니다. 발프로산염을 투여받은, 간질을 가진 산모에서 태어난 자손에서 신경관 결함(척추 비분절, 척추수막류)과 남자이기에선 요도하열과 같은 다른 중간선(midline) 결함, 불규칙계 변형(안면 형태 이상-또한 정신지체, 사지기형을 동반한 경우) 그리고 심혈관계 기형을 포함한 선천적 기형이 보고되었습니다. 양측 요골무형성증은 드물게 나타나나 발프로산염 함유제제의 특이 효과입니다. 일부 자료는 발프로산염의 자궁내 노출과 성장지연(흔히 두개안면부 이상과 관련이 있습니다)의 위험성, 특히 언어지능지수에 대한 관련성을 보여주고 있습니다. 이 약으로 인한 신경관 이상(척추수막류, 비분척추 등) 발생 빈도는 약 1~2%입니다. 기형 발생의 초기 탐지를 위해 산전 진단(초음파, 알파태아단백 검사법)이 권장됩니다. 또한 모체의 자궁으로부터 발프로산에 노출된 어린이에서 자폐질환이 보고된 바 있습니다.

- 임신을 계획하는 여성에게 항간질치료를 투여할 때는 적절성을 신중하게 검토하여야 합니다. 발프로산염을 투여받고 있는 간질의 임신부에서 신경관 이상에 대한 염산의 예방 효과는 지금까지 입증되지 않았습니다. 따라서 임신 첫 1개월 동안 노출될 경우에 신경관 결함 또는 기타 기형의 발생 가능성을 알아보기 위하여 전문적인 출산전 모니터링을 임신 투여 여부에 관계없이 실시해야 합니다. 또한 적절하다면 신경관 결함(neural tube defect)의 위험을 최소화하기 위해 임신 전에 적절한 용량(5mg/일)으로 임신 보조요법을 시작하여야 합니다.
- 이 약은 태반을 통과하고 모체보다 태아의 혈장농도가 더 높았습니다. 기형 유발은 1일 중 투여량 및 단의 투여량과 관련이 있습니다. 투여량 증가시(특히 1,000mg/일 이상) 신경관 결함 발생율도 증가합니다. 임신중 이 약을 투여할 수 밖에 없다면 최소한의 효과적인 1일 용량을 여러 번 분할하여 투여하고(특히 첫 3개월 동안) 사방형 제제의 사용을 권장합니다. 투여량을 일정하게 유지하려면 이 약의 혈중농도는 임신 기간 동안 상당히 변동될 수 있으므로 정기적인 혈중농도 모니터링이 필요합니다.
- 이 약을 투여받은 어머니에서 태어난 신생아에서 급단출생이 보고되었습니다.
- 유예에 포함되는 발프로산의 농도는 매우 낮아서 총 모체 혈중 농도의 1~10% 정도 이나 사람의 모유중으로 이행할 수 있으므로 투유이 투여할 경우에는 수유를 중단합니다.
- 선천적 결손 및 신경행동적 이상반응 : 이 약은 임신산부에게 복용했을 때 치명적인 위험을 일으킬 수 있습니다. 일부반응이 이 약을 사용하면서 신경관결손 및 다른 구조적 장애를 일으킬 수 있다는 것을 임신 등록 자료에서 나타났습니다(예, 두개안면 결손, 심혈관계 기형 및 여러 신체기관과 연관된 기형). 동 제제를 투여받은 산모에서 태어난 아이들 사이의 선천적 기형률은 다른 항간질약을 단독 투여받고 간질이 없는 산모에서 태어난 아이에 비하여 약 4배 더 높았습니다. 임신 전 및 임신 1기 중 염산 노출에 대한 언어적 연구집단에서 선천적 신경관 결손 위험성을 감소시킨다는 증거가 제시되었습니다.
- 자궁내 노출에 따른 IQ 저하 : 발프로산은 자궁 내 노출에 따른 IQ 점수 저하를 일으킬 수 있습니다. 역학 연구들에서 자궁 내 발프로산에 노출되었던 어린이의 경우 다른 항간질약에 노출되었거나 항간질 약에 노출된 적이 없는 어린이에 비해 낮은 인지 검사 점수를 보였습니다. 이 연구 중 가장 큰 규모와 연구는 미국 및 영국에서 수행된 전향적 코호트 연구군예(n=62), 출생 전 발프로산에 노출된 어린이의 6세 IQ 점수[97(95% 신뢰구간 94-101)]는 출생 전 다른 항간질약 단독투여로 노출된 어린이에 비해 낮았습니다. : 라모트리진[108(95% 신뢰구간 105-110)], 카르바마제핀 [105(95% 신뢰구간 102-108)], 페니토인[108(95% 신뢰구간 104-112)] 발프로산에 노출된 어린이의 임신 중 인지영향에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 이 연구에 참여한 여성들이 임신기간 내내 항간질약에 노출되었기 때문에 낮은 IQ 위험성이 임신기간 중 특정 기간대와 관련성이 있는지 여부에 대하여 평가할 수 없었습니다. 비록 모든 가능한 연구들이 방법론적인 한계가 있지만, 이러한 증거는 자궁 내에서 발프로산의 노출이 어린이의 IQ를 감소시킬 수 있다는 결론을 뒷받침하고 있습니다. 동물 실험에서 발프로산에 출생 전 노출된 후손의 기형은 사람과 유사하게 나타났으며, 신경행동적 결함을 입증하였습니다. 간질이 있는 임신한 여성들은 임신을 계획 중인 여성들은 다른 치료로 적절한 증상 조절에 실패했거나 다른 치료를 받을 수 없는 경우 외에는 발프로산으로 치료해서는 안됩니다.
- 가임기에 대한 사용 : 임신 기간의 초반에 나타날 수 있는 태아의 IQ 저하 및 중요한 선천성 기형(신경관 결손을 포함합니다.) 위험성 때문에 가임기 여성의 경우 의학적 상태를 관리하는데 이 약이 꼭 필요한 경우 외에는 발프로산을 투여해서는 안됩니다. 이는 일반적으로 약이 임산부 손상 또는 사망과 관련된다는 증거상(예: 편두통)에서 발프로산 투여를 고려할 때 특히 중요합니다. 여성들은 발프로산 투여 시 효과적인 피임법을 사용해야 합니다. 임신을 계획 중인 여성들은 임신 중 발프로산의 상대적인 위험성 및 유익성에 대하여 상담해야 하며, 이러한 환자들에 대해 대해 치료를 고려해야 합니다. 임신 전 및 임신 1기 중 염산 보충은 일반적 연구집단에서 선천적 신경과결손 위험성을 감소시킨다는 증거가 제시되었습니다. 발프로산을 투여받은 여성의 자손에서 신경관결손 위험성 또는 IQ 저하 위험성이 염산 보충에 의해 감소되는지는 알려지지 않았습니다. 발프로산을 투여받은 환자들에게 임신 전 및 임신 중 모두 일상적으로 염산 식이 보충을 권장해야 합니다.

8. 소아에 대한 투여

이 약을 3세 미만의 유아에게 투여할 경우에는 치료상의 유익성이 간손상에 대한 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 단독 투여할 수 있습니다. 3세 미만의 간독성의 위험성이 있으므로 유아에게 살리실산염도제를 병용투여하지 않습니다. 특히 선천성 대사장애, 정신지체장애 수반하는 증증의 발생성 질환 및 기질성 뇌질환이 있는 소아에 있어서 치명적인 간독성의 위험이 시시반 바 있습니다. 신생아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.

9. 고령자에 대한 투여

이 약은 혈청알부민과의 결합성이 강하나 고령자에는 혈장 알부민이 감소되어 유리된 약물의 혈중농도가 높아질 수 있으므로 용량에 유의하여 신중히 투여합니다. 또한 연용 중에 투여량을 급격히 감량하여 투여를 중지하면 간질증절상태가 나타나기 쉬우므로 신중히 투여합니다.

10. 과량투여시의 처치

1) 과량투여시 나타나는 특징적인 증상은 착란, 진정, 심하면 혼수, 근무력증, 반사저하 또는 무반사입니다. 개별 증례에서 저혈당, 동공수축, 심혈관계와 호흡기계 질환, 비부종, 대사성 산증, 저칼륨혈증, 고나트륨혈증이 보고되었습니다. 과도하게 과량투여 시 사망한 경우도 있으나 대부분은 회복됩니다. 혈중농도가 높은 경우 비정상적인 신경 반응과 행동변화가 나타납니다. 매우 높은 혈중 농도에서는 발작이 보고된 바 있습니다.

2) 과량 투여시의 처치로는 다음과 같습니다. : 위세척(과량투여 후 10~12시간 전에 시행해야만 효과적입니다. 위세척이나 구토의 유용성은 약물 투여후의 경과 시간에 따라 변화합니다.) 삼투성 이뇨, 심장 및 호흡기 기능 모니터링, 증증의 경우에는 투석 또는 치환수혈을 합니다. 과량투여시 단백질 결합하지 않는 약물의 분해는 높으며, 혈액 투석 또는 혈액관류를 위한 직접적 혈액정제법은 약물을 현저히 제거할 수 있습니다. 적절한 요배설 유지를 위한 특별한 주의와 일반적 보조 방법을 병행하여 실시합니다. 날록손이 효과적인 경우도 있습니다. 이론적으로는 간질 환자에게 날록손이 이 약의 항간질 효과를 반전시킬 수 있으므로 신중히 투여합니다. 과량 투여시 사망할 경우도 있으나 대부분은 회복됩니다. 사망에 보고되었으나, 발프로산 농도 최고 2,120mg/ml부터 회복되었습니다.

11. 적응상의 주의

- 이로 으깨거나 씹지 말고, 과일 함께 복용합니다.
- 이 약의 흰색 전사가 분변 중에 배설됩니다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 소아 원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

13. 기타

- 발암성 : 발프로산 0, 80, 170mg/kg/day를 랫트와 마우스에게 2년간 투여한 결과, 비록 2종 모두에서 신생물이 관찰되었으나, 주된 조사 결과는 고용량을 투여한 쥐, 랫트에서의 피하성유육종 발현이 통계적으로 유의성 있는 증가를 나타냈으며 수 마우스에서는 용량 의존적으로 양성폐선종이 통계적으로 유의한 결과를 나타냈습니다. 사람에게 대한 이들 현상의 유익성은 현재 알려지지 않았습니다.
- 돌연변이 : 세균 및 포유동물이 신체에 대한 연구에서 이 약에 대한 돌연변이 감제성의 증거가 없었습니다.
- 생식 : 유년 또는 성숙한 랫트와 개를 사용한 만성 독성 연구에서 랫트에서의 200mg/kg/day이상의 용량 및 개에서의 90mg/kg/day 이상의 용량에서 경자 형성의 감소와 고환위축이 나타났습니다. 랫트에서의 1단계 생식 시험은 60일 동안 350mg/kg/day까지 복용시 대한 수컷에는 영향이 없었습니다. 사람에게 있어서의 고환 발달, 정자 생성과 수정에 대한 이 약의 영향은 알려지지 않았습니다.
- 발프로산은 마우스, 랫트, 토끼에서 기형을 유발하는 것으로 나타났습니다.
- 몇몇 시험관내 시험에서 이 약이 HIV 바이러스의 복제를 촉진한다는 보고가 있었으나 임상적 중요성은 확인되지 않았습니다.

【저장방법】 250mg-밀폐용기, 실온보관(1~30℃) / 500mg-기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 250mg-30, 100, 500캡슐 / 500mg-30, 300캡슐

【최신정보확인방법】

설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

【제품문의처】 소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었으나 변질·변태 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매자에게 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 설명서 개정년월 : 2014. 07

http://www.myunginph.co.kr

BPC 0714-23

제조의회사

명인제약주식회사

경기도 화성시 필리면 노하길 361-12

250mg/500mg 제조자

500mg 제조자

[주]알피코프

경기도 화성시 함남읍 제곡공단 4길 35-7

한림제약(주)

경기도 용인시 처분구 명로로 2-27