

28087M41912



제산성분 함유 효과빠른 위장약

일반의약품

분류번호 : 234

신일겔 정

Sinil Gel Tabs.

【성분·함량】 (1정 중)

유효성분 : 건조수산화알루미늄겔(KP)	200mg
탄산마그네슘(KP)	50mg
침강탄산칼슘(KP)	100mg
탄산수소나트륨(KP)	50mg

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 크로스 카르멜로오스나트륨, L-멘톨

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인: 1회 2정, 1일 3회
 만 8세 이상 15세 미만: 1회 1정, 1일 3회
 식간(식사때와 식사때 사이) 및 취침시 복용합니다.
 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 투석요법을 받고 있는 환자
 - 만 7세 이하의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 테트라사이클린계 항생제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 신장장애 환자
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 이 첨부문서를 소지하십시오.

 - 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
 - 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
- 나트륨 제한 식이를 하는 사람.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10정, 90정, 180정, 500정

※ 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지 또는 식품의약품안전처 의약품종합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

■ 제품문의 02)2211-6700, www.siniipharma.com

코소닥상장
 제조자: 신일제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
 공장 : 충청북도 충주시 양성면 북삼골길 28



설명서 작성년월일 : 2019.12.02