

※ 첨부문서를 읽을 것, 첨부문서를 보관할 것

에포린정

(에페리손염산염)

【원료약품 및 그 분량】1정 중

에페리손염산염(KP) 50mg

동물유래성분 유당수화물(KP)-기원동물 : 소, 사용부위 : 우유

젤라틴(JP)-기원동물 : 소, 사용부위 : hide

【성 상】 흰색의 원형 당의정제

【효능·효과】

- 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완증후군, 견관절주위염, 요통
- 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타의 뇌척수질환

【용법·용량】

성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약에 과민증 환자
 - 중증의 근무력증 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다)
- 부작용
 - 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
 - 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다.
 - 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
 - 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.

전문의약품

분류번호 01220

9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있다.

10) 기타 : 때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 이 약 투여 중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지한다.
- 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

이 약의 유사약품인 염산톨페리손과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 1000정

※ 쉬운용어 : 아래 용어 설명을 참조하시기 바랍니다. (가나다 순서)

1. 견관절 : 어깨관절, 2. 경견완증후군 : 목어깨팔증후군, 3. 경구투여한다 : 먹는다, 복용한다, 4. 경직 : 굳음, 5. 고령자 : 노인, 6. 골 : 뼈, 7. 구내염 : 입안염, 8. 근무력증 : 근육무력증, 9. 단백뇨 : 단백질이 섞인 오줌, 10. 동통 : 통증, 11. 발한 : 땀이 남, 12. 병변 : 병에 의한 몸의 변화, 13. 복부 : 배부분, 14. 부종 : 부기, 15. 상회 : 웃돌, 웃돌다, 16. 시조절장애 : 시각조절장애, 17. 신장 : 콩팥, 18. 연축 : 수축과 이완, 19. 외상 : 상처, 20. 요폐 : 소변축적, 21. 유당 : 젖당, 22. 잔뇨감 : 소변을 누고난 후에도 다 눈 것 같지 않은 느낌, 23. 중증 : 심한 증상

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시거나 화일약품(주) (02-564-2722)로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.

제조의뢰자 : 화일약품(주) 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 156

제조사 : 대우제약(주) 부산광역시 사하구 다대로 153

작성년월일 : 2014.06.02

개정년월일 : 2015.07.07

ERT1507.02

DB-15-07