

위장장애가 적고 흡수율이 높은 칼슘제


케어칼디엠정

일반의약품

분류번호 319(기타의 비타민제)

케어칼디엠정은 칼슘과 마그네슘이 2:1 최적의 배합으로 함유되어 있는 칼슘제입니다.

케어칼디엠정에 함유되어 있는 시트르산(구연산) 칼슘은 비교적 흡수율이 높고 위장장애가 적어 편하게 복용하실 수 있습니다.



-뼈와 치아 형성에 필요
-골다공증 위험 감소

-칼슘의 흡수를 도움
-근육 경련 예방


-칼슘이 흡수되고 이용되는데 필요
-뼈의 형성과 유지에 필요

원료약품의 분량(1정 중)

시트르산칼슘(USP)(칼슘으로서 140.0mg).....664.4mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 70.0mg).....116.1mg
콜레칼시페롤과립(KPC)(비타민D로서 200IU).....2.0mg

성상

이 약은 흰색의 타원형 필름코팅정입니다.



효능·효과

- 다음경우의 비타민 D의 보급
 - 임신·수유기
 - 발육기
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 비타민 D : • 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방

- 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

용법·용량

만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2정 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하십시오.

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (4) 신장장애 환자
- (5) 저단백혈증 환자
- (6) 강심배당체를 투여 중인 환자
- (7) 신장결석 병력이 있는 환자
- (8) 임부

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 열골달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하

(2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

(3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

(4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

(5) 우발적으로 과량복용 한 경우

(6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

(2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.

(3) 오염(절뚱사육)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

포장단위 60, 240정

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

※ 이 설명서는 2014년 7월 18일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다

ILDONG 일동제약

본사: 서울시 서초구 바우막로27길2 (전화) 02-526-3114

공장: 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실: (전화) 080-022-1010 (수신자부담)