

전문약목

분류번호:619

광범위 마크로라이드계 항생제

파이로신[®]

(클래트리로마신) 500mg

Pyrocyn Tab, 500mg

■성분·함량 : 1정 중
클래트리로마신(KP) 500mg(약가)
첨가제(타르색소) : 황색 203호

■성상 : 황색의 장방형 필름코팅정

- 효능·효과
○유효균종
항생포도구균, 페렴연쇄구균, 스트렙토кокус 피오게네스(그룹 A-베타 용혈성), 리스테리아 모노사이토제니스, 스트렙토кокус 아갈락티에(그룹 B), 스트렙토кокус 비리단스, 인플루엔자균, 파라인플루엔자균, 모락셀라 카타랄리스, 레기오넬라 뉴모필라, 보르데텔라 백일해, 공직감 필로박터, 헬리코박터 파이로리, 임균, 동물 파스퇴렐라증 병원균, 폐렴 미코플라스마, 클라미디아 트라코마티스, 클로스트리дум 퍼프린젠스, 펩토코커스 나이거, 프로피오나리박테움 아크네, 박테로이데스 멜라니노제니쿠스, 미코박테룸 아비움, 미코박테룸 인트라셀룰라에
○작용증
－ 하기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등
－ 상기도감염증 : 인두염, 부비동염 등
－ 피부 및 피부조직 감염증
－ 미코박테룸 아비움, 미코박테룸 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증
－ 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸

■용법·용량
○성인 : 클래트리로마신으로서 보통 1회 250mg(약가) 1일 2회 투여하며, 중증 감염증의 경우에는 1회 500mg(약가) 1일 2회 투여한다. 투여기간은 보통 7~14일이다. 크레아티닌청소율이 30mL/min이하인 신부전 환자의 경우에는 용량을 절반으로 줄여야 한다. 즉 1일 1회 250mg(약가), 중증 감염증의 경우에는 1회 250mg(약가) 1일 2회 투여한다. 이런 환자에게는 14일 이상 투여하지 않는다. ○ 미코박테리아 감염증 : 이 약으로서 1회 500mg(약가), 1일 2회 투여한다. 이 경우 에탐부톨, 클로피자민, 리팜핀과 같은 다른 항미코박테리아제와 병용투여 하여야 한다. ○ 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸 : 14일간 이 약으로 시 500mg(약가) 1일 3회와 오메프라졸 40mg 1일 1회 병용투여하고, 연속하여 14일간 오메프라졸 40mg 1일 1회 투여한다. 즉, 클래트리로마신은 1회 500mg(약가) 1일 3회 14일간(1~14일)투여하고, 오메프라졸을 1일 1회 40mg을 28일간(1~28일)투여한다. ○ 12세 이상의 소아는 성인과 동일, 12세 미만 소아는 클래트리로마신 건조시럽을 사용한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 이 약의 첨가제에 과민반응이 있는 환자 2) 클래트리로마신, 에리트로마신 또는 마크로라이드계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자 3) 테트라사이클린, 사사프롤리드, 피모지, 아스테미졸을 투여 받고 있는 환자(클래트리로마신 및(또는) 에리트로마신과 병용투여 시 QT 연장 및 심부정맥(심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함)이 나타나고 이는 클래트리로마신 및 에리트로마신에 의해 이들 약물의 간 대사가 방해를 받기 때문인 것으로 외국의 시판 후 조사결과 보고되었다. 치명적인 사례도 보고되었다.('5.상호작용 참조) 4) QT 연장 또는 심실성 심부정맥(Torsades de pointes 포함)의 병력이 있는 환자 5) 중증 간장애 환자 6) 맥각알칼로이드 및 그 유도제(에르고타민, 디히드로에르고타민 등)를 투여 받고 있는 환자(맥각 독성이 나타날 수 있다.) 7) 임부 및 수유부 8) 중추신경계 감염환자 9) 미줄라스틴, 베프리딜을 투여 받고 있는 환자 10) 로바스타틴 또는 심바스타틴을 투여 받고 있는 환자('5.상호작용 참조) 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 간장애 환자(주로 간을 통해 배설된다.) 2) 중증도에서 중증의 신부전 환자(혈중농도가 상승할 수 있음.) 3) 심질환 환자(QT 연장, 심실성 부정맥(Torsades de pointes 포함)을 일으킬 수 있음.) 4) 고령자 5) 다른 항생물질(마크로라이드계, 린코사마인, 클린다마이신, 클로람페니콜 등)를 투여 받고 있는 환자(조자나성에 주의한다.) 6) 브로모크리핀, 카베콜린, 페르콜리드, 에버스타인, 타크로리무스, 툴타로딘, 할로판트린을 투여 받고 있는 환자 7) 약물에 대한 알레르기 반응이 있는 환자에 투여 시(특히 이 약의 성분과 유사한 구조를 가진 약물 투여 시)에는 신중하게 투여한다. 3. 이상반응 1) 속, 아나필락시스양 증상 : 드물게 속, 아나필락시스양 증상(호흡곤란, 경련, 발적 등)을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 과민반응 : 때때로 발진, 두드러기 가려움, 두드러기, 경증의 피부발적, 맥관부종, 관절부종, 약물발진 등이 나타날 수 있다. 3) 소화기계 : 때때로 복부팽만감, 구역, 구토, 소화불량, 복통/불쾌감, 가슴잡, 설사, 구강내 미란, 상복부통증(드물게 경련형태), 구역, 일과성 치아변색, 드물게 체지방, 아미라제 증가, 미각이상, 식욕부진, 변비, 설변색 등의 위장관 장애가 나타났다는 보고가 있다. 위막성대장염, 출혈성 대장염 등 혈변을 동반한 대장염이 나타날 수 있으므로 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 4) 호흡기계 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구 증가 등을 수반하는 호산구성 폐렴증·간질성폐렴 등이 생길 수 있으므로 이와 같은 증상이 발생하면 투여를 중지하고 코르티코이드의 투여 등 적절한 처치를 실시한다. 만성 기관지염 및 급성 상악동염의 급성악화도 관찰되었다. 5) 혈액계 : 때때로 호산구 증가, 혈소판 감소, 병혈구 감소, 용혈성 빈혈, 백혈구 감소, 무과립구증 등이 나타나기도 하므로 정기적으로 검사하여 충분히 관찰을 하고, 이상반응이 나타나면 투여를 중지하는 등, 적절한 처치를 한다. 6) 중추신경계 : 어지러움, 우물, 미각이상, 후각이상, 불안, 드물게 불면, 악몽, 이명, 착란, 지남력장애, 환각, 정신병, 이인증, 경련(간질근대성, 간대성근경련증, 의식소실발작 등), 떨림, 마비감 등 일과성 중추신경계 이상반응이 나타났다는 보고가 있으나 이 약과의 관련여부는 밝혀지지 않았다. 행동장애, 조동행동이 나타났으나 약물투여를 중단하면 소실된다. 여러 가지 이상반응이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 7) 피부 : 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후군 등이 발견되기도 하므로 잘 관찰하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부소피절조로렌제의 투여 등 적절한 처치를 실시한다. 알레르기성 자반병이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 시판 후 경험 중 '호산구증가와 전신성 증상을 동반한 약물 발진(DRESS : drug rash with eosinophilla and systemic symptoms)'이 나타났다. 8) 간장 : 다른 마크로라이드계 항생물질과 마찬가지로 드물게 황달을 동반하거나 또는 동반하지 않는 간세포성 또는 담즙울체성 간염, 간호소치의 증상을 포함한 간기능 장애가 나타났다는 보고가 있다. 이러한 간기능 장애는 중증일 수 있으며, 대체로 가역적이다. 몇몇 경우, 사망(fatal outcome)을 동반한 간부전이 보고된 바 있으며, 이는 대체로 중증의 기질질환 및/또는 병용투여된 약제와 관련이 있다. 전적성간염, AST, ALT, γ-GTP, LDH, ALP 상승, 총 빌리루빈 증가 등을 동반한 간기능장애, 황달, 간부전이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 식욕부진, 황달, 진한색의 뇨, 가려움증, 또는 복부압통 등과 같은 간염의 증상과 징후가 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 9) 신장 : 드물게 혈청크레아티닌 상승이 일어났다는 보고가 있으나, 이 약과의 관련 여부는 밝혀지지 않았다. 드물게 복용량이 많을 때 BUN이 상승한다는 보고가 있다. 간질성 신염, 신부전, 체지방 등이 보고되었다. 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 근육근육해이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 실시하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하는 등 황문근육해이에 의한 급성 신부전이 나타날 수 있으므로 주의한다. 평소 등의 증상이나 혈청크레아티닌치 상승 등 신기능 저하가 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 10) 군교대증 : 드물게 설염, 구내염, 구강칸디다증이 나타났다는 보고가 있다. 11) 순환기계 : 다른 마크로라이드계와 같이 QT연장, 심실성빈맥, Torsades de pointes가 드물게 보고되었다. 12) 기타 : 드물게 권태감, 두통, 미각도착, 가역적인 청각상실, 이상근각증, 관절통, 근육통, 후각장애가 나타났다는 보고가 있다. 13) 심장 장애인 경우 알칼리증으로 투여를 중단하면 감소될 수 있으나 투여 연장기간 동안 1일 1g 이상 투여 시 다시 나타날 수 있다. 경구저혈당양을 또는 인슐린을 투여 받는 환자에게서 드물게 저혈당증이 나타났다는 보고가 있다. 시판 후 경험 중 황문근육해이 보고되었다. 14) 면역기능이 저하된 환자에서 특정 검사에서 심각하게 비정상적인 수준(상당한 정도의 하한치)의 검치치를 분석하였을 때 1일 약 1000mg을 투여한 환자의 약 2-3%에서 AST 및 ALT가 심각하게 비정상적인 수준으로 상승하고 백혈구와 혈소판수가 비정상적으로 낮았다. 또한 더

적은 수의 환자에서 BUN이 상승하였다. 15) 클래트리로마신과 관련이 있을 수 있다고 판단되는 이상반응을 전신조직분류와 다음과 같은 빈도분류에 따라 아래 표로 나타내었다 : 매우 흔(≥1/10), 흔(≥1/100~<1/10), 드물게(≥1/1000~1/100), 그리고 not known(시판후조사에서 나타난 이상반응으로 데이터로부터 추정할 수 없음). 각 칸에서 이상반응은 중대일이 평가가능할 경우 중대일이 큰 순서부터 기재하였다.

클래트리로마신에 대해 보고된 이상반응				
전신조직 분류	매우 흔 ≥1/10	흔 ≥1/100~<1/10	드물게 ≥1/1000~1/100	not known* (데이터로부터 추정할 수 없음)
감염 및 감염충치입			연조직염 ¹ , 칸디다증, 위장염 ² , 간염 ³ , 집갈염	위막성대장염, 단독, 알은연조직염, 홍색염선
혈액 및 림프계			백혈구감소증, 호중구감소증 ⁴ , 고혈소판증 ³ , 호산구증가증 ⁴	무과립구증, 저혈소판증
면역계 장애			아나필락시스양 반응 ¹ , 과민성	아나필락시스반응
대사 및 영양 장애			식욕부진, 식욕감소	저혈당증
정신 장애		불면증	불안, 신경과민 ³ , 소리지름 ³	정신병성 장애, 혼돈 상태, 이인증, 우울증, 지남력장애, 환각, 비정상적인 꿈(abnormal dreams)
신경계 장애		미각이상, 두통, 미각도착	의식상실 ¹ , 운동이상증 ¹ , 비전정성 현기증, 졸음 ³ , 진전	경련, 미각소실, 이상후각, 후각상실
귀 및 미로 장애			전정성 현기증, 청력장애, 이명	난청
심 장애			심장정지 ¹ , 심방세동 ¹ , 심전도QT연장, 주기의수축 ¹ , 심계항진	Torsade de pointes, 심실성 빈맥
혈관 장애		혈관확장 ¹		출혈
호흡기, 흉부 및 중격 장애			천식 ¹ , 비출혈 ² , 폐색전증 ³	
위장관 장애		설사, 구토, 소화불량, 구역, 복통	식도염 ¹ , 위식도역류병 ² , 위염, 장정통증 ² , 구내염, 설염, 복부팽만, 변비, 구갈, 트림, 고창	급성체장염, 허 변색, 치아 변색
간기능 장애		간기능검사 이상	담즙정체 ³ , 간염 ⁴ , 일관된 아마노트랜스퍼라아제 상승, 아스파테이트 아마노트랜스퍼라아제 상승, 감마-글루틸릴트랜스퍼라아제 상승 ⁴	간부전, 간세포성 황달
피부 및 피하조직 장애		발진, 다한증	수포성 피부염 ¹ , 가려움, 두드러기, 반구진성 발진 ³	스티븐스-존슨 증후군, 독성 표피괴사증후군, 호산구증가와 전신성 증상을 동반한 약물 발진(DRESS : drug rash with eosinophilla and systemic symptoms), 에르돌, Henoch-Schonlein 자반증
근골격 및 결합조직 장애			근육연축 ³ , 근골격 경직 ¹ , 근육통 ²	형문근육해 ² , 근육병증
신장 및 비뇨기 장애			혈청크레아티닌 상승 ¹ , 혈중요소 상승 ³	신부전, 신장염
일반적 장애 및 투여위상장애	주사부위 정맥염 ¹	주사부위통증 ¹ , 주사부위염 ¹	권태감 ⁴ , 발열 ³ , 무력증, 홍통 ⁴ , 오한 ⁴ , 피로 ⁴	
검사수치 이상			알부민글로벌리니 상승 ¹ , 혈중 알칼리성 인산(파타이제) 상승 ¹ , 혈중 락트산탈수소효소 상승 ⁴	국제표준화비율(INR) 증가, 프로트롬빈시간 연장, 뇨 색 이상

4. 일반적 주의 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다. 2) 다른 항생물질과 같이 비감수성 세균 또는 진균에 의한 감염이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 한 처치를 한다. 3) 이 약에 대해서 알레르기반응이 일어나는 경우에는 투여를 중지한다. 4) 심각한 알레르기반응에는 에피네프린, 항히스타민제, 코르티코이드가 필요할 수 있다. 5) 마크로라이드계를 포함한 거의 모든 항생물질은 경증에서 중증에 이르는 범위의 위막성대장염을 일으킨다는 보고가 있다. Clostridium difficile - 관련 설사(CDAD)는 이 약을 포함한 거의 모든 항생제의 사용에서 보고되었으며, 경증설사에서부터 치명적인 대장염에 걸쳐 나타날다. 이 약을 포함하여 항생물질 투여 환자들은 지속적인 설사가 나타나는 환자에 대한 진단이 중요하다. 항생물질 사용에 의해 장내세균군이 변화를 일으켜 클로스트리듬의 과잉번식을 일으킬 수 있다. 연구에 의하면 클로스트리듬 다이피세에 의해 생산되는 독소가 항생물질관련 대장염의 주 원인으로 알려졌다. 위막성대장염으로 진단이 내려지면 치료를 중지해야한다. 경미한 위막성대장염은 투약중지에 의해 회복될 수 있다. 중증증 또는 중증의 징후에는 수액, 전해질, 단백질 보충 등의 처치를 하고 Clostridium difficile 에 대해 임상적으로 효과 있는 항생물질로 치료한다. Clostridium difficile - 관련 설사(CDAD)는 항생제의 사용에 이어 설사가 나타나는 모든 환자에 대해 고려되어야 한다. Clostridium difficile - 관련 설사(CDAD)는 항생제 투여 후 2개월 이상 지난 이후에도 보고되었으므로, 주의 깊은 환자 악력 관리가 요구된다. 6) 미코박테룸 아비움 복합감염(MAC) 치료를 위해 이 약을 투여 받는 HIV 양성 환자에 대한 일부 연구결과 500mg 1일 2회 이상 고농도를 투여 받는 환자의 경우 생존율이 낮은 결과가 관찰되었다. 이 연구결과에 대한 해석은 되어있지 않으나, 이 약을 MAC의 치료 또는 예방인 경우에는 적정 용량인 500mg 1일 2회 투여량을 초과하지 않도록 한다. 7) 간기능부전을 동반하거나 동반하지 않는 신기능부전 환자의 경우는 용량을 줄이고 투여 간격을 연장하는 것이 적절하다. 8) 다른 약과의 병용에 대한 주의사항에 대한 정보는 각 약물의 사용설명서를 참고하도록 한다. 9) 반복 투여 및 장기연용으로 인해 내성균이 과잉증식 할 수 있다. 만일 군교대증이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 대체요법을 실시한다. 10) 소수의 환자에게서 헬리코박터 파이로리 균이 내성을 나타낸다는 보고가 있다. 11) 1일 1g(약가) 또는 1g(약가) 이상을 장기간 복용하면 이명 또는 청각둔화가 나타날 수 있으나 투여를 중지하면 회복될 수 있다. 12) 인과관계가 성립되지는 않았으나 일부에서 치아변색이 발생하였으며, 일 반적으로 치과적 치료로 회복될 수 있다. 13) 미코박테룸 아비움 복합감염(MAC) 예방 및 치료를 위해 이 약을 투여 받는 HIV 양성 환자에게 내성이 나타났다는 보고가 있다. 14) AIDS 및 다른 면역기능이 저하된 환자는 미코박테리아 감염증에 대해 장기간 이 약을 투여 받으며 기존 HIV나 병발질환으로 인해 이상반응과 이 약과의 관련성을 구분하기 어렵다. 15) 클래트리로마시인을 투여 받는 환자들에게서 중증 근육경증의 위험이 보고되었다. 16) QT 연장의 위험이 있으므로, QT 연장은 torsades de pointes의 소인이 증가되는 것과 관련된 의학적 상태에 있는 환자에게 이 약을 사용할 시에는 주의를 기울여야 한다. 17) 최근 생겨난 Streptococcus pneumoniae 의 마크로라이드계에 대한 저항을 고려하여, 이 약을 지역사회

획득성폐렴(community-acquired pneumonia)의 치료에 처방 시 감수성 검사를 수행하는 것이 중요하다. 원내획득폐렴(hospital-acquired pneumonia)의 경우, 이 약을 적절한 추가제인 항생제와 병용하여 사용하여야 한다. 18) 경증 또는 중증도의 피부 및 연조직 감염은 대개 *Staphylococcus aureus* 와 *Streptococcus pyogenes* 에 의해 일어나며, 이들은 마크로라이드에게 내성이 수 있으므로, 감수성 검사를 수행하는 것이 중요하다. 19) 중증의 급성 기관지염은, 아나필락시스, 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피파괴증후, DRESS, Henoch-Schönlein 저반증 등이 일어날 경우, 이 약의 투여를 즉시 중단하고 적절한 치료를 빠르게 실시하여야 한다. 20) 이 약이 운전 또는 기계조작 능력에 미치는 영향에 대한 자료는 없다. 알코올과 함께 전정성, 비전정성 현기증, 착란 및 지남력 장애가 발생할 가능성이 있으므로, 환자가 운전 또는 기계조작하기 전 이를 감안하도록 해야한다. **5. 상호작용** 1) 기타 내이독성 이 있는 약물, 특히 아미노글리코사이드에는 병용투여하지 않는다. 2) 테오필린 또는 카르바마제핀과 병용 투여하는 경우에는 이들 약물의 혈청농도가 증가되는 보고가 있으므로 고용량의 테오필린을 투여하거나 테오필린 기저 농도가 상위 치료농도범위인 경우 테오필린의 혈중 농도 모니터링을 고려해야 하며 카르바마제핀과 병용투여 시 혈청농도 모니터링을 고려할 수 있다. 테오필린사발정 6.5mg/Kg 또는 12mg/Kg과 12시간마다 이 약 250mg 또는 500mg을 병용투여한 임상시험에서 테오필린의 항정상태 C_{max}, C_{min}과 혈중총알칼리엔제(AUC) 이 약 20% 증가했다. 3) 시토크롬 P450계로 대사는 약물이지만, 맥각알칼리도이드, 트리이졸람, 미다졸람, 로바스타틴, 심바스타틴, 아토르바스타틴, 디소피라미드, 페니도인, 사이클로스포린, 헤스바르비탈, 알페네타, 프로포클린, 발프로에이트, 메틸페니다졸론, 실데나필, 빌라르타민, 알프라졸람, 아스테미졸, 카르보마제핀, 실로스타졸, 시사프리드, 오메프라졸, 피오젯, 퀴니딘, 리파부틴, 타코르리무스, 테르페나딘과 병용 투여하는 경우에는 다른 마크로라이드계 항생물들과 같이 이들 약물의 혈청농도를 상승시킬 수 있다. ② 에페비렌즈, 니라비린, 리라파틴, 리파부틴 및 리파비렌즈 같은 시토크롬 P450 대사이의 강력한 유도제들은 클레리트로마이신의 대사를 촉진하여 클레리트로마이신의 혈장 농도를 낮추는 반면, 미생물학적으로 활성이 있는 대사제인 14-OH-clarithromycin의 혈장 농도를 상승시킨다. 클레리트로마이신과 14-OH-clarithromycin의 미생물학적 활성은 다른 세균에 대해 다르게 나타나므로, 위와 호소 유도제들과 클레리트로마이신을 병용 투여하면 의도한 치료효과를 나타내지 못할 수 있다. ③ CYP3A의 위약 대가 되는 약물들(예, 리라파틴, 페니도인, 카르바마제핀, 페노바르비탈, St. John's wort)이 이 약의 대사를 유도할 수 있다. 이는 약의 치료농도범위이하 농도(sub-therapeutic level)로 이어져 약효감소가 일어날 수 있다. 또한, 이 약의 CYP3A 억제작용에 기인하여 CYP3A 유도제의 혈청농도가 증가될 수 있으므로 이를 모니터링하는 것이 필요할 수 있다 ④테두어면 CYP3A 유도제에 관련된 허가사항도 참고하도록 한다.). 4) CYP3A 호소와 연관된 약물상호작용이 아래와 같이 에리트로마이신 성분 및(또는) 클레리트로마이신 성분에서도 보고되었다. 클레리트로마이신은 CYP3A를 저해하는 것으로 알려져 있으며, CYP3A로 주로 대사되는 약물과의 병용투여는 약물농도의 상승과 연관되어 병용 투여한 약물의 치료효과와 이상반응의 증가 및 연장을 일으킬 수 있다. 클레리트로마이신은 CYP3A 호소의 기저로 알려진 약물, 특히 좁은 안전역 (예:카르바제핀)을 가지고되는 이 호소에 의해 주로 대사되는 다른 약물을 투여 받고 있는 환자의 경우 주치의 깊게 사용되어야 한다. 가능한 경우 용량 조절이 고려될 수 있으며, 클레리트로마이신을 투여 받고 있는 환자들은 CYP3A에 의해 주로 대사되는 약물의 혈청 농도를 주의 깊게 모니터링 하여야 한다. ① 테르페나딘과 병용투여하는 경우에는 드물게 QT 연장, 심실성 부정맥(Torsades de pointes 포함), 심정지(사망 포함), 심실성 빈맥, 심실세동 등의 심혈관계 이상반응이 나타났다는 보고가 있으므로 병용투여하지 않는다. 아스테미졸과 다른 마크로라이드계 항생물질을 병용투여하는 경우에도 유사한 결과가 나타났다는 보고가 있다. ② 시사프리드를 병용투여하는 경우에는 시사프리드 농도가 증가하였다는 보고가 있다. 이요 인해 QT 연장과 심실성 빈맥, 심실세동 및 Torsades de pointes를 포함한 부정맥으로 될 수 있다. 유사한 결과가 피오과 병용투여 시 나타났다는 보고가 있으므로 병용투여하지 않는다. ③ 이 약과 로바스타틴 또는 심바스타틴과의 병용 투여는 금기이다. 다른 마크로라이드계 약물과 같이, 이 약도 HMG-CoA reductase inhibitor의 농도를 증가시키는 것으로 보고되었다. 이 약물과 병용투여하는 환자들에게서 드물지만 횡문근융해증이 보고되었다. 환자들은 근육병증의 징후와 증상 등을 모니터링 해야 한다. 이 약과 아로바스타틴 또는 로수바스타틴을 병용하여 하는 환자들에게서도 또한 횡문근 융해증이 드물게 보고되었다. 클레리트로마이신과 병용할 때, 미다졸람 AUC는 경맥 투여 후 2.7배, 경구 투여 후 7배 증가되었다. 미다졸람과 클레리트로마이신을 경구로 병용투여해서는 안된다. 미다졸람과 클레리트로마이신을 정맥으로 병용투여 했을 때, 용량 조절을 위하여 환자를 면밀히 모니터링 하여야 한다. 트리이졸람과 알프라졸람을 포함한, CYP3A에 대사되는 다른 벤조디아제핀류들도 같은 주의사항이 적용된다. CYP3A에 의해 대사되지 않는 벤조디아제핀류들(테미자페, 니트라제페, 클레리트로마이신과의 상호작용은 임상적으로 중요하지 않다. 외국 의사 한 조사에서 이 약과 트리이졸람 병용투여 시 졸음, 착란과 같은 중추신경계 영향이 보고되었다. 중추신경계의 약리학적 활성이 증가된 환자는 모니터링이 요망된다. ⑥ 퀴니딘 또는 디소피라미드와 병용투여하는 경우 Torsades de Pointes가 발생했다는 시판 후 보고가 있었다. 이들 약물의 혈청농도가 QT 연장에 대해 심진도를 모니터링한다. ⑥ 에르고타민 또는 디히드рое르고타민과 병용투여하는 경우 사지 및 중추신경계를 포함한 조직의 혈관경련 및 허혈과 같은 증상을 특징으로 하는 급성 에르고트 독성이 나타날 수 있다. 클레리트로마이신과 이 약물과의 병용투여는 금기이다. ⑦ 실데나필, 타달라필, 비테나필, 이들 각각의 포스포디에스테라제 저해제들은 적어도 일부면 CYP3A에 의해 대사되며, CYP3A는 주로 클레리트로마이신에 의해 저해된다. 위 약물들과 클레리트로마이신의 병용투여는 포스포디에스테라제 저해활동의 상승을 야기할 것이다. 클레리트로마이신과 위 약물들을 병용투여하는 경우, 위 약물들의 용량 강도를 고려하여야 한다. 5) 디국신은 유출운반체(efflux transporter)인 P-glycoprotein(Pgp)의 기질로 여겨진다. 클레리트로마이신은 Pgp를 저해하는 것으로 알려져있다. 클레리트로마이신과 디국신을 병용 투여했을 때, 클레리트로마이신에 의한 Pgp의 저해는 디국신 수치의 상승을 야기한다. 디국신의 혈청 농도를 상승시킨다는 보고가 있으므로 디국신과 병용투여 하는 경우에는 디국신의 혈청농도를 모니터링한다. 일부 환자에서는 치명적일 수 있는 부정맥을 포함한 디국신 독성과 일치하는 임상증상이 나타났다. 6) HIV 감염 성인 환자에게 이 약과 지도부딘을 경구로 병용투여 하는 경우에는 지도부딘의 흡수를 방해하여 지도부딘 농도 항정상태를 저하시킨다. 이 약은 동시 투여한 경구 지도부딘의 흡수를 방해하는 것으로 나타났으며 이 약과 지도부딘의 투여 간격을 두면 이 상호작용을 대부분 피할 수 있다. 이 약과 지도부딘 또는 디데옥시이소신을 병용투여한 소아 HIV 환자에서는 이러한 상호작용이 관찰되지 않았다. 성인 HIV 환자에서는 디다노신의 약동학에 대해 통계적으로 유의한 영향은 없었다. 7) 란소프라졸과 병용투여하는 경우에는 혈청 농도가 경미하게 상승한다는 보고가 한 건이 있으나, 용량 조절 등에 대한 경고를 뒷받침할만한 자료는 없다. 건강한 성인에 대해 8시간마다 클레리트로마이신 500mg과 1일 1회 오메프라졸 40mg을 병용투여 하였을 때 항정상태 오메프라졸의 C_{max}, AUC₀₋₂₄와 T_{1/2}이 각각 30%, 89%, 34% 증가했다. 평균 24시간 내 위장 pH가 오메프라졸 단독투여 시는 5.20이고 이 약과 병용 투여했을 때는 5.70이었다. 8) 리파부틴 또는 리라파틴과 병용투여하는 경우 클레리트로마이신 농도가 감소된다. 클레리트로마이신은 리파부틴의 혈청 및 조직 내 농도를 증가시켜 독성을 증가시킬 수 있고, 포도당방출의 위험성 증가를 초래하였다. 9) 리토나비르와 병용투여하는 경우에는 클레리트로마이신의 대사를 현저히 방해한다는 약물동력학 연구보고가 있다. 클레리트로마이신의 치료영역이 넓기 때문에 신기능이 정상인 환자에 대해 이 병용강제가 필요하지 않지만 신부전 환자는 다음과 같이 용량조절이 필요하다. 즉 크레아티닌청소율이 30~60mL/min인 환자는 용량을 50% 줄여서 사용하고, 크레아티닌청소율이 30mL/min 이하인 환자는 75% 줄여서 사용하고, 리토나비르와 병용투여 시 클레리트로마이신의 용량이 1g/일을 초과하지 않는다. 인디나비르와 병용투여 시에는 대사상호작용이 나타난다는 보고가 있다. 그러나 신기능이 정상인 환자에 대해서는 용량조절이 필요하지 않다. 신부전 환자에서 리토나비르를 다른 HIV 프로테아제 억제제(이타나비르, 시쿠나비르 포함)에 대한 약동학 강화제(pharmacokinetic enhancer)로서 사용할 경우, 유사한 용량강조를 고려하여야 한다. 10) 타코르리무스와 병용투여하는 경우에는 타코르리무스의 혈청농도를 증가시켜서 독성을 증가시킬 수 있다. 11) 아목시실린 및(또는) 오메프라졸과 병용투여하는 경우에는 각 약물에 대한 사용상의 주의사항, 약물상호작용 등을 참고한다. 12) 크레아티닌청소율이 25mL/min 이하인 환자에게 구연산리나티딘 비스무소요법과 병용하는 것은 바람직하지 않다. 금성표피파괴증의 병력이 있는 환자에게는 구연산리나티딘 비스무스와 병용하지 않는다. 구연산리나티딘 비스무스와 병용투여 시 혈중 라니타딘의 농도는 57% 상승, 혈중 비스무스 최저 농도는 48% 상승했으며 14-하이드록사-클레리트로마이신의 농도는 31% 증가했으나 이는 임상적 의미가 없다. 13) 클레리트로마이신과 이트라코나졸은 CYP3A의 기질이며로서 또한 저해제이며, 양방향 약물 상호작용을 일으킨다. 클레리트로마이신은 이트라코나졸의 혈장 농도를 증가시키며, 이트라코나졸은 클레리트로마이신의 혈장 농도를 증가시킨다. 이트라코나졸과 클레리트로마이신을 병용 투여받는 환자는 약물학적 활성의 증가 또는 연장의 징후에 대해 주의 깊게 모니터링 되어야 한다. 14) 경구용 혈당강화제 그리고그로드는 인슐린과 병용 투여하는 경우에는 현저하게 저혈당이 나타날 수 있다. 나테글리나이드, 피오글리타존, 레파글리나이드, 로지글리타존과 병용시, 클레리트로마이신에 의해 CYP3A 호소가 저해될 수 있으며, 저혈당을 일으킬 수 있다. 혈당을 주의깊게 모니터링 하도록 한다. 15) 펠로디닌과 병용 투여하는 경우에는 약물배설이 지연되어 약물효과가 상승될 수 있으므로 주의한다. 16) 베르리달, 미졸

라스틴, 에바스타틴과 병용 투여하는 경우에는 심실운동, 특히 Torsades de pointes 장애의 위험이 있다. 17) 카베골린, 페르골리드와 병용 투여하는 경우에는 과다투여 시 작용이 증가하고 혈청농도가 증가될 수 있다. 18) 툴터로딘과 병용 투여하는 경우 툴터로딘을 신진대사가 느린 환자에게 과다투여 시 툴터로딘의 혈청농도가 증가할 수 있다. 툴터로딘의 주요 대사 경로는 시토크롬 P450의 2D6 isoform(CYP2D6)이나, CYP2D6가 결여된 집단에서는 CYP3A로 대사되는 것으로 확인되었다. 이러한 집단에서 CYP3A를 저해하면, 툴터로딘 혈청농도의 증대한 상승이 야기되었다. CYP2D6에 대해 약한 대사능을 가진 집단(CYP2D6 poor metabolizer)에게 클레리트로마이신과 같은 CYP3A 저해제를 병용하는 경우, 툴터로딘의 용량 감소가 요구된다. 19) 할로판트린과 병용 투여하는 경우에는 심실운동, 특히 Torsades de pointes 장애의 위험이 있으므로 가능하면 QT 검사를 미리 실시하거나 심전도를 모니터링 감측한다. 20) INR(국제제화상비율)의 변화 : 이 약을 포함한 항생물질을 항응고제와 동시에 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고되었다. 감염성질환(그리고 염증성 과정을 동반한) 환자의 연령과 일반적인 상태는 위험요소가 된다. 이 약과 와파린을 병용투여 했을 때, 심각한 출혈의 위험이 있고, INR과 프로트롬빈 시간의 현저한 증가가 있었다. 이 약과 경구용 항응고제를 병용투여할 때는 INR과 프로트롬빈 시간을 자주 모니터링해야 한다. 필요한 경우 경구용 항응고제의 용량을 적절히 조절한다. 항생물질의 일부 종류들, 특히 플루로퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코트리모록솔과 일부 세팔로스포린의 경우는 더 심하다. 21) 칼슘길항제(니페디핀, 염산베라파필 등)와 병용 시 주의한다. 클레리트로마이신과 베라파필을 병용하는 환자에서 저혈압, 사색성 부정맥 및 유산증 (lactic acidosis)이 관찰되었다. 22) 건강한 자원에서 대해 플루코나졸 200mg 1일 1회와 클레리트로마이신 500mg 1일 2회 병용 투여 했을때 이 약의 평균 항정상태 C_{min}와 AUC가 각각 33%, 18% 증가했으나 14-OH-클레리트로마이신의 농도는 현저한 영향을 받지 않았다. 클레리트로마이신의 용량조절은 요구되지 않는다. 23) 콜키신과 병용투여 시, 특히 고령자와 일부 신부전환자에서 콜키신 독성이 보고 되었으며 일부에서는 사망사례도 보고되었다. 콜키신은 CYP3A 및 유출운반체(efflux transporter)인 P-glycoprotein(Pgp)의 기질이다. 클레리트로마이신과 다른 마크로라이드계 항생물질은 CYP3A 및 Pgp를 억제하여 콜키신에 대해 노출이 증가될 수 있으므로 병용투여 시 콜키신 독성의 임상증상에 대하여 모니터링해야 한다. 콜키신은 Pgp 또는 강력한 CYP3A4 저해제를 복용하는 시판 도는 간 장애 환자에게 금기이므로 이런 환자에게 콜키신과 이 약을 병용투여해서는 안 된다. 24) 클레리트로마이신과 이타나비르에는 CYP3A의 기질이며로서 또한 저해제이며, 양방향 (bi-directional) 약물상호작용에 대한 근거들이 존재한다. 클레리트로마이신(500mg 1일 2회)과 이타나비르(400mg 1일 1회)를 병용투여하면, 클레리트로마이신의 수치는 2배 증가하며 14-OH-클레리트로마이신은 70% 감소하고, 이타나비르의 AUC는 28% 증가한다. 클레리트로마이신의 넓은 치료범위(therapeutic window)로 인해, 정상적인 신기능을 가진 환자에게 클레리트로마이신의 용량 감소는 요구되지 않는다. 온전한 신기능(creatinine clearance 30~60 mL/min)을 가진 환자의 경우, 클레리트로마이신의 용량은 50% 까지 감소되어야 한다. 크레아티닌 클리어런스(creatinine clearance)가 30mL/min 미만인 환자의 경우, 클레리트로마이신의 용량은 적절한 클레리트로마이신 처방에 대해 75% 까지 감소되어야 한다. 클레리트로마이신의 1일 용량이 1000mg을 초과하는 경우, 프로테아제 저해제와 병용투여해서는 안된다. 25) 클레리트로마이신과 시쿠나비르는 CYP3A의 기질이며로서 또한 저해제이며, 양방향 (bi-directional) 약물상호작용에 대한 근거들이 존재한다. 건강한 12명의 자원을 대상으로 클레리트로마이신 (500mg 1일 2회)과 시쿠나비르 (연질캡슐 1200mg 1일 3회)를 병용투여 한 결과, 시쿠나비르의 항정상태의 AUC와 C_{max} 수치는 단독 투여 시 보다 177% 및 187% 상승하였다. 클레리트로마이신의 AUC와 C_{max} 수치는 단독 투여 시 보다 약 40% 상승하였다. 시험에 사용된 용량/제형에서 두 약물의 용량조절은 요구되지 않는다. 시쿠나비르 연질 캡슐 제형을 이용한 약물상호작용 시험의 결과는 직접 캡슐 제형을 사용했을 때의 효과와 일치하지 않는다. 시쿠나비르를 단독 투여하여 수행한 약물 상호작용 시험의 결과는, 시쿠나비르/리토나비르를 투여했을 때의 효과를 대표하지 않는다. 시쿠나비르를 리토나비르와 병용하여 투여했을 때에는, 리토나비르의 클레리트로마이신에 대한 잠재적인 영향에 대한 고려를 하여야 한다. 26) 클레리트로마이신 노출은 에르트라빈에 의해 감소되었으나, 활성대사체 14-OH-클레리트로마이신의 농도는 증가되었다. 14-OH-클레리트로마이신은 *Mycobacterium avium* complex (14)에 대해 감소된 활성을 가지므로 이 병용법에 대한 연구가 되어있지 않다. 2) 이 약의 20개월 미만 MAC 환자에 대한 연구 결과는 없다. 3) 출생 직후 및 성장기 동물에 대한 이 약의 내약성은 성장 동물의 내약성과 유사하였다. 어린 동물은 급성 과량투여 시 보다 강한 정도의 뇌내약성을 나타내고, 적혈구, 혈소판, 백혈구의 경미한 감소를 나타낸다. 그러나 간, 신장, 흉선 및 생식기관에 대한 독성은 덜 민감하였다. 4) 3세 환자에 대해 발프로에이트 및 페노바르비탈과 병용투여 하였을 때 이들 약물의 농도가 증가하여 과도한 진정작용이 관찰되었다. 원인과 효과에 대한 상관관계가 성립되지는 않았지만, 발프로에이트 및 페노바르비탈 농도에 대한 모니터링을 고려하여야한다. **8. 고령자에 대한 투여** 1) 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 높은 혈청 농도가 지속될 수 있으므로 신중하게 투여한다. 2) 종종 신기능 부전을 가진 고령자에 대해서는 용량조절을 해야만 한다. **9. 임상검사에서 대한 영향** 1) ALT, AST, γ-GTP, ALP, LDH, 총 빌리루빈치가 상승할 수 있다. 2) BUN 치 및 혈청크레아티닌치 상승, 백혈구수 감소, 프로트롬빈 시간이 길어질 수 있다. 3) 헬리코박터 피로리균의 재균제진 시 주의하여야 한다. 란소프라졸 등 프로톤 펌프 저해제나 또는 아목시실린, 클레리트로마이신 등 항생물질 복용 중 또는 투여 종료 직후에는 13C-요소호기시험 판정결과가 위양성으로 나올 가능성이 있으며, 13C-요소호기 시험에 의해 재균제진을 실시하는 경우에는 이 약 투여 종료 후 4주 이후에 실시하는 것이 바람직하다. **10. 과량투여시의 처치** 1) 증상 : 이 약의 과량투여로 위장관계증상이 나타났다는 보고가 있다. 위양성대변병력이 있는 환자가 8g 과량투여 시 정신상태 변화, 질적저항, 저칼륨증, 저산소화증은 나타났다는 보고가 있다. 2) 처치 : 과량투여로 인한 임상증상이 나타나 때에는 위세척, 보조적 방법 등으로 치료해야만 한다. 다른 마크로라이드계 항생물질과 마찬가지로 혈액투석 또는 복막투석에 의한 효과는 기대되지 않는다. **11. 적응상의 주의** : 정상인 대상의 약물동태시험에서 천연규산알루미늄과 병용하는 경우 이 약의 흡수가 저하된다는 보고가 있다.

■ **저장방법** : 기밀용기, 건조차광보존, 15~30℃보관

■ **포장단위** : 30정, 100정

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(GMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지나거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하는 것이 바람직합니다.

※ 이약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 첨부서류가 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 해당약품안전관리원(drugsafe.or.kr)-의약품유사사례보고에 알려주시기 바랍니다.

※제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재용기, 케이스에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 이 약은 의사 또는 치과의사의 처방에 의하여 복용할 수 있는 전문약품입니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

‘이 첨부서류 개정일(14년 6월)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나 02-576-6121,3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의 의도서판(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.’

제조의뢰 · 판매원 : 경동제약(주)

공장 : 경기도 화성시 양감면 제양리동 224-3

제조원 : 보령제약(주)

공장 : 경기도 안산시 단원구 능남로 107, 109

소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121,3

· 작성년월 : 2014. 06

· 개정년월 : 2014. 07

경동제약주식회사

개정번호 : 1407J