

전문 의약품

의약품 분류번호	222 진해거담제
-------------	--------------

조제용



【성분·함량】 100mL 중

레보드로프로피진(BP).....600mg
 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP).....80mg
 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필(KP).....20mg

【성상】

불투명한 흰색병에 든 딸기향이 첨가된 무색의 시럽제

【효능·효과】 다음 질환에서의 기침: 급·만성기관지염

【용법·용량】

성인: 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회
 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.

소아: 레보드로프로피진으로서 적어도 6시간 간격을
 두고 투여한다.

· 10~20 kg: 1회 18mg을 1일 3회 경구투여한다.

· 20~30 kg: 1회 30mg을 1일 3회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【포장단위】 500mL (조제용)

【저장방법 및 사용기간】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간: 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP)적격
 업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나
 유통 과정중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우
 에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의 1. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우
 의사·약사와 상의하십시오. 2. 정해진 용법·용량을
 준수하십시오. 3. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십
 시요.

말초성 진해제

레피투스

(레보드로프로피진)

500mL



대우제약(주)

http://www.daewoopharm.com
 소비자상담전화 051-204-3831

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약 또는 이 약
 의 구성성분에 과민반응이 있는 환자 2) 기관지 점액
 분비 증가 환자 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군,
 섬모이상운동증) 환자 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능
 성이 있는 여성, 수유부 5) 중증의 간장애 환자 2. 다음
 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 중증 심부전 및 중증
 신장부전 환자 2) 고령자 3) 만 2세 미만의 영아 3. 이
 상반응 1) 소화기계: 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 2) 중추신경계: 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지
 러움 3) 순환기계: 심계항진 4) 피부: 매우 드물게 알레
 르기 반응 4. 일반적 주의 드물게 반수상태가 초래되
 로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용
 시 작용이 증대 될 수 있다. 5. 상호작용 예민한 환자
 에게 진정제와 병용투여 시 주의한다. 6. 임부 및 수유
 부에 대한 투여 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는
 여성, 수유부에는 투여하지 않는다. 7. 보관 및 취급상
 의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품
 질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

· 제조의뢰자: 대우제약(주)-부산광역시 사하구 다대로 153 (신명동)

· 제 조 자: (주)제이알파-경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 34-40

최종 개정 년월일: 2014.06.17

(D140701)