

라미핀정

(테르비나핀염산염)

효과적인 항진균제

라미핀정

(테르비나핀염산염)

LAMIPIN Tablet

【분류번호 : 029】

【전문 의약품】

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

테르비나핀염산염(TP) 140.625mg
(테르비나핀으로서 125mg)

■ 성상 : 흰색 나지 마백색의 원형 정제

■ 효능 · 효과

1. 성인

- 1) 피부사상균에 의한 다음의 피부진균증 : 족부백선, 체부백선, 고부백선(완선)
- 2) 손 · 발톱진균증

2. 소아

두부백선

■ 용법 · 용량

1. 성인

테르비나핀염산염으로서 1회 125 mg, 1일 2회 또는 1회 250 mg, 1일 1회 투여합니다.

질환에 따른 투여기간은 다음과 같습니다.

1) 피부사상균증

족부백선(지간형, 족저형/모카신 타입) : 2-6주

체부백선 : 2-4주

고부백선(완선) : 2-4주

2) 손 · 발톱진균증

보통 6주~3개월간 투여합니다. 손톱이나 비교적 작은 발가락에 감염된 경우, 또는 나이 어린 환자일 경우 치료기간은 3개월 이하로 단축될 수 있습니다. 발톱감염 치료기간은 보통 3개월이면 충분하지만 일부 환자들에서는 6개월 내지 그 이상의 시간이 걸릴 수도 있습니다. 발톱 성장 속도가 느린 환자일 경우 치료기간이 길어질 수 있습니다.

2. 소아 : 2세 이상의 소아에게 투여합니다. 2세 미만에 대해서는 투여경험이 없어 투여를 추천하지 않습니다.

두부백선 : 4주

두부백선은 주로 소아에서 나타납니다.

감염의 재발을 막기 위해서는 규칙적으로 적절히 정해진 기간동안 치료해야 합니다.

1) 체중 20 kg 미만(5세 미만) : 1회 62.5 mg, 1일 1회 투여합니다. 투여경험이 부족하므로, 치료의 유익성과 위험성을 고려해서 투여 여부를 결정해야 합니다.

2) 체중 20~40 kg(5세~12세) : 1회 125 mg, 1일 1회 투여합니다.

3) 체중 40 kg 초과(12세 초과) : 1회 250 mg, 1일 1회 투여합니다.

3. 신장에 환자

크레아티닌 청소율이 분당 50 mL 미만인 환자는 1일 투여량을 1/2 감량합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

1) 이 약은 만성 또는 활동성 간질환 환자에게는 권장되지 않습니다. 이 약을 처방하기 전에 간질환 및 간질환 병력의 유무를 확인해야 합니다. 간독성은 간질환 병력의 유무에 관계없이 발생할 수 있으므로, 이 약을 투여하기 전 모든 환자에게 AST/ALT 검사가 권장되며, 투여 중 치료 4-6주 후에도 정기적으로 간기능 검사를 시행하는 등 관찰을 충분히 합니다. 간기능검사 수치가 올라

가면 이 약을 즉시 중단해야 합니다. 이 약 투여 중 간기능 이상이 의심되는 증상, 예를 들어 특별한 이유없이 지속적인 구역, 식욕감소, 피로, 구토, 우상복부통증, 황달, 진한 노 또는 무른 변 등의 증상이 나타날 경우에는 즉시 의사에게 보고하도록 환자에게 주지시켜야 하며, 이러한 증상들이 나타나면 이 약의 투여를 중단하고 즉시 환자의 간기능을 검사해야 합니다.

2) 매우 드물게 간질환 병력의 유무에 관계없이 손 · 발톱진균증 치료를 위한 이 약 사용으로 사망이나 간이식을 초래하는 간부전이 발생하였다는 보고가 있습니다. 간부전을 나타내는 환자의 대다수는 중대한 기저 전신 질환이 있었고 이 약과의 인과관계는 확실하지 않았습니다. 이 약의 투여로 간손상의 진행이 확인될 경우에는 즉시 투여를 중지해야 하며 이 약 투여 시 정기적인 간기능 검사를 시행합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 만성 또는 활동성 간질환 환자(간질환 병력이 있는 환자를 대상으로 한 단회투여 약물동력학 연구에서 이 약의 체내소실율이 약 50%까지 감소될 수 있음을 보여주었습니다.)
- 3) 호중구 감소, 범혈구 감소, 무과립구증, 혈소판 감소 등의 혈액질환 환자
- 4) 중증 신부전 환자
- 5) 수유부
- 6) 2세 미만의 영아(투여경험이 없습니다.)

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 신기능 손상 환자(크레아티닌 청소율 < 50mL/min 또는 혈청크레아티닌 $\geq 300\mu\text{mol/L}$)를 대상으로 한 이 약의 사용은 충분한 연구되지 않았으므로 권장되지 않습니다.
- 2) 고령자(65세 이상)
- 3) 체중 20 kg 미만(5세 이하) · 소아
- 4) 매우 드물게 이 약을 복용한 환자에게 심각한 피부반응(예를 들어, 스티븐스-존슨 증후군, 독성피부괴사증, 호산구증가 및 전신증상을 동반한 발진)이 보고되었습니다. 진행성 피부 발진이 발생하면, 이 약의 복용을 중단해야 합니다. 건선과 피부 및 전신 홍반루프스의 촉진 또는 악화(가시한 후 조서에서 보고되었기 때문에) 이 약을 전신 또는 전신홍반루프스가 있는 환자에게 사용 시에는 주의를 기울여 사용해야 합니다.

4. 이상반응

이상반응 발현빈도는 매우 흔하게($\geq 1/10$), 흔하게($\geq 1/100$, $1/100$), 흔하지 않게($\geq 1/1000$, $1/1000$), 드물게($\geq 1/10000$, $1/10000$), 매우 드물게($1/10000$)로 구분되었습니다.

1) 간장 : 드물게 간담도계부전(일차적으로 담즙정체로 기인, 매우 드문 경우로 사망을 초래하거나 간이식이 필요한 심각한 간부전 포함), 간염, 담즙정체, 황달 등의 중요한 간장애가 나타날 수 있으므로 발진, 피부 가려움, 발열, 구역, 구토, 식욕부진, 권태감 등의 동반증상에 주의하면서 투여 초기 2개월간은 월 1회씩 간기능검사를 시행합니다. 그 후에도 정기적인 검사를 시행하면서 이상이 나타나면 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다. 드물게 γ -GTP, AST/ALT, LDH, ALP 등 간효소의 상승이 나타날 수 있습니다.

2) 혈액 및 림프계 : 매우 드물게 호중구 감소, 범혈구 감소, 무과립구증, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 인두염, 발열, 림프절종창, 자색반, 피하출혈 등의 동반증상에 주의하면서 정기적인 혈액검사를 시행하고 이상이 나타나면 투여를

증지와도 적절한 차치를 합니다. 흔하지 않게 백혈구 감소, 빈혈이 나타날 수 있습니다.

3) 피부 : 매우 흔하게 발진, 가려움, 흔하지 않게 광민성 반응, 매우 드물게 피부 적민성증후군(스토티븐스-존슨증후군), 중독성 표피괴사증후군(리델증후군), 급성 전신 발진성 증후군, 다형홍반, 독성 피부발진, 탈락피부염, 물집피부염이 나타날 수 있으며 충만해 관찰하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다. 간선형 발진 또는 간선의 악화 및 탈모가 나타날 수 있습니다.

4) 근육계 : 매우 흔하게 근육계 병용관절통, 근육통이 나타날 수 있으며, 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈중 및 오장 미오글로빈 상승을 특징으로 한 급격한 신기능 악화를 수반한 횡문근융해증이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.

5) 속 : 혈장염, 호흡곤란, 흉부압박감 등의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.

6) 피부반응 : 흔하지 않게 두드러기, 홍반, 드물게 얼굴부종, 림프관종증이 나타날 수 있습니다.

7) 소화기 : 매우 흔하게 위장관계 증상(복부만통, 식욕감소, 소화불량, 구역, 경미한 복통, 설사), 흔하지 않게 위부불쾌감, 목미음, 드물게 구토, 혀염이 나타날 수 있습니다.

8) 전신계 : 흔하게 우울증, 흔하지 않게 불안증
9) 신장 : 매우 흔하게 드물, 흔하게 미각상실을 포함하는 미각장애, 어지러움, 흔하지 않게 졸음, 감각이상 및 감각 저하, 드물게 주의력 저하, 불면이 나타날 수 있습니다.

10) 비뇨기계 : 흔하지 않게 BUN 상승, 드물게 빈뇨가 나타날 수 있습니다.

11) 눈 : 흔하게 시각장애가 나타날 수 있으며, 임상시험에서 수정체, 망막의 변화가 보고되었으나, 임상적인 의미는 확실하지 않습니다.

12) 거 : 흔하지 않게 이명이 나타날 수 있습니다.

13) 연역계 : 매우 드물게 아나필락시스 반응(혈관부종, 표재성 및 전신홍반무스프 포함)이 나타날 수 있습니다.

14) 기타 : 흔하지 않게 혈중 총콜레스테롤, 중성지방지상승, 관대관, 드물게 허의 척색, 신장항진, 부종, 월경이상, 미배, 전신 장애로 흔하지 않게 발열, 흔하게 피로, 검사 결과 흔하지 않게 체중감소가 나타날 수 있습니다.

15) 기타 시판 후 자발적 보고에 의한 이상반응(빈도불명)

시판 후 자발적 보고에서 나타난 약물 이상반응은 다음과 같으며, 이 이상반응들은 불분명한 크기의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것으로 빈도에 대한 신장 있는 평가는 어렵습니다.

연역계 : 아나필락시스 반응, 혈청병 유사 반응

눈 : 시야흐림, 시력감퇴

귀 및 미로 이상 : 난청, 청각 장애, 이명

혈관계 : 혈관염

신장계 : 영구적 후각상실을 포함한 후각상실증, 후각저하증

피부 및 피하 조직계 : 호산구증가 및 전신증상을 동반한 약물발진

위장관계 : 횡단염

근육계 및 결합조직 : 횡문근융해

인장 및 투여부위 : 인물루덴자 유사 질환

검사 : 혈액 크레아티닌신활성효소 증가

5. 일반적 주의

1) 이 약은 국소적 치료를 할 수 없는 진균증에만 투여해야 합니다.

2) 이 약이 운전 및 기계조작 능력에 미치는 영향에 대한 자료는 아직 확립되어 있지 않습니다. 이상반응으로 어지러움을 경험한 환자들은 운전 및 기계조작을 피해야 합니다.

6. 상호작용

1) 이 약의 혈장 청소율은 대사를 유도하는 약물에 의하여 촉진될 수 있으며 CYP450을 저해하는 약물에 의해 억제될 수 있습니다. 이 약의 혈장 청소율은 리팜피진과 같은 대사촉진제에 의하여 100% 증가되었고, 시메티딘과 같은 CYP450 억제제에 의하여 33% 감소되었습니다. 따라서, 이러한 약물들과 병용 투여하는 경우에는 이 약의 용량을 조절해야 합니다.

2) In vitro 시험 및 건강한 지원자를 대상으로 한 시험에서 이 약은 CYP450 2C6을 경유하지 않고 다른 CYP450을 경유하여 대사되는 대부분의 약물들(예를 들어 테르페노이드, 트라이졸람, 톨루타이드, 경구용피임제 등의) 청소율을 억제 또는 유발할 가능성은 무시할 만 하였습니.

3) 이 약과 신항제 항응고제(TCAs), 베타 차단제, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs), Class IA, IB 및 IC 부형제 치료제, MAO type B 억제제와 같은 CYP450 2C6 효소에 의해 주로 대사되는 약물을 병용투여하고 있는 환자들은 주의깊게 관찰해야 하며, 이들 병용약물의 강량이 필요할 수 있습니다. 특히 병용투여하는 약물의 치료영역이 좁은 경우에는 반드시 주의깊게 관찰합니다.

4) 이 약은 정맥투여한 카페인에의 혈장 청소율을 21% 감소시켰습니다.

5) 이 약은 테트라미린의 혈장 청소율을 82% 감소시켰고, AUC를 5배 증가시켰습니다.

6) 이 약은 사이클로스포린의 혈장 청소율을 15% 증가시켰습니다.

7) In vivo 연구에서 이 약은 안티피린이나 디곡신의 청소율에 영향을 미치지 않았 습니다.

8) 이 약과 경구용 피임약, 프로게스테론-에스트로겐 혼합제제를 병용하는 환자 에서 월경이상이 보고되었으며 주의합니다.

9) 플루코나졸은 이 약의 Cmax 및 AUC를 각각 52% 및 69% 증가시켰으며 이는 CYP2C9 및 CYP3A4 두 개의 효소를 모두 억제하기 때문입니다. 케토코나졸과 이미다졸과 같이 CYP2C9 및 CYP3A4를 억제하는 다른 약물과 함께 병용 투여되었을 때 유사한 수준의 증가가 발생할 수 있습니다.

10) 이 약은 플루코나졸의 약동학에 영향을 미치지 않습니다. 또한 이약과 병용투여가 가능한 코르티코스테로이드(트리메토프림과 실리메타수드), 지도부 또는 테오 필린 사이에 임상적으로 유의한 상호작용은 없습니다.

11) 텍스트로메탄핀잔해제, CYP2D6 probe 기질에 대해 광범위 대사자(Extensive metaboliser)인 건강한 시험자를 대상으로 한 연구에서, 이 약은 노예서 텍스트로메탄핀/텍스틀만 대사 비율을 평균적으로 16~47배 증가시켰습니다. 따라서, 이 약은 광범위 대사자(Extensive metaboliser)를 불충분 대사자(Poor metaboliser)상태로 전환시킬 수 있습니다.

7. 가임성, 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 이 약과 경구용 피임약을 병용하는 환자에서 월경이상이 보고되었으며, 발생율은 경구피임약을 단독으로 복용한 환자에서 나타나는 범위 이내였습니다. 가임기 여성에 대해 특별한 권고를 할 만한 자료는 없습니다.

2) 동물에 대한 태자 독성 시험에서 이상반응이 나타나지는 않았으나, 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에 만 투여합니다.

3) 이 약은 모유 중으로 이행되므로 이 약을 투여하는 수유부는 수유를 중단합니다.

4) 임계 투여 경험에 대한 근거 자료는 없으나 캣트의 수태는 시험에서 수태는 또는 생식기능에 이상반응이 나타나지 않았습니다.

8. 소아에 대한 투여

2세 미만의 영아에 대해서는 투여경험이 없으므로, 투여를 권장하지 않습니다. 또한 체중 20kg 미만인 유 · 소아에 대한 투여경험이 부족하므로, 이익과 손해를 고려해서 투여를 결정해야 합니다.

9. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 간장애에 대서되어 담즙이나 요중으로 배출됩니다. 고령자는 일반적으로 간 · 신기능이 저하된 경우가 많아 높은 혈중농도가 지속될 위험이 있고 이 상반증이 발현하기 쉬우므로, 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여합니다.

10. 과량투여시의 처리

소수의 과량투여(5g까지) 사례가 보고된 바 있으며, 과량투여 시 두통, 구역, 상복부 통증 및 어지러움의 증상이 나타났습니다. 치료는 일차적으로 유발된 투여에 의한 약물 제거를 한 후 증상에 따른 대응요법을 실시합니다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 이 약은 소아가 잘 볼 수 없는, 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

3) 이 약은 실온에서 햇빛을 피하여 보관합니다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(10~30℃)보관

■ 포장단위 : 30, 100 정

■ 사용기한 : 외투포장재에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 소비자상담 : 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과 되었다거나 변질, 변태 또는 오염되어나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약품을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부분서 작성일(2014년 12월 9일) 이후 변경된 내용은 코로룸제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(Tel: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※온라인 약덕도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '약품검색' 란을 참조하세요.

제조/외자 : 판매원 : 코로룸제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조자 : 동화약품(주) 충청북도 충주시 충주산단로 167

최초 작성연월일 : 20140702

최초 개정연월일 : 20141209

❖ 코로룸제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45