

ALLIGEL

500mg

제산제 알리겔 정 (알마게이트)

원료약품의 분량: 1정 중
알마게이트(KP) 500mg

성상: 흰색의 장병형 정제

효능·효과

1. 다음 질환에 사용할 수 있다.

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선: 위, 십이지장궤양, 위염, 위산과다(속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림), 역류성식도염

용법·용량

성인: 알마게이트로서 1회 1g 1일 4회 식후 1~2시간 및 취침시에 씹어서 경구투여한다.

소아(6~12세): 성인용량의 1/2을 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

다른 약물을 투여받고 있는 환자

2. 부작용

소화기계: 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

조제용
일반의약품
분류번호 234

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.

2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.

3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 상호작용

1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용(함께 복용)투여하지 않는다.

2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내, 체액의 pH 상승에 의해 병용(함께 복용)약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

저장방법: 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

제조사

(주)해스판코리아, 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

제조의뢰자

한국하원제약, 경기도 평택시 진위면 가곡길 42
http://www.hawonpharm.co.kr

※이 라벨 작성개정 년 월 이 후 변경된 내용은 홈페이지(www.hawonpharm.co.kr)의 제품정보를 통해 확인하십시오.

※의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이차드럭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)→「정보마당」→「의약품등정보」를 참조하세요.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 개정년월 2014.07



8 8065 15 0353 13

제조번호:

사용기한: