

칼리신 정 50단위

(칼리디노게나제)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

칼리디노게나제(JP) 50 IU

첨가제(동물유래) : 무수유당(기원 : 소, 사용부위 : 우유)

[성상] 흰색의 원형 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량]

1일 30~150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이상반응
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간]

제조일로부터 24개월

[포장단위]

자사포장단위

[제조의뢰 및 판매처]

(주)비티오제약 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 70

[제조사]

(주)일화 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

- ※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(☎080-001-0795) 또는 식약처 이지드럭(ezdrug.mfds.go.kr) 사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2014년 07월 04일