

※ 의약품 사용하기 전에 다음 문서를 주의 깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

정부공인 KGMP
적격업체제출

일 반 의 약 품
분류번호 : 399

네프마리정

□ 성분 · 함량 : 1정 중

지황(KP)	416.7mg	당귀(KP)	416.7mg
목동(KP)	416.7mg	황금(KP)	250.0mg
택사(KP)	250.0mg	차전자(KP)	250.0mg
감초(KP)	125.0mg	치자(KP)	125.0mg
웅담(KP)	125.0mg	육계(KP)	16.7mg
생강(생규)	16.7mg	대황(KP)	16.7mg
마황(KP)	16.7mg	연교(KP)	16.7mg

□ 성 상 : 황갈색의 삼각형 정제

□ 효능 · 효과 : 방광염, 요도염, 신장(콩팥)병, 신증후군, 부종(부기)

□ 용법 · 용량

성인 1회 3~6정

만 8세~15세 1회 2~3정

1일 2회, 아침 저녁으로 공복(빈 속)시에 복용해 주십시오.

□ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인 (이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축 작용 혹은 골반 내 장기의 유희작용에 의해 유조산(조기분만)의 위험이 있다.)
- 2) 수유부 (이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 유모중으로 이행되어 유아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금지하거나, 수유부에게는 복용하지 않는다.)
- 3) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당- 갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 분은 복용전에 의사 또는 약사와 상담할 것

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
- 2) 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 분
- 5) 지금까지 약에 의한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증 등의 경향이 있으신 분
- 6) 설사, 연변(붉은변)의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다)
- 7) 현저하게 위장이 허약한 환자
- 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다)
- 9) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 우려가 있다)

3. 복용 시 다음 사항에 주의할 것

- 1) 정해진 용법, 용량을 엄수할 것
- 2) 다음 약제와는 겸용하지 말아 주십시오
기타 설사제
- 3) 소아에게 복용시키야 할 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것
- 4) 본 제품은 5세 미만의 유아에게는 복용시키지 말 것

4. 복용 중 또는 복용 후 다음 사항에 주의할 것

- 1) 본제(이 약)의 복용에 의해 노랑이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 약사에게 상담할 것

- 2) 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감소로서 1그램 이상인 제제는 장기연용(계속 복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것
 - 3) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것
 - 4) 소화기계: 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통(배아픔), 설사 등이 나타난 경우에는 복용을 중지할 것
5. 복용 중 또는 복용후는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프게이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이 나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것
- 2) 본 제품은 하제(설사약)성분도 포함되어 있으므로 복용에 의해 묽은변으로 되기도 하지만 만약 심한 복통(배아픔)을 수반하는 설사가 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담해 주십시오
- 3) 본 제품의 복용에 의해 위부불쾌감, 식욕부진, 설사, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담해 주십시오
- 4) 1~2개월간 복용해도 증상의 개선이 보이지 않는 경우는 복용을 중지하고 의사나 약사에게 상담해 주십시오
- 5) 장기연용(계속 복용)하는 경우에는 의사나 약사에게 상담해 주십시오
- 6) 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법 · 용량에 주의한다.
- 7) 자극성 완하제는 장기간 계속 사용시 약물내 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 8) 다른 한방제제 등을 병용(함께 복용)하는 경우는 함유 성약의 중복에 주의한다. 대황 함유제제는 병용(함께 복용)투여시 특히 주의한다.

6. 보관 및 취급상시 다음 사항에 주의하십시오

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 3) 오염(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

□ 포장단위 : 20정, 180정, 360정

□ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

<이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.>

작성일자 : 2014. 06. 30
PM.102340(00)

□ 제 조 자 : 정우신약(주) : 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60

□ 제조회자 : (주)서울제약 : 경기도 시흥시 경제로 59



마음까지 건강하게
(주)서울제약