

칼러제정(칼리디노게나제)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분(동물유래성분: 돼지, 췌장): 칼리디노게나제(JP).....50IU
- 첨가제(동물유래성분): 무수유당(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 첨가제(타르색소): 황색5호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 스테아르산마그네슘, 아크릴이조오렌지(930630015), 오파드라이
헌색(OY-S-7223), 전분글리콜산나트륨, 포비돈K30, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 주황색 원형의 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 경년기장애, 만성각막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

【용법·용량】

1일 30~150 IU를 3회 분할하여 경구투여 한다(먹는다, 복용한다).

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 기타: 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

4. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.

【저장방법】 밀폐용기

【포장단위】 30정/병, 500정/병

【제조외의자】 콜마파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

【제 조 자】 영풍제약(주) 인천광역시 남동구 함박외로 333

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질 검사를 필한 제품입니다.

만약 변질 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품등 제품정보'란을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

고객문의 전화: 080-640-0088

최종개정연월일: 2020.12.30



제조의회사

콜마파마(주)

콜마파마