

# 알파리포정 (티옥트산)

- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품은 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

## 【원료약품의 분량】 1정 중

티옥트산(KPC) ..... 200mg

## 【성상】

분홍색의 원형 필름코팅정

## 【효능·효과】

당뇨병성 다발성 신경염의 완화

## 【용법·용량】

○ 성인 : 티옥트산으로서 1일 200~600mg을 2~3회 분할하여 식사 30분전에 특별한 처방이 없는 한 씹지말고 약간의 물과 함께 경구투여 한다.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

## 【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
  - 이 약에 과민반응의 병력이 있는 환자
  - 소아 및 청소년(임상경험이 없다.)
  - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 이상반응
  - 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 설사, 위장관 통증 등이 나타날 수 있다.
  - 피부 : 드물게 피부발진, 두드러기, 가려움 등의 알레르기 반응이 나타날 수 있다.
  - 드물게 포도당 이용률 증가에 의해 혈당치가 떨어질 수 있다. 이러한 경우 어지러움, 발한, 두통, 시력장애와 같은 저혈당증 유사증상이 나타날 수 있다.
  - 기타 : 드물게 미각장애가 나타날 수 있다.
  - 국내 시판 후 조사결과(조사증례수 : 2048명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 소화불량, 빈뇨, 심계항진, 복부팽만감
- 일반적 주의
 

알코올은 신경병증의 발생과 진행의 중요한 위험 요소이므로 이 약의 치료효과를 감소시킬 수 있다. 따라서 당뇨병 다발 신경병증을 가지고 있는 환자들은 가능하면 알코올 섭취를 하지 않는 것이 바람직하다. 이것은 또한, 치료를 하지 않는 때에도 적용된다.
- 상호작용
  - 이 약과 병용투여 시 cisplatin(*in vitro*상에서 금속착체를 형성함)의 작용이 감소될 수 있다.
  - 인슐린이나 다른 경구용 혈당강하제의 작용으로 인해 혈당치의 감소작용이 증가될 수 있으므로 치료의 초기에 혈당치의 엄격한 조절이 필요하며 당결핍 증상을 피하기 위하여 인슐린의 양이나 경구용 혈당강하제를 줄여야 할 경우도 있다.
  - 이 약은 금속화합물(예 : 철, 마그네슘, 칼슘제제나 우유 등)과 동시에 복용했을 때 체내에서 불용성 착화합물을 형성하므로 병용투여하지 않는다. 만일 이 약을 아침식사 30분 전에 복용할 경우 아침이나 점심식사에 철, 마그네슘이나 칼슘제제를 섭취하지 않는다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
  - 생식독성 연구결과 어떠한 태생 독성도 나타내지 않았으나 임부 및 수유부에 대해서는 의사와 상담 하여 약물의 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
  - 약물의 모유중으로의 이행은 알려진 바가 없으므로 수유기에는 투여하지 않는다.
- 과량투여시의 처치
  - 증상 : 이 약으로서 10~40g에 해당하는 양과 알코올을 함께 경구 복용했을 때 심각한 중독증상이 관찰된 바 있다. 중독의 임상증상은 초기에 의식의 혼미 또는 정신운동성 불안의 형태로 나타나며 심해지면 경련과 유산산증이 나타난다. 또한, 이 약의 고용량 중독으로 저혈당, 속, 횡문근변성, 용혈, 파종성 혈관내 응고, 골수억제, 다발성 기관기능 상실 등이 나타난 바 있다.
  - 처치 : 이 약의 중독이 의심될 경우에는(예 : 성인의 경우 200mg 30정 이상, 300mg 20정 이상, 소아의 경우 50mg/Kg이상) 즉시 입원하여 중독증상에 맞는 치료를 실시해야 한다(예 : 구토, 위세척, 활성탄 투여). 경련, 유산산증 등의 심각한 중독에 대해서는 증상에 따른 집중적 치료를 실시해야 한다. 혈액투석, 관류, 여과 등에 의해서 이 약의 배출이 촉진되는지는 아직 확인되지 않았다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
  - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

## 【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

## 【포장단위】

30정, 500정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '온라인 의약품서관 (<http://drug.mids.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성연월일 : 2014. 07. 24

EJ3457-01

제조사 :

**Huons** 주식회사 휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100

제조회자 :

**Huniz** 주식회사 휴니즈

부산광역시 강서구 녹산산단 165로 22

판매자 : (주)행복약품

인천광역시 남동구 성일로 9 (구월동 이노프라자 405호)

소비자 상담실(반품 및 교환처) : 032-425-5525