

콜세린정

(콜린알포세레이트)

031902-008

[원료약품 및 그 분량] 1정 중,

- 유효성분: 콜린알포세레이트(KP) 400mg
- 기타첨가제: 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 이산화규소, 폴리메틸렌글리콜4000, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 폴로이드성아산화규소, 오파드라이 노락셀200F620010

[성상] 담황색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군:
기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
☆ 국내임상시험결과 추가제출

[용법·용량]

콜린알포세레이트로서 1회 400mg을 1일 2~3회 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 이상반응
 - 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
 - 2) 소화기계: 위염, 위궤환
 - 3) 정신신경계: 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 90정(10정/PTP×9)

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품에 관한 의사사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678; 수신자 요금 부담)로 문의하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원(1644-6223)
- 제조의뢰자: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19
- 제조자: 한국프라임제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

설명서 최종 개정 연월일: 2022. 11. 14

본 제품은 인습성이 있으므로 PTP포장상태로 보관 및 조제하시고, 복용할 때 개봉하십시오.