


**로바스타정 20mg**

**ROVASTAR Tabs. 20mg**  
(Rosuvastatin)



[원료약품 및 그 분량] 정량

로수베스타틴칼슘(별규)

(로수해스탈린으로서 21세기)

20.67g

첨가제(타르색소) : 황색 83호알루미늄레이크 적색 4호알루미늄레이크

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

(५३-५४)

1. **혈장성 고콜레스테롤혈증**(이성 지질) 가족성 고콜레스테롤혈증은 포화지방 (飽和脂) 과 불포화 지방 (不飽和脂) 이: 식이 및 운동으로 조절이 가능한 경우 식이요법과 운동
2. **동맥질환** 가족성 고콜레스테롤혈증은 식이요법이나 다른 치료제와함께 (이) 약물 치료법의 보조제
3. **고콜레스테롤혈증** 환자에서 콜레스테롤을 LDL-콜레스테롤을 목표 수준으로 낮추기 중성지방결핍증의 징후를 지니
4. 식이요법으로 불충족이고 약제에 의해 개선도 허락없는. 이런 가족성 고콜레스테롤혈증 가진 환자에서 **중성지방 결핍증**의 징후가 있을 경우
  - ▶ LDL-콜레스테롤이  $< 100 \text{ mg/dL}$  을 초과하는 경우 (LDL-C)  $< 100 \text{ mg/dL}$
  - ▶ LDL-콜레스테롤이  $< 100 \text{ mg/dL}$  을 초과하지 (LDL-C)  $< 100 \text{ mg/dL}$  이기 실험관 혈액의 가족력이 있거나 두가지 이상의 심혈관 질환을 앓고 있는 경우
5. **콜레스테롤** 약제(스타틴)로 치료하지 않고도 혈액의 **식도** 조절 보조제
6. **콜레스테롤** 약제에 대한 반응성: 중성지방 결핍증의 징후가 없거나, 또는 약제의 실험관 혈액의 콜레스테롤과 중성지방은 고지혈증 (hyperlipidemia)에 대한 반응이 양호한 경우
  - ▶ 콜레스테롤을 줄인 다음도 초기 중성지방 실험관 혈액의 지질 개선이 충분치
  - ▶ 나일콜에 대한 위험성 감소
  - ▶ 심근경색에 대한 위험성 감소
  - ▶ 심혈관 질환의 예방에 대한 위험성 감소

[附註]

- [illegible]

【註】  
【註】

- [illegible]

- 7) 근병증/형문근육병증에 걸리기 쉬운 환자들에게 이 약 40밀리그램 용량 투여는 금기이다. 이러한 인자들은 아파와 같다.

- 종동도 신장액 (크리미던 황소) (200mm)
- 감시가능지점중
- 유전적인 근질병 발생 가능적이 있는 경우
- 다른 비육도 전조상과 비육도 계통의 알을 교배한 경우
- 발육중 장애
- 형질 능력이 증가할 수 있는 상황
- 매우저지 현상
- 파노메트릭 계통의 알을 교배할 때

- 9) 이 약은 위장을 흡수하고 있으며, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), 락포오스 불내성(lactose deficiency) 또는 락토오스 흡수장애(lactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 없는 환자에게는 투여하면 안 된다.

- 2 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- [illegible]

- 알코올 남용
- 간염 바이러스 노여
- 혈장 농도가 증가할 수 있는 상황
- 피브리노겐 혈중 인종 보호에

- [illegible]

- ### 3. 이종영

- [illegible]

|     |     |    |    |
|-----|-----|----|----|
| 발행처 | 발행처 |    |    |
| 면적  | 면적  | 면적 | 면적 |
| 인구  | 인구  | 인구 | 인구 |
| 산업  | 산업  | 산업 | 산업 |

