

아세렌 25mg

콜관절염치료제

(디아세레인 25mg)

분류번호: 399

전문약품

Aceren Cap. 25mg

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

디아세레인(식약청고시).....25mg

- 유 당 <기원> 소 사용 : 우유
- 젤라틴 <기원> 소 사용 : 가죽

【성 상】

황갈색의 내용물이 들어 있는 상부 주황색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】 골관절염(관절증, 퇴행성 관절질환)

【용법·용량】

성인 : 디아세레인으로서 1일 50~100mg을 1~2회 분할하여 식후 경구투여 한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 임증성 대장 질환 환자(계양성 대장염, 크론병)
 - 2) 장폐색 증후군 환자
 - 3) 원일불명의 복통환자
 - 4) 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 Rhein계(안트라퀴논 배당체) 약물에 과민반응 환자
 - 5) 중증의 간부전 환자
 - 6) 15세 미만의 소아
 - 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 장애가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 소장, 결장 질환의 병력이 있는 환자(이 약은 안트라퀴논배당체인 환자에게는 투여하면 안 된다.)
 - 2) 임부 및 수유부
 - 3) 고령자(용량 감소가 필요하다.)
 - 4) 이 약은 황색5호(선색염로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

1) 소화기계 : 설사, 묽은 변, 복통, 장기투여 시 위장장애(출혈, 궤양 및 천공), 드물게 직장 점막의 색소 침착이 나타날 수 있다.

2) 피부 : 가려움, 발진, 습진 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

장기 연용할 경우 의사의 지시에 따른다.

5. 상호작용

1) 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유한 제산제 및 소금 이 약의 위장관 흡수를 저해하므로 가능하면 2시간 이상의 간격을 두고 투여한다.

2) 이노제와 병용투여시 이노작용이 약하게 증강될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물실험에서 태자의 골형성 지연이 보고 되었다.

2) 이 약이 인체내에서 태자에 미치는 영향에 대한 자료는 없으나, 모두 중으로 안트라퀴논 유도체가 소량 이행되므로 임부 및 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

7. 과량투여시의 처리

1) 증상 : 과량투여 시 심한 설사가 나타날 수 있다.

2) 처치 : 필요시 전해질 공급 등의 대증용법을 실시한다.

【저장방법】 기밀봉기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30캡슐, 100캡슐, 500캡슐

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효기간)이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2014년 09월 02일) 이후 변경된 내용은 대화제약 홈페이지나 마케팅팀(080-855-0114)으로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의 약도서관(<http://druginfo.dhpharm.co.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.

첨부문서 개정일 : 2014년 09월 02일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16

공정:강원도 황성군 황성읍 한우로 495

<http://www.dhpharm.co.kr>