

알룬 츠어블정

Alloon Chewable Tab.

- ※ 의약품용 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품용을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품용을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

알긴산(BP)	200.0mg
카르복시메틸셀룰로오스나트륨(KP)	100.0mg
첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미니움리크	

【성상】

연한 노란색의 원형 츠어블정

【효능·효과】

음식을 섭취 곁소를 통한 체중감량의 보조요법

【용법·용량】

1일 3회 2정씩 식전에 입안에서 녹이거나, 씹어서 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3-4주간 복용할 것이 권장된다.

【사용상의 주의사항】

※ 1일 허용량제한

아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한한 최소화) 사용할 것. 60kg 성인 : 1일 최대복용량 2.4g

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에게는 투여하지 말 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 유산아
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용

하지 않는 것이 좋으며, 복용할 경우 30분~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 및 수유부

2) 소화기 장애 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약은 복부(배부분) 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것.

2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실(없어짐)될 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안된다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

180정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성연월일 : 2014. 08. 07

E.0469-01

주식회사 유은스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100

소비차 상담실(반복 및 교환차) : 080-447-4700

Huons