

■ 순환장애 개선제

칼리젠정

(칼리디노게나제)

KALLIGEN Tab.

【원료약품 및 분량】 1정 중

칼리디노게나제 (JP) 50 I.U

첨가제(동물유래) : 칼리디노게나제(돼지췌장), 무수유당(소의 원유에서 유래)

【성 상】 흰색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

【용법·용량】

1일 30~150I.U를 3회 분할하여 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【포장 단위】 300정, 30정

【저장 방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

【제 조 원】 (주)일화 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

【제조외판원】 (주)뉴젠팜 전북 익산시 석암로 9길 117

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

※ 첨부문서를 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

개정년월일 : 2014. 08. 08

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부(Tel : 02-580-5900(대))로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지(www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되었으며, 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인 의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.