

광범위 피부질환 치료제 (항균·항바이러스 작용)

잘큐어 젤

티로트리신

잘큐어젤
ZALCUREGEL.

KGMP 일반의약품

분류번호: 629

사용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관 하십시오.

● 원료약품 및 그 분량 1g 중

티로트리신(KP) 1.0mg(역가)
첨가제(보존제) : 설퉴필리디늄염화물수화물 0.5mg

● 성상

무색의 투명한 젤

● 효능·효과

감염의 우려가 있거나 감염된 외상(상처, 화상, 긁은 피부감염, 하지(다리)족부궤양에서의 피부전균(곰팡이)감염, 습진에서의 2차감염, 입술포진(물집)

● 용법·용량

감염된 부위에 하루 2~3회 적당량을 바른다.
가벼운 상처나 점막 부위의 감염에는 드레싱이 필요하지 않다. 광범위한 질환 부위 및 심한 삼출성 상처에는 드레싱이 권장되며 제품을 1~2회 사용시마다 드레싱을 교체하는 것이 권장된다.

● 사용상 주의사항

1. 다음과 같은 사람(신체 부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 코점막 부위

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약의 주성분과 보존제가 모두 중으로 분비된다고 알려져 있으므로 이 약을 사용하는 동안 수유하거나 수유하는 동안 이 약을 사용하지 않는다.
- 2) 눈에 직접 닿으면 화끈감이 나타날 수 있으므로, 눈 주위에 사용할 경우 이 약이 눈에 직접 닿지 않도록 주의한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

이 약에 포함된 프로필렌글리콜에 과민반응의 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 피부 화끈감 등의 과민반응
- 2) 이 약을 사용한 후 증상이 악화되거나, 일주일 이상 사용하여도 증상의 개선이 없는 경우

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 오(잘)못 사용·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
- 3) 제품 개봉 후 3개월 이내에 사용할 것.

● 저장방법 : 기밀용기, 25℃ 이하 보관

● 포장단위 : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● 제조자 : 성광제약(주) 충남 천안시 서북구 백석공단1로 47

● 제조의뢰자 : 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 49

※ 기타주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
3. 이 약은 외용으로만 적용하시고 내복은 금하시기 바랍니다.

※올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.

소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

※만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품사전 「<http://drug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.

LEMONA 경남제약(주)

Kyung Nam Pharm Co., Ltd.

첨부문서 작성연월일 : 2013. 11. 21