



일반 의약품

분류번호:234

알마제트정

(알마게이트)

500정

조제용

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 알마게이트(KP) 500 mg
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 콜로이드성 아산화규소, 크로스포비돈

[효능 및 효과]

다음 질환의 재산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법 및 용량]

성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분~1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민 반응이 있는 환자
 - 알츠하이머병 환자
 - 치질 환자
 - 체액 저류(부기) 환자
 - 임신 중독증 환자
 - 설사 환자
 - 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 테트라사이클린계 항생물질함께 복용시 흡수를

억제할 수 있음

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착 작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.

(1) 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3 시간 간격을 두고 복용한다.

(2) 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킨다.

2) 신장에 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장에 환자에게는 권고되지 않는다.

3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.

4) 고령자

5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
 - 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도

감독하에 복용시킬 것.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[성상] 흰색의 정방형 정제

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

[제조·외자] 조아제약(주)

경상남도 함안군 함안면 광릉로 318

[제조자] (주)씨티리 경기도 남양주시 경강로 27

[수신자부담고객상담실] 080-998-8889

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 무작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

(4200190) 개정연월일 : 2018. 12. 17 (Rev.3)



8 806446 029313

제조
번호
사용
기한

	5mm
	5mm