

생각능 + 향산화 비타민 + 미네랄

히톤플러스 연질캡슐

HIMTON Plus Soft Cap.

분류번호: 30



저희 메디카코리아는 인간종양의 기원, 함께 나눌 줄 아는 기질이인 장암예방을 바탕으로 인류의 건강지킴이로써 심을 위해 우수한 품질의 제품을 제공해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약을 하나하나에는 성령의 은사를 담아 가장 귀한 자로 여기는 메디카코리아 합직원들의 헌신이 깃들여 있습니다.

【성분·함량】1캡슐 중

저리놀말미티아이드(PPA) (비타민 A로서 2,500IU)	1,47mg
아스코르브산(VC)	500mg
토코페롤이세티레이트(VE) (비타민 E로서 100IU)	100mg
생리활성황유건조효모(비타민 B12로서 500ng)	35.492mg
산화아연(Zn) (아연으로서 15mg)	18.67mg
산화마그네슘(Mg) (마그네슘으로서 300mg)	5mg
유심황간수화물(0.5%) (인산으로서 0.5mg)	1.54mg
무수칼슘이세티레이트(Ca) (칼슘으로서 0.5mg)	1.20mg
착색제: 카키오색소, 치자청색소	

【성상】

원색의 내용물이 든 알칼리의 정방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 다음 경우에 비타민 A, E, C 의 보충
 - 목욕비로, 임신·수유기, 병중·병후(방출)를 앓는 동안이나 회복 후)의 체력회복, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 눈의 건조증의 완화, 야맹증(밤에 잘 보이지 않음)의 증진
 - 일조불안장애 및 경면기시(피부) 증상의 완화, 아토피, 모낭염, 수족皸(손)·수족냉증(발)이 치유됨
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(피) 예방
- 이 약의 보충

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- (1) 일부에 비타민 시토타놀을 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형물 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 마십시오(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
(2) 만 12개월 미만의 영아
(3) 원소변
(4) 심장 증상의 심부전 환자
(5) 티두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
(6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 알칼리, 칼슘염, 경우를 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 시(병명)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(2) 고콜레스테롤증 환자(hypercholesterolemia) : 오줌에 과량의 수산염이 배설되는 상태
(3) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 마약, 유마
(4) 위약에서 임신 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 여아에서 두부신경통 등을 증상으로 하는 기형발생(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보충을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에서 미량으로 하는 등 적절한 주의를 합니다.
(5) 소화장애, 만성폐렴성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
(6) 심장·순환기계기능 장애 환자
(7) 신장장애 환자

- (7) 지반변형증 환자
(8) 당뇨병(가관) 환, 간질환 환자
(9) 동맥경화 또는 신장결석에 있는 환자
(10) 임부
(11) 고지단백질증, 당뇨병성고지질혈증 및 혈장(이)지질 등 지방대사 이상 환자 또는 지질상 유지를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상할 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
(2) 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기)
(3) 위부(상복부)통, 설사, 변비, 발진, 발적(홍반)이 나타남
(4) 상복부 통증, 혼수
(5) 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
(6) 피부염, 발·손톱의 악성 발모, 조골증
(7) 위장관장애, 소화장애, 지열발, 피부부(부기)
(8) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
(9) 메스프로전을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 항간생환관(항) 소인인 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증(혈관막의 위험)이 증가될 수 있습니다.
(10) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
(11) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고지단백혈증, 골혈신부전, 부정맥(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
(12) 장기간 고용량의 비타민 A(메스프로틴)로부터 전염된 것을 제외한 심위는 제정기를 지닌 여성의 골다공증(골밀도) 위험을 높일 수 있습니다.
(13) 혈당(포도당)에, 트리탄테라와 병용(합제 복용)하여서 고혈당혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
(14) 우발적으로 과잉복용 한 경우
(15) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
(2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법적 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
(3) 직종 요건시에는 혈당의 검사를 방해할 수 있습니다.
(4) 복치, 출자 등 탄생을 하는 것은 복용중, 복용후에는 피하십시오.
(5) 지방카복으로 특별한 위험이 예상되는 환자(예) 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 측정할 것을 권장합니다. 이 전검을 통해 지방의 체지방률이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조정합니다. 원하지 않는 경우를 지질제를 동시에 투여하고 있다면 이 약 용의 부위를 흔적(적)이 있는 지점의 양을 고려하여 그 지점(적)의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
(2) 직사광선을 피하고 할 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (일별)에 보관하십시오.
(3) 오용(오용) 사용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(10~30℃)보관

【포장량】 50캡슐, 100캡슐

【사용기간】 제조일로부터 24개월

제조회사: (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 90
제 조 자: (주)알파로프 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조합니다. 혹시 사용 기간이 경과되었거나 유통과정 중 변질·훼손된 제품을 구입 경로를 통하여 교환 해 드립니다.

K 식품의약품안전처 온라인의약품안전망(<http://drug.mfds.go.kr>)을 방문하시면 첨부문서 작성 (제정)일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 본사 마케팅부 (070-4018-8022) 또는 개별부 (070-4018-8013~8015)로 문의바랍니다.

작성일자: 2014.09.19
MK14091801

MEDICA (주)메디카코리아
KOREA
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 90