

골격근이완제

에페노정 (에페리손염산염)

Periprone HCl 50mg

972040-03

전문의약품

분류번호 122

【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분: 에페리손염산염(KP) - 50mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 침강탄산칼슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 리우랄황산나트륨, 아산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프록셀로오스2910, 이소프레이판셀(GAIEKRP001A)

【성상】

흰색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

- 근골격계질환에 수반하는 통증성 근육연축·경직·경련·경추근, 견관절주위염, 요통
- 신경계 질환에 의한 경직성 마비: 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질질환

【용법·용량】

성인: 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 중증의 근무력증 환자
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다.)
- 이상반응
 - 1) 속: 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 간장: 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 3) 신장: 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 4) 혈액: 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 5) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
 - 6) 정신신경계: 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다.
 - 7) 소화기계: 때때로 구여, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
 - 8) 비뇨기계: 드물게 요배, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.
 - 9) 전신증상: 때때로 무력감, 비틀거림, 전신편대감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있다.
 - 10) 기타: 때때로 인면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있다.
 - 11) 국내 시판 후 수집된 중대한 이상사례 분석·평가 결과 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 면역계: 아나필락시스반응
- 일반적 주의
 - 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 강령 또는 투여를 중지한다.
 - 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여 중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 상호작용
이 약의 유사작용인 염산톨페리손과 메토키르바를 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.
 - 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
- 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
- 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자에서는 생리능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 500정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화(02)3487-7005으로 하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품을 복용(사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어하여야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

【제조자】 (주)넥스팜코리아 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 168-41

【제조(외)자】 (주)이든파마 충북 진천군 문백면 농다리리 1149

개정연월일 : 2018년05월14일