

※ 의약품 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

전문약품

분류번호 219

KGMP 적격업체

칼리다정

(칼리디노게나제)

원료약품 및 그 분량 1정 중

칼리디노게나제(P):.....50 I.U.

첨가제(동물유래): 무수유당(기원동물:소, 사용부위:우유)

성상

흰색의 원형 장용성 필름코팅정

효능·효과

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

용법·용량

1일 30~150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 부작용

- 1) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 기타: 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있습니다.

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

저장방법

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위

30정, 300정

취급상의 주의사항

- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2014년 09월 01일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일: 2014. 09. 01
1409-00

슈넬생명과학(주)

Schnell Biopharmaceuticals, Inc.

경기도 화성시 양감면 두머리길 16

제조의뢰자: 슈넬생명과학(주) - 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

제조사: (주)일화 - 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55