

루비펜 플라스타

(플루르비프로펜)

일반의약품

분류번호: 264



[성분·함량] 1매 (7X10cm, 1.15g) 중

플루르비프로펜(KP) 20mg

[성상] 미황색의 점착성 물질을 살구색 린트포상에 도포하여 점착면에 박리지를 덮은 첩부제

[효능·효과] 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염)

— 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건(힘줄)·건초염(힘줄은 활막염), 상완골(위팔뼈)상과염(테니스엘보 등), 근육통, 외상(상처) 후의 통증(부기)·동통(통증)

[용법·용량] 약면의 박리(벗겨짐)지를 떼어낸 후 환부(질환 부위)에 1일 2회 부착한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 이 약 및 기타의 플루르비프로펜 제제에 과민증의 병력이 있는 환자 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있다)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있다)

3. 부작용

1) 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 약진(약물발진), 가려움 및 작열감(화끈감), 접촉피부염이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건설 수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거름), 호흡곤란 등의 초기 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 천식발작은 이 약의 부착 후 수 시간 내에 나타난다.

4. 일반적주의

1) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별 치료하는 방법)임에 유의한다. 2) 피부감염증을 불현성화(겉으로 드러나지 않게) 시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균(곰팡이)제를 병용(함께 사용)하고 충분히 관찰하여 신중히 투여한다. 3) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 이 약을 사용할 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄)에 유의한다.

제조번호 :

사용기한 :

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단될 경우에만 투여한다.

6. 소아에 대한 투여

소아에는 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

7. 고령자(노인)에 대한 투여

고령자(노인)에는 이 약의 부착 부위의 피부상태에 주의하며 신중히 투여한다.

8. 적용상의 주의

1) 손상된 피부와 점막에는 사용하지 않는다. 2) 습진 또는 발진부위에는 사용하지 않는다. 3) 적용부위의 피부를 닦아낸 후 사용한다.

[저장방법] 차광한 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 의약품 사용하기 전에 표시기재를 주의 깊게 읽고, 표시기재를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 의약품은 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염·손상된 제품의 경우 구입하신 병·외원 또는 약국을 통하여 교환하여 드리며, 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

※ 표시기재 개정일자(2014. 03. 20) 이후 변경된 내용은 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시거나 02)3463-7111로 문의하여 주십시오.

루비펜 플라스타 사용방법

- 환부(질환 부위)를 깨끗이 하고 건조상태에서 부착하십시오.
- 무릎에 부착할때에는 45도 굽힌 상태에서 부착하십시오.
- 손목 및 손가락 관절에는 적당한 크기로 잘라서 사용하십시오.

제조의처

생명과학 연구중심 제약기업
테라젠이텍스
경기도 안산시 단원구 신안로66번길 98

제조사

녹십자
GREEN CROSS
충북 음성군 강양읍 무곡로 65번길 26



188069850264 12

RBA20-150225-01