

399
의약품 분류번호
따로 분류 되지 않는 대 사성 의약품



일반의약품

원료약품의 분량

이 약 100mL 중
시트룰린말산염(별규).....10g
첨가제(보존제) : 벤조산나트륨(KP).....0.06g

성상

오렌지향의 무색 내지 옅은 황색의 액

효능·효과

기능 무력증의 보조치료

용법·용량

- 성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 1g, 1일 3회 물에 희석(물게 함)하여 복용합니다.
- 소아 (6세이상) : 이 약으로서 1회 1g, 1일 2회 물에 희석(물게 함)하여 복용합니다.
단, 4주 이상 투여하지 않습니다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
6세 미만의 유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 임부 (동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는

것이 바람직합니다.)

- 수유부 (유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직합니다.)
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지키십시오.
 - 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시키십시오.
 - 드물게 투여초기에 약한 위장관(창자) 장애가 나타날 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

포장단위

10mL×자사포장단위

저장방법

기밀용기, 25℃이하 보관

교환 및 제품문의

이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.
연락처 : 고객센터팀 1588-2675

- 제 조 자 : 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245
- 제조외의자 : 제이더블유중외제약(주)/ 충남 당진시 송악읍 한진1길 56



첨부문서 작성년월일 : 2014. 8. 28 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

jw 중외제약
제이더블유중외제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진1길 56