

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

순환기계 장애 치료제

칼리게나정

(칼리디노게나제)

전문 의약품

분류번호:219

【원료약품 및 분량】 1정 중

■유효성분 : 칼리디노게나제(돼지, 췌장)(JP)..... 50 IU

■첨가제(동물유래성분) : 무수유당(건강한 소의 우유)

■기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환하이드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프롬멜로오스프탈레이트

【성 상】 흰색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

【용법·용량】

1일 30-150 IU를 3회 분할하여 경구 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고려자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 **【사용(유효)기간】** 제조일로부터 24개월 **【포장단위】** 30정, 300정 / 병포장

※의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

* 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

※소비자상담실 : 080-861-8282

본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

설명서 최종 개정년월일 : 2026년 01월 05일
PI-184-201230(Rev.02)

제조의뢰자



(주)퍼슨 충청남도 천안시 서북구 백석공단 1로 47

제조사

(주)일화 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

판매자

인헌약품

경기도 파주시 조리읍 내산길5