

부작용을 줄인 3세대 세파게 항생제
코프심 건조시럽
 50mg/5mL
 (세프포독심프록세틸)

Kofxime Dry syrup

【분류번호: 618】
 【전문 의약품】

■ 원료약품 및 그 분량: 이 약 100 g 중

세프포독심프록세틸(KP) 5,000mg(약가)
 첨가제(보존제): 벤조산나트륨(KP) 60mg
 첨가제(타르색소): 적색40호, 황색203호

■ 성상

적황색-오렌지색의 과립

■ 효능·효과

• 유효균종

포도상구균, 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 모락셀라 카타랄리스, 대장균, 시트로박터, 클레브시엘라, 엔테로박터, 프로테우스(프로테우스 미라빌리스, 프로테우스 볼가리스, 프로비덴시아 레트게라, 프로비덴시아 인콘스탄스), 인플루엔자균

• 적응증

- 중기, 중기증, 옹종, 전염성농가진, 연조직염, 림프관(절)염, 파하농양
 - 인후두염(인후농양), 급성기관지염, 편도염(편도주위염, 편도주위농양), 폐렴
 - 신우신염, 방광염
 - 중이염, 부비동염
 - 성홍열

■ 용법·용량

• 유아: 세프포독심으로서 1회 체중 Kg당 3mg(약가), 1일 2~3회, 사용시 현탁하여 경구 투여합니다. 중증 또는 효과가 불충분하다고 사료되는 증례에 대해서는 1회 체중 Kg당 4.5mg(약가)을 1일 3회 경구투여합니다.

연령, 증상 등에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

• 1일 허용량제한

아스파탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(기능한 최소량 사용)하십시오.

60kg 성인: 1일 최대복용량 24g

• 이 약에 함유되어 있는 안감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 의한 속의 병력이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 이 약 성분 또는 세파게 항생물질에 대한 과민반응의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것이 원칙이나 특별히 필요한 경우에는 신중히 투여합니다.
- 2) 페니실린계 항생물질에 대하여 과민반응의 병력이 있는 환자
- 3) 본인 또는 부모, 형제 중 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질을 갖는 환자
- 4) 중증의 신장애 환자(이 약은 신 배설형의 항생물질이므로 배설 지연이 일어납니다.)
- 5) 경구섭취가 부적당한 환자 또는 비경구영양 투여 환자, 교령자, 전신 상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 합니다.)

4. 이상반응

1) 속: 드물게 속, 아니펠락시양 반응을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 불쾌감, 구내 이상감, 천명, 어지러움, 변의, 이명, 발한 등의 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지 합니다.