

모노리툼[®] 플라스정 30 mg

| 란소프라졸 | 구강봉하정

Monolitum Flas[®] tablet 30 mg | Lansoprazole |

• **원료약품 및 그 분량 : 1정 중**
란소프라졸(EP) 30mg

• **성 상 :** 회색 반점이 있는 흰색의 원형 정제

• **효능·효과**

1. 활동성 십이지장궤양의 단기치료
2. 활동성 양성 위궤양의 단기치료
3. 십이지장궤양 재발방지를 위한 헬리코박터필로리의 박멸
4. 십이지장궤양 치료후 유지요법
5. 비스테로이드소염진통제 유발성 위궤양의 치료
6. 비스테로이드소염진통제 유발성 위궤양의 발생위험 감소
7. 위식도 역류질환 관련 증상의 단기치료
8. 미란성 역류식도염의 단기치료
9. 미란성 역류식도염의 치료후 유지요법
10. Zollinger Ellison 증후군을 포함한 병리학적 과분비 상태

• **용법·용량**

- 이 약은 식전에 투여하여야 합니다.
이 약을 혀 위에 놓고 타액으로 녹여 복용하거나, 물과 함께 복용합니다.
이 약은 씹거나 부순 후 복용해서는 안됩니다.

【성인】

1. 활동성 십이지장 궤양의 단기치료 : 란소프라졸 15mg을 1일 1회 4주 동안 경구투여합니다.
2. 활동성 양성 위궤양의 단기치료 : 란소프라졸 30mg을 1일 1회 8주 동안 경구투여합니다.
3. 십이지장궤양 재발방지를 위한 헬리코박터필로리의 박멸
1) 란소프라졸 30mg을 클레리트로마이신 250~500mg, 아목사실린 1,000mg과 함께 1일 2회(12시간마다) 7일간 투여합니다. 필요에 따라 14일까지 투여할수 있습니다.
2) 란소프라졸 30mg, 아목사실린 1,000mg과 함께 1일 3회(8시간마다) 14일간 병용투여합니다.
4. 십이지장궤양의 치료 후 유지요법 : 란소프라졸 15mg을 1일 1회 경구투여합니다. 비교임상시험기간은 12개월을 넘지 않았습니다.
5. 비스테로이드소염진통제 유발성 위궤양의 치료 : 란소프라졸 30mg을 1일 1회 8주 동안 경구투여합니다. 비교임상시험기간은 8주를 초과하지 않았습니다.
6. 비스테로이드소염진통제 유발성 위궤양의 발생위험 감소 : 란소프라졸 15mg을 1일 1회 12주 동안 경구투여합니다. 비교임상시험기간은 12주를 초과하지 않았습니다.
7. 위식도 역류 질환 관련 증상의 단기치료
란소프라졸 15mg을 1일 1회 8주 동안 경구투여합니다.
8. 미란성 역류식도염의 단기치료 : 란소프라졸 30mg을 1일 1회 8주 동안 경구투여합니다.
9. 미란성 역류식도염의 치료 후 유지요법 : 란소프라졸 15mg을 1일 1회 경구투여합니다.
10. Zollinger Ellison 증후군을 포함한 병리학적 과분비 상태
병리학적 과분비 상태에 따른 란소프라졸의 투약은 환자 개개인에 따라 다릅니다. 보통 성인에 60mg 1일 1회로 투약을 시작합니다. 용량은 환자의 필요에 따라 조절되어야 하며 임상적으로 효과가 있는 한 계속 투여할 수 있습니다. 1회 90mg으로 1일 2회까지 투여되었습니다. 1일 120mg 이상 투여할 경우 분할하여 투여하여야 합니다.

【12~17세 소아 및 청소년】

1. 비미란성 위식도 역류질환 관련증상의 단기치료
15mg 1일 1회, 8주간 투여
2. 미란성 역류식도염의 단기 치료
30mg 1일 1회, 8주간 투여

【1~11세 소아】

- 위식도 역류질환 관련증상 및 미란성 역류식도염의 단기치료
30kg 이하 : 15mg 1일 1회, 12주간 투여
30kg 초과 : 30mg 1일 1회, 12주간 투여

【고령자】

고령자에서 이 약의 클리어런스가 감소되므로 용량조정이 필요합니다. 1일 용량 30mg을 초과하지 않습니다.

【간장애 환자】

간장애 환자는 이 약의 대사, 배설이 지연될수 있으므로 용량 조정 등 신중히 투여합니다.

• **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤조이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 페니실린계 항생제에 과민반응 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 아목사실린과 병용요법시)
- 3) 마크로라이드계 항생제 과민반응 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 클레리트로마이신과 병용시에 한함)
- 4) 테르페나딘, 시사프리드, 피모지드, 아스테미졸을 투여 받고 있는 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 클레리트로마이신과 병용시에 한함)(상호작용항 참조)
- 5) 이타자나비르를 투약중인 환자(상호작용항 참조)
- 6) 임부

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약물과민반응의 병력 환자
- 2) 간장애 환자
- 3) 고령자
- 4) 수유부 및 소아

3. 이상반응

1) 중대한 이상반응

- 시판후 사용성적 조사 및 환자의 자발보고 등에서 나타난 중대한 이상반응은 다음과 같습니다.
- (1) 아나필락시스 반응(전신발진, 안면부종, 호흡곤란 등)(0.1% 미만)이 발현되었고, 쇼크(0.1% 미만)를 유발한 예가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 취해야 합니다.
 - (2) 병혈구감소, 무과립구증, 용혈빈혈(0.1% 미만), 과립구감소, 혈소판감소, 빈혈(0.1~5% 미만)이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 조치를 취해야 합니다.
 - (3) 황달, AST, ALT의 상승을 수반한 중증증 간기능장애(0.1% 미만)가 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 조치를 취합니다.
 - (4) 독성피피괴사용해(리열증후군), 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군)(0.1%)이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 취해야 합니다.
 - (5) 간질폐렴(0.1% 미만)이 나타나는 경우가 있으므로 발열, 기침, 호흡곤란, 폐음의 이상(염발음(捻髮音)) 등이 나타나는 경우에는 신속하게 흉부 X선 등의 검사 실시 및 이 약의 투여를 중지하고 부신피질호르몬제를 투여하는 등 적절한 조치를 취합니다.
 - (6) 간질신장염이 나타날 수 있고, 때때로 급성신부전을 일으킬 수 있으므로, 신기능검사치(BUN, 크레아틴 상승 등)에 주의하여 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고, 적절한 조치를 취합니다.
 - (7) 헬리코박터필로리 박멸에 사용되는 아목사실린 또는 클레리트로마이신으로 위약성대장염과 같은 혈변을 동반한 심각한 대장염(0.1% 미만)이 나타날 수 있습니다. 만약 복통과 잦은 설사 증상이 나타난다면 투약의 중지 등의 적절한 조치를 취해야 합니다.
- 2) 임상시험에서 두통은 1% 이상에서 나타났으나 위약 투약군에서 더 자주 나타났습니다. 설사 발생률은 위약투약군, 란소프라졸 15mg, 30mg 투약군에서 발생률이 유사했지만 란소프라졸 60mg 투약군에서는 더 높았습니다. (각각 2.9%, 1.4%, 4.2% 및 7.4%) 유지제 시험동안 시험약 투여와 인과관계가 있는 것으로 생각되는 이상반응중 가장 많이 보고된 이상반응은 설사였습니다. 미국 및 다른 국가에서의 임상시험 또는 시판 후 보고된 이상반응은 1% 미만이며 다음과 같습니다.

- (1) 전신 : 복부비대, 알레르기반응, 등통증, 무력, 칸디다증, 양증, 오한, 홍통, 부종, 열, 플루증상(flu syndrome), 구취, 간염, 근대감, 목경직/통증, 골반통
- (2) 심혈관계 : 협심증, 부정맥, 서맥/빈맥, 뇌혈관 사고/뇌경색증, 고혈압/저혈압, 편두통, 심근경색증, 심계항진, 쇼크(순환부진), 혈관확장, 실신
- (3) 소화기계 : 비정상적인 변, 장염, 위염, 위장이상, 위장질환, 위장출혈, 식욕부진, 위식, 분문연축, 담석증, 변비, 구갈/갈증, 소화불량, 연하곤란, 트림, 식도염적, 식도궤양, 식도염, 대변 변색, 고창, 위궤절/위저산 플라, 위장염, 위산이식장 출혈, 토혈, 식욕증가, 타액 증가, 항문 출혈, (궤양성) 구내염, 혀질환/설염, 입몸출혈, 이급후증, (궤양성) 대장염, 구토, 구역, 설사, 위장칸디다증, 직장질환/출혈
- (4) 내분비계 : 당뇨병, 갑상선증, 갑상선기능저하증
- (5) 혈액 및 림프계 : 빈혈, 출혈, 림프절병증
- (6) 대사 및 영양 질환 : 비타민결핍증, 통풍, 고/저혈당, 탈수, 체중증가/감소, 말초부종
- (7) 근골격계 : 뼈/관절질환, 다리경련, 관절염/관절통, 근골격통, 근육통, 근육경직, 안검하수, 활액막염
- (8) 신경계 : 초조, 기억상실증, 불안, 무관심, 착란, 우울, 어지럼/실신, 환각, 편측마비, 적대감 악화, 성욕감퇴/증가, 신경증, 감각이상, 비정상 사고, 경련, 치매, 이인증, 복시, 과운동증, 과민장증, 감각감퇴증, 불면증, 수면장애, 졸림, 진전
- (9) 순환기계 : 천식, 기관지염, 기침 증가, 호흡곤란, 비출혈, 객혈, 말초질환, 폐렴, 상기도감염, 후두종양, 폐색류증, 인두염, 내막장애, 호흡기장애, 비염, 축농증, 천명
- (10) 피부 및 부속기관 : 여드름, 탈모, 가려움증, 발진, 두드러기, 접촉성피부염, 피부부전조, 손톱질환, 피부부, 피부부전, 땀
- (11) 특수 감각기관 : 비정상시야, 악시, 안검염, 백내장, 결막염, 안구건조, 귀/노출질환, 녹내장, 이상후각, 광선공포증, 망막퇴화, 미각손실, 시야흐림, 귀먹거리, 안통, 중이염, 미각도착, 이명, 시야협착
- (12) 비노생식 기관 : 배뇨장애, 신장증, 음경/고환질환, 요도통, 다뇨증, 빈뇨증, 요관염, 월경이상, 가슴압통, 가슴 확장/여성형 유방, 당뇨병(glycosuria), 혈뇨, 발기부전, 신결석

3) 외국에서 시판후 조사 :

- 시판 후 안전성 조사를 실시하고 있습니다. 아래에 기술된 대부분의 경우는 외국의 사례들이며 란소프라졸과의 인과관계에 대해서는 검증되지 않았습니다. 이러한 이상반응은 임의적으로 보고되므로 발생율을 알 수 없습니다.
- (1) 전신 : 아나필락시스모양 반응
 - (2) 소화기계 : 간독성, 구토, 체장염, 복통, 미각이상
 - (3) 혈액 및 림프계 : 무과립구증, 재생불량성 빈혈, 용혈빈혈, 과립구감소증, 백혈구감소증, 호중구감소증, 범혈구감소증, 혈소판감소증, 혈전성혈소판감소지반증, 호산구증가
 - (4) 대사 및 영양계 : 저마그네슘혈증
 - (5) 감염 : 클로스트리듐 디피실레상 설사
 - (6) 근골격계 : 골절, 근육염
 - (7) 피부 및 부속기관 : 다형홍반, 독성피피괴사용해(리열증후군/일부태아), 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군)을 수반한 심각한 피부반응
 - (8) 특수 감각기관 : 언어장애(Speech disorder)
 - (9) 비노생식기관 : 간질신장염, 요지류
 - (10) 간 : AST, ALT, ALP, LDH, γ-GTP의 상승
 - (11) 기타 : 무력감, 저나트륨혈증, 총 콜레스테롤과 요산의 상승, 여성형 유방, 혀와 입술의 마비, 사지마비
- 4) 국내 시판후 조사결과(조사증례수 : 897명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않습니다. : 복통
- 5) 헬리코박터필로리 박멸요법
란소프라졸, 아목사실린, 클레리트로마이신을 병용 투여한 임상시험에서 병용과 관련된 특별한 이상반응은 발견되지 않았습니다. 발생한 이상반응은 란소프라졸, 아목사실린, 클레리트로마이신과 관련하여 이전에 보고된 것과 같습니다.
- (1) 3제 요법 : 란소프라졸, 아목사실린, 클레리트로마이신
14일간 3제 요법을 받은 환자에서 가장 자주 나타난 이상반응은 설사(7%), 두통(6%), 미각도착(5%)이었습니다. 3주 요법 10일과 14일 사이에 나타난 이상반응 발생 빈도에서는 통계학적으로 유의한 차이가 없었습니다. 또한 일본에서 이와 관련한 이상반응은 다음과 같습니다.

- 소화기계: 연변, 설사, 미각이상, 복부팽만감, 구역, 구토, 복통, 구내염, 설염, 구갈, 속쓰림, 위식도역류, 식욕부진
- 간: AST, ALT, ALP, LDH, γ -GTP, 빌리루빈 상승
- 혈액계: 호중구 감소, 호산구 증가, 백혈구증가, 빈혈, 혈소판감소
- 과민반응: 발진, 가려움
- 정신신경계: 두통, 졸음, 어지럼, 불면, 마비, 우울상대
- 기타: 트라클리세리드, 요산의 상승, 총콜레스테롤의 상승 및 저하, 요단백양성, 요당양성, 권태감

(2) 2제 요법: 란소프라졸, 아목사실린

하루 3번 2제요법을 받은 환자에서 가장 자주 나타난 이상반응은 설사(8%), 두통(7%)이었습니다. 2제요법 중 나타난 이상반응 발생빈도에서는 란소프라졸 단독요법과 비교하여 통계학적으로 유의한 차이가 없었습니다.

6) 실험실적 측정치

다음의 실험실 검사치의 변화가 란소프라졸에 대한 이상반응으로 보고되었습니다.

간기능검사 결과 이상, AST 증가, ALT 증가, 크레아티닌 증가, ALP 증가, 글로불린 증가, γ -GTP 증가, WBC 증가/감소/이상, AG ratio 이상, RBC 이상, 빌리루빈혈중, 혈중 총 칼륨/요칼륨증가, 결정형도, 호산구증가, 헤모글로빈 감소, 고지질혈중, 전해질 증가/감소, 콜레스테롤 증가/감소, 글루코코르티코이드 증가, LDH 증가, 혈소판 증가/감소/이상, 가스트린 농도 증가, 대장장할양성 및 일반분도, 당뇨, 혈뇨와 같은 요질한 등의 추가적인 실험실적 측정치의 이상이 발견되었습니다.

위의 대조 실험에서 AST, ALT를 측정한 결과 위약 투여군에서 0.4% (4/978), 란소프라졸 투여군에서 0.4% (11/2677)가 최종 방문에서 정상 범위의 상한보다 3배 이상 컸습니다. 시험기간동안 환자에서 황달이 보고된 적은 없었습니다.

단독투여한 경우에 비해 란소프라졸, 아목사실린, 클라리트로마이신을 복합 투여한 임상시험에서 실험실적 측정치가 특별히 증가한 경우는 없었습니다.

4. 일반적 주의

1) 이 약으로 인해 약성중양의 증상이 완화되거나 진전이 지연될 수 있으므로 약성 중양이 의심되는 경도 증상의도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 트림, 흑색변 등)이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 약성이 아님을 확인하고 투여해야 합니다.

2) 이 약으로 장기간 치료할 경우(특히 1년 이상) 환자는 정기적으로 검사를 받아야 합니다.

3) 치료시 경과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 합니다. 위궤양, 십이지장궤양, 문합부궤양에 사용되는 경우 장기간의 사용 경험은 충분하지 않으므로 유효요법에 사용하는 것이 바람직합니다.

4) 헬리코박터 파일로리 박멸을 위한 항생제 병용요법으로 이 약과 같이 투여하는 항균제의 사용설명서를 참조해야 합니다.

① 클라리트로마이신은 적당한 대체 치료법이 없는 경우를 제외하고는 임부에게 투여하여서는 안됩니다. 클라리트로마이신 복용 중 임신한 한 경우, 환자는 태아에 대한 잠재적 위험성을 알고 있어야 합니다.

② 클라리트로마이신, 아목사실린 등 거의 모든 항생제에서 위약성 대조군이 보고되었으며 경증에서 생명을 위협하는 경우까지 그 정도가 다양합니다. 따라서 항생제 투여후 설사를 나타내는 환자의 진단은 중요함입니다. 항생제 치료는 대장의 정상 세균총을 변경시키고 클로스트리디아의 과성장을 유도할 수 있습니다. 여러 연구에서 클로스트리디움 디피실레에 의해 생성된 독소가 항생제 관련 대장염의 주요 원인으로 나타났습니다. 위약성 대조군 진단후에는 치료를 시작해야 합니다. 중증의 위약성 대장염은 약을 투여의 중지만으로 반응합니다. 중증도 또는 중증의 경우 체액과 전해질 치료, 단백질 공급, 클로스트리디움 디피실레 대장염에 대해 임상적으로 효과가 있는 항생제 치료와 고려됩니다. 심각하고 때로는 치명적인 과민반응(아나필락시스)이 페니실린 치료중인 환자에서 보고되었습니다. 이러한 반응들은 페니실린 과민반응 병력을 가졌거나 여러 알레르기항원에 감수성을 갖는 사람에게 나타나기 쉽습니다. 세팔로스포린을 투여하였을 때 중증의 과민반응을 경험한 환자가 페니실린에 과민반응 병력을 가지고 있다는 것을 보고하여 합니다. 페니실린으로 치료를 시작하기 전에 페니실린계 약물, 세팔로스포린계 약물 기타 알레르기항원에 과민반응이 있는지를 조사하여야 합니다. 만약 과민반응이 일어난다면 아목사실린 투여가 중지되어야 하고 대체 치료와 고려되어야 합니다. 중증의 아나필락시스 반응은 즉각적인 에피네프린, 산소, 스테로이드 정맥주사 및 삼관법을 포함한 기도유지 등의 응급치료가 필요함입니다.

5) 일부 해의 역학연구에서 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료가 고관절, 손목 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었습니다. 골절의 위험은 경증증상을 상하하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었습니다.

6) 3개월 이상 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에게서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났습니다. 대부분의 환자들에게 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요함입니다. 장기간 치료가 필요하거나 다량산되는 저마그네슘혈증을 유발하는 약물에, 이노제제를 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주기적 마그네슘 수치 모니터링이 필요합니다. 중대한 이상반응은 감지, 부정맥, 박동을 포함합니다.

7) 프로톤펌프억제제로 인해 내내 산도가 감소하면 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 증가합니다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리디움 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할 수 있습니다. 이것은 클로스트리디움 디피실레균성 설사 위험성 증가와 연관되어 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과와 비교되었습니다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 합니다. 클로스트리디움 디피실레균성 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있습니다.

8) 잠재적인 히스테로이드성진통제로 치료가 요구되는 환자의 소화성궤양의 예방요법은 다음과 같은 고위험환자에게 제한되어야 합니다 :

위장관출혈병력, 천공 또는 궤양, 고령자, 상부위장관 이상반응을 일으키는 것으로 알려진 약물, 코르티코스테로이드 또는 항응고제와 병용 투여, 심각한 동반발병요소의 존재 또는 히스테로이드성진통제제의 최대 추천용량으로 지속되는 사용

9) 어지럼, 시력장애, 졸음과 같은 이상반응이 일어날 수 있습니다. 이런조건에서 반응하는 능력이 떨어질 수 있습니다.

10) 메토크세이트 : 프로톤펌프억제제와 메토크세이트(주주 고용량)를 사용하는 경우, 메토크세이트의 사용상의 주의사항 참조를 병용하는 경우 메토크세이트 그리고/또는 그 대체제의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토크세이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었습니다. 고용량의 메토크세이트를 사용하는 경우, 프로톤펌프억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있습니다.(상호작용 참조)

5. 상호작용

1) 이 약의 위산분비억제 작용은 아타나자비르 설페이트의 용해도를 낮추어 아타나자비르의 혈중 농도가 감소하여 아타나자비르 설페이트의 효과가 저하될 수 있기 때문에 아타나자비르 설페이트와의 병용투여를 금합니다.

2) 이 약은 CYP-450효소에 특히 CYP3A와 CYP2C19를 통해 대사됩니다. 건강한 피험자를 대상으로 한 연구에서 CYP-450효소계에 의해 대시되는 다음의 다른 약물들과 임상적으로 유의한 상호작용은 없었습니다 : 와로파린, 안타피린, 인도메타신, 이부프로펜, 페니토인, 프로프라놀롤, 프레드니손, 디아제팜, 클라리트로마이신

반면에 유사제제(오메프라졸)가 디아제팜, 페니토인의 대사, 배설을 지연시킨다고 보고되어 있습니다.

3) 이 약은 테오필린(CYP1A2, CYP3A) 병용 투여시 테오필린의 혈중농도가 10% 상승되는 것으로 나타났으므로 란소프라졸 투여를 시작 또는 종료시 임상적으로 유의한 혈중 농도를 확인하기 위해서는 각 환자는 테오필린 용량의 적절한 적정이 필요합니다.

4) 이 약은 타크로리무스와 병용투여 시, 간의 약물대사효소에 의해 타크로리무스의 대사를 경쟁적으로 저해하므로 란소프라졸 투여 시 타크로리무스의 혈중농도가 증가할 수 있습니다.

5) 수크랄레이트/제산제는 이 약의 생체이용률을 감소시킬 수 있습니다. 따라서 수크랄레이트/제산제를 복용한 후 최소 1시간후에 이 약을 투여합니다.

6) 이 약은 현저하고 오랫동안 지속되는 위산 분비 억제제를 나타내므로 란소프라졸은 위산의 pH가 생체이용률에 중요한 인자인 약물에, 케토키나졸, 이트라코나졸, ampicillin esters, iron salts, 다독신, metyraldigoxin, gefitinib)의 흡수에 영향을 미칠 수 있습니다.

7) 어지럼을 포함한 프로톤펌프억제제와 와로파린을 동시에 투여하면 환자에서 INR(International Normalized Ratio)과 프로트롬빈 시간이 증가했다는 보고가 있습니다. INR과 프로트롬빈시간의 증가는 비정상적인 출혈뿐만 아니라 사망까지도 야기할 수 있으므로 프로톤 펌프 억제제와 와로파린을 동시에 투여하면 환자는 INR과 프로트롬빈시간 증가에 대한 모니터링이 필요할 수 있습니다.

8) 리튬과 CYP2C19와 CYP3A4를 유도하는 약물은 이 약(란소프라졸)의 혈청 농도를 감소시킬 수 있습니다.

9) CYP2C19저해제인 플루복사민과 이 약을 병용투여시 용량강감이 고려되어야 합니다. 이 약의 혈청 농도가 4배까지 증가한다고 알려져 있습니다.

10) 건강한 성인자에게 이 약과 클로피도그렐을 병용투여했을 때 클로피도그렐의 활성대사체의 노출이나 클로피도그렐에 의해 유도된 혈소판억제에 대한 효과에 있어 임상적으로 유의한 결과는 없었습니다. 이 약이 승인된 용량으로 투여될 때 클로피도그렐의 용량조정은 필요 없습니다.

11) 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토크세이트(주주 고용량)를 사용하는 경우, 메토크세이트의 농도상의 주의사항 참조와 프로톤펌프억제제를 병용하는 경우 메토크세이트 그리고/또는 그 대체제인 히드록시메토크세이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토크세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었습니다. 그러나 고용량의 메토크세이트와 프로톤펌프억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았습니(일반적 주의함 참조).

12) 헬리코박터 파일로리 박멸을 위한 항생제병용요법 : 클라리트로마이신 및/또는 에리트로마이신을 피모지이드와 병용 투여시 심부정맥(QT연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes)이 나타났고 이는 클라리트로마이신 및 에리트로마이신에 의해 이들 약물의 간다소아 방해를 받기 때문인 것으로 의국의 사후조사결과 보고되었으며 치명적인 사례도 보고되었습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신중 이 약의 노출에 관한 임상 자료는 없습니다. 랫트에 있어서 태자의 발달중 농도는 모동물의 혈청농도보다 높다고 인정되었습니다. 또한 토끼(경구 30 mg/kg)에서 태아사망율의 증가가 인정됩니다. 그러므로 안전성 이유로 임신 중 이 약의 사용을 금합니다.

2) 동물실험에서 유증으로의 분비가 보고되어 있으므로 수유중인 여성에는 투여를 피하고 무득이 필요하는 경우에는 수유를 중단해야 합니다.

7. 소아에 대한 투여

1) 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다)(성인 용법에 한함).

2) 1세에서 17세의 소아환자에 대하여 위식도역류질환관련증상과 미량성식도염에 대한 안전성과 유효성이 연구되었습니다. 성인에서의 이 약의 사용에 관한 통계된 시험결과를 바탕으로 소아환자에 대한 추가적 임상시험과 약동학 약력학시험이 실시되었습니다. 소아환자에서의 이상반응은 성인에와 유사하였습니다. 미국에서의 연구에서 성인에게서 발견되지 않은 새로운 이상반응은 나타나지 않았었습니다. 1세 미만의 환자에 대한 란소프라졸의 안전성과 유효성에 관하여는 연구된 바 없습니다.

1세에서 11세까지의 소아에서(n=66) 시험용량 투여와 개념된 가장 흔하게 보고된(2명 이상) 이상반응은 변비(5%)와 두통(3%)이었습니다.

미국에서의 임상시험에서 성인에게서 발견되지 않은 새로운 이상반응은 보고된 바 없습니다.

12세에서 17세까지의 소아에서(n=87) 시험용량 투여와 개념된 가장 흔하게 보고된(3% 이상) 이상반응은 두통(7%), 복부통증(5%), 설사(3%), 어지럼(3%)이었습니다. 어지럼의 경우, 성인에서 1% 이하로 발생하였고 비미량성 위식도역류질환을 가진 청소년 3명에서 보고되었으며, 편두통, 호흡곤란, 구토증상을 동반한 현기증을 나타낸 것으로 보고되었으나(소아 용법이 있는 경우에 한함).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 위산분비기능이 저하되어 있으며 기타 다른 생리기능이 저하되어 있으므로 복용량으로 투여를 시작하는 등 신중히 투여합니다.

9. 과량투여시의 처리

이 약은 혈액투석으로 제거되지 않습니다. 1개의 보고된 과량투여에서 이 약 600 mg을 복용한 사람에서 이상반응이 없었습니다. 랫트에서 경구로 5,000 mg/kg(BSA(body surface area)가반으로 30 mg의 대략 1300배투여했을 때 죽음이나 임상적인 효과는 나타나지 않았었습니다. 필요하다고 판단될 때, 위배출, 차를, 증상치료를 할 수 있습니다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

3) 쉽게 부서질 수 있으므로 자동분포기사용은 적절하지 않습니다(구경정에 한함).

11. 기타

1) 랫트(50 mg/kg/일)에게 52주간 강제 경구투여한 실험(임상용량의 약100배)의 1예에서 양성의 정소 간세포종이, 24개월간 강제 경구 투여한 실험(15 mg/kg/일)의 암컷 1예에서 위의 카르티노이드 종양이 인정되었다는 보고가 있습니다. 또한 암컷 랫트에 15 mg/kg/일 이상 및 수컷 랫트에 50 mg/kg/일이상 투여군에서 암막위축발생빈도의 증가가 확인되었습니다. 정소세포종 및 암막위축증은 마우스의 발암성 시험, 개, 원숭이의 독성시험에서는 확인되지 않았으며 랫트에서의 특이한 변화일 수 있습니다.

2) 오메프라졸 투여자에 의해 외국에서 시력장애가 발생되었다는 보고가 있습니다.

• 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

• 포장단위 : 28정

• 제조원 :

SAIXAT LABORATORIOS SALVAT, S.A, Spain, Gall, 30-36 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

• 수입판매원 : **태준제약** 본사 : 서울특별시 용산구 대치동로 31길 8

공장 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경자동로 109-30

※ 약약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어하여, 첨부문서를 꼭 약약품과 함께 보관하십시오.

※ 구입시, 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 소손된 제품은 구입처를 통하여 교환해드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 약약품 용어설명 및 기타 자세한 약약품 정보는 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 첨부문서를 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국국약품안전관리원(www.drugsafe.or.kr) → 약약품유해사례보고에 알려주십시오.

※ 소비자 문의 : (주)태준제약 CS팀 (02)799-0271

※ 이 첨부문서의 작성년월일은 2014년 09월 01일입니다. 작성년월일 이 후 변경 된 내용은 태준제약 홈페이지(www.taejeon.co.kr)나

전화번호(02)799-0271)에서 확인할 수 있습니다.

※ 작성년월일은 제품의 사용기한과는 무관합니다.