



www.huvist.co.kr

일반의약품

분류번호:234

알마휴정

500정 알마게이트

(주)휴비스트제약

대전시 대덕구 신일서로 104번길 46

[원료약품 및 분량] 1정 중 알마게이트(KP) 500mg 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)

[성상] 흰색의 장방형 정제 **[효능·효과]** 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위.십이지장궤양, 위염, 위산과다,속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량] 성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

[사용상 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자
 - 알츠하이머병 환자
 - 치질 환자
 - 체액 저류(부기) 환자
 - 임신 중독증 환자
 - 설사 환자
 - 진단되지 않는 소화 기관 출혈 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
 - 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음)
 - 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.
 - 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3시간 간격을 두고 복용한다.
 - 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킨다.
 - 신장애 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장애 환자에게는 권고되지 않는다.
 - 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.
 - 고령자
 - 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
 - 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
 - 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
 - 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫고 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- [저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
 제조의뢰자 : (주)휴비스트제약 제조자 : 케이엠에스제약(주) 경기도 수원시 영통구 신원로 236



HDPE
뚜껑:LDPE

0382202

제조번호:

사용기한:

40×25