

균형잡힌 성장을 위한

어린이 종합영양제
키즈파

추어블정

성장 발육기

비타민
미네랄

+ 칼슘

분류번호 : 319(기타의 비타민제)

키즈파추어블정 개요 및 특징

비타민과 미네랄은 우리 몸의 성장과 생명 유지에 필수적인 물질입니다. 하지만 체내에서는 합성되지 않거나 필요량만큼 생성되지 않으므로 음식물이나 영양제를 통하여 공급되어야 합니다. 특히 신체활동이 활발하나 좋지 않은 식습관으로 인해 미량 영양소와 미네랄이 부족한 어린이들에게 균형 잡힌 영양 섭취가 필요합니다. 키즈파추어블정은 어린이들에게 부족하기 쉬운 비타민 D와 신경기능을 원활하게 해주는 비타민 B군, 골격 성장에 필요한 칼슘, 항산화성분인 비타민 C 등 총 12가지 비타민과 미네랄을 함유하고 있어 성장 발육중인 어린이와 청소년에게 좋은 종합영양제입니다.

【성분 · 함량】 약 1정(930mg) 중

에르고칼시페롤 과립(비타민D)(KPC)(에르고칼시페롤로서 100IU)	-----	0.118mg
티아민질산염(비타민B ₁)(KP)	-----	1.0mg
폴산(엽산)(KP)	-----	0.1mg
리보플라빈(비타민B ₂)(KP)	-----	1.0mg
판토텐산칼슘(비타민B ₅)(KP)	-----	3.0mg
레티놀아세테이트 과립(비타민A)(별규)(레티놀아세테이트로서 1,000IU)	-----	2.0mg
피리독신염산염97% 과립(비타민B ₆)(별규)(피리독신염산염으로서 1mg)	-----	1.030mg
산화마그네슘(Mg)(KP)(마그네슘으로서 5mg)	-----	8.290mg
니코틴아미드(비타민B ₃)(KP)	-----	5.0mg
토코페롤아세테이트 2배산(비타민E)(KPC)(토코페롤아세테이트로서 5IU)	-----	10.0mg
아스코르브산 과립97%(비타민C)(별규)(아스코르브산으로서 50mg)	-----	51.5mg
인산수소칼슘수화물(USP)(칼슘으로서 75.23mg(총칼슘으로서 75.48mg))	-----	323.0mg

【성상】

딸기향 : 엷은 빨간색의 딸기향이 있는 원형의 씹어먹는 정제
오렌지향 : 엷은 주황색의 오렌지향이 있는 원형의 씹어먹는 정제

딸기향	앞면	뒷면	오렌지향	앞면	뒷면

【효능 · 효과】

- 다음경우의 비타민 A, D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 눈의 건조감의 완화 · 야맹증(밤에 잘 못보는 증상) · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방
- 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

【용법 · 용량】

3세~12세 : 1일 2회, 1회 1정 복용
12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 2정 복용
입안에서 녹이거나 씹어서 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성에 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치로써 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
- ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 6) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 7) 신장(콩팥)장애 환자
- 8) 저단백혈증 환자
- 9) 간질배당체를 투여 중인 환자
- 10) 동풍환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자
- 11) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 12) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 메스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 8) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- 9) 장기간 고용량의 비타민 A(비타카로틴)로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영성증) 위험을 높일 수 있습니다.
- 10) 항알도스테론제, 트리안테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 11) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
- 4) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 6) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【사용기한】 외부포장에 표기

【포장단위】 120정 (60정×2)

【저장장법】 기밀용기, 실온(10~30℃)보관

- ※ 정제를 꺼낸 후에는 뚜껑을 꼭 닫아주십시오.(본 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관 중 인습(흡수)되어 변색될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)
- ※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 '소비자분쟁해결기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 이 설명서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성년월일 2014. 9. 5

사용기한은 외부포장에 표기



제조판매원

유한양행

홈페이지 : www.yuhan.co.kr
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자 요금부담)

본 사 : 서울시 동작구 노량진로 74

공 장 : 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지리 219