

레돌민[®]정

Redormin[®] Tab.

일반의약품

분류번호 112: 최면진정제

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽은 후 복용하시고 약과 함께 보관하십시오.

(적응증) 레돌민정은 스위스 의약품으로 수면유도, 수면유지, 수면 시 불편함 해소에 작용하는 의약품입니다.

(약리작용) 레돌민정의 생약성분인 주성분은 체내에서 아데노신 A1 수용체와 결합하여 수면의 욕구를 증가시키고, 체내에서 멜라토닌 수용체와 결합하여 적정 수면시간유지와 수면주기 정상화에 유효한 작용을 나타냅니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정(1,000mg) 중

•유효성분

길초근45%메탄올건조엑스(5~8→1)·말토덱스트린·무수클로이드성아산화규소혼합물(75:24.8:0.2)(별규)…500.0mg

(길초근45%메탄올건조엑스(5~8→1)로서 375mg)

호프45%메탄올건조엑스(7~10→1)·말토덱스트린·무수클로이드성아산화규소혼합물(70:29.8:0.2)(별규)…120.0mg

(호프45%메탄올건조엑스(7~10→1)로서 84mg)

•첨가제(타르색소): 청색2호알루미늄레이크

•기타 첨가제: 무수클로이드성아산화규소, 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 스테아르산마그네슘염, 이산화티타늄, 정제수, 크로스 카르멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜20000, 하이프로멜로오스

[성상] 독특한 냄새가 있는 담청색의 장방형 필름 코팅정

[효능·효과] 1. 수면 유도 및 수면 유지

2. 수면 시 불편함 해소

[용법·용량] 성인 및 12세 이상 청소년: 수면 1시간 전에 1정을 물과 함께 복용한다. 필요 시 1.5정으로 증량(양을 늘림)가능하다.
6세 이상 소아: 수면 1시간 전에 0.5정을 물과 함께 복용한다

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

1) 이 약에 함유된 성분에 대해 과민증이 있는 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 및 수유부(유아에 사용되었을 때 현재까지 보고된 위험성은 없으나, 체계적인 과학적 조사가 이루어지지 않았음.)

3. 기타 이 약의 복용(사용) 시 주의할 사항

1) 매우 드문 경우로 첨가제에 의한 피부 반응이 나타날 수 있음.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 25℃ 이하에서 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위] 10정, 30정

[저장방법] 기밀용기, 25℃ 이하에서 보관

[제조사] Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, CH-8590, Romanshorn, 스위스

[수입자] 광동제약(주) 서울특별시 서초구 서초중앙로 85 가산빌딩 6층

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다.

※ 본 제품의 포장용기(PTP)를 개봉할 때 손에 상처가 생길 수도 있으니 유의하시기 바랍니다.

※ 복용 시 정제기 기도에 걸릴 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 클로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2017.08.07

J1170807-002.MZ