

디센트레스정

조 제 용
일반의약품
분류번호 238

K.G.M.P

우수의약품지정업체

【원료약품의 분량】 1정 중

(주성분) 비사코딜(KP) 3mg
(주성분) 도큐세이트나트륨(USP) 16.75mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(소·우유)
첨가제(타르색소) :
황색203호 알루미눔레이크, 청색1호 알루미늄레이크

【성 상】 연두색의 원형 장용필름코팅정

【효능·효과】

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

성인 : 1회 2정
1일 1회 취침시(공복시)에 복용한다. 다만, 초화는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 2) 장폐색(장지막힘) 환자
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.
 - 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 신장장애 환자
 - 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 5) 나트륨 제한 식이를 하고 있는 사람
 - 6) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 상습시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우.
 - 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우.
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.

- 3) 복용 시 정제를 씹지 말 것.
- 4) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 500정

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 우수의약품관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다. 본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참고하시기 바랍니다.
- ※ 내가 신고한 작은 부작용 국민건강 초석된다.
(온라인의약품서관 : 1577-1255, drug.mfds.go.kr)
- ※ 이 첨부문서의 개정년월일 이후로 변경된 허가사항은 당사 홈페이지(www.bi-nex.com)나 전화(080-263-3151)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.

<http://www.bi-nex.com>

☎080-263-3151

개정년월일 : 2015년 03월 24일



주|바이넥스
부산광역시 사상구 디마로 388-3