

리포유정

분류번호 : 02330

4010704-1
0410102

Liforyou Tab.

KGMP 전문의약품

※ 의약품을 사용하기 전에 본 문서를 자세히 읽어보시고 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000Ⅳ(KP) 20밀리그램
(전분당화력(pH4.5)278단위이상, 전분호정화력(pH4.5)640단위이상, 단백소화력(pH3.0) 170단위이상, 섬유소당화력(pH4.5)2단위이상)
리파제Ⅱ(KP) 20밀리그램
(지방소화력(pH6.0)120단위)
우르소데옥시콜산(KP) 10밀리그램
시메티콘(KP) 30밀리그램

첨가제(동물유래) : 무수유당(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

첨가제(타르색소) : 황색 4호, 청색1호

[성상] 녹색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(체함)(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 이 약은 성인 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용합니다.

[사용상주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose - galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사,치과의사,약사와 상의할 것.상담시 이 첨부문서를 소지하십시오.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 500정

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용(유효)기간] 제조일로부터 24개월

[제조사] (주)씨트리, 경기도 남양주시 경강로 27

[제조의뢰자] (주)휴비스트제약, 대전광역시 대덕구 신일서로 104번길 46

▶ 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

▶ 본 제품은 엄격한 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질 변패 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

▶ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

▶ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보를 참조하십시오.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(070-4481-6051)로 문의하시기 바랍니다.

설명서 작성일자 : 2014. 08. 25

설명서 개정일자 : 2015. 06. 24

내일을 향한 희망 에너지

HUVIST

Huvist Pharm. Co., Ltd. (주)휴비스트제약

대전시 대덕구 신일서로 104번길 46

고객상담실 : 070-4481-6051 / www.huvist.co.kr